

DIPTERA SCANDINAVIÆ

DISPOSITA ET DESCRIPTA.

Auctore

PH. D:RE JOHANNE WILHELMO ZETTERSTEDT

AD UNIVERSITATEM LUNDENSEM BOTAN. ET OECON. PRACT.
PROFESS. REG. ET ORD., UNIVERSITATIS H. T. QUOQUE
RECTORE; EQUITE AURATO REG. ORDINIS DE WASA; REG.
ACAD. SCIENT. HOLM., SOCIET. ENTOMOL. PARIS., NATUR.
CURIOS. LIPS., SOCIET. CUVER. PARIS., SCIENTIAR. LITTE-
RARUMQUE ELEGANT. GOTHOB., PHYSIOGRAPH. LUND.,
CULTURÆ BOMBYCINÆ SUECANÆ HOLM., ENTOM. SCANDINAV.
HAFNIÆ., ET OECON. MALMOG., SODALI; REG. SOCIET. OECO-
NOM. BOTN. OCCIDENTALIS, SOCIETAT. HORTULANÆ GOTHO-
BURGENSIS ET SOC. PRO FAUNA ET FLORA FENNICA
HELSINGFORSIÆ, MEMBRO HONORIFICO; ATQUE
SOCIET. ENTOM. STETINI
CORRESPONDENTE.

154. — 185.

TOMUS SEXTUS.

Ostobilles — *Geomyzides*

LUNDÆ,

EX OFFICINA LUNDBERGIANA,
SUMTIBUS REGIIS.

1847.

(2163 - 2580)

Hab. in Uplandia ad Nacka prope Holmiam a beato Prof. *B. F. Fries* mense Maii 1834 inventa & ad me pro describenda benevole communicata.

♀ *Lonchæa tarsata* hujus operis p. 2352 n:o 7 valde affinis & similis, sed paullo minor, & seta mystacina perspicua, antennis brevioribus, alis hyalinis, nec albidis, &c. distincta. Oculi nudi, in fronte anguste, nec late, & paralleliter remoti. Frons nigro-cæruleescens, nitida, breviter & parce pubescens, setis verticis paucis. Epistoma infra oculos parum descendens, nigrum, lenissime cinereo-micans. Partes oris paullo exsertæ, nigræ, pubescentes, palporum articulo ultimo rotundato. Thorax & abdomen lœvia, cærulecentia, nitida, parum pilosula, setis scutelli & thoracis postici distinctioribus. Alæ abdomine paullo longiores. Halteres nigri. Pedes atri, metatarsis testaceæ l. flavidis; pilosuli, sed non spinulosi.

Famil. 34. GEOMYZIDES.

181. GEOMYZA Fall.

Corpus minutum, oblongum, subnitidum, interdum opacum, glabriculum, setis in vertice, thoracis lateribus scutellique margine distinctis; molle. Caput rotundatum. Frons latiuscula posterius sensim latior, antice non prominula. Epistoma infra oculos haud descendens, subimpressum, seta mystacina utrinque unica distincta. Antennæ breves, deflexæ, articulo ultimo ovato l. ovali, basi seta dorsali breviter plumata (in *G. marginella* n:o 6, *socculata* n:o 9, *unguicella* n:o 4, &c., pubescente l. nudiuscula). Oculi majusculi, rotundi, nudi. Scutellum margine apicali bisetosum. Abdomen elongatum, evidenter 6-annulatum. Alæ elongatæ, subangustatæ, parallelæ, rectæ.

Nervi longitudinales: omnes recti, integri & paralleli, horum 2:dus longissimus, 3:tius in ipso apice excurrens, 6:tus abbreviatus. Nervus auxiliaris brevissimus, simplex. Nervi transversi perpendiculares, recti, subappropinquantes, saltem non longe remoti, horum ordinarius paullulum ante medium areæ insertus, medius perspicue pone apicem auxiliaris ductus. Segmentum costæ 1:imum circiter 6:iam partem totius costæ attingens, 2:dum 1:mo fere quintuplo longius, 3:tium 2:do sextuplo brevius, 4:tum 3:io fere dimidio vix duplo longius; segmentum nervi longitudinalis 4:ti 3:tium seu ultimum 2:do fere dimidio longius. Costa nuda. Squamae rudimentariae. Halteres nudi. Pedes simplices, parum setulosi. Color pallidus aut obscurus. Alæ sepe maculatim pictæ. Motu agilis. Habitatio in graminosis libenter locis uliginosis; imagines sepe versantur in plantarum foliis, quorum succum roridum amant. Differentia sexus; mas: abdomine angustiore, leniter subclavato, ano obtuso; femina: ano acutiore. Typus generis: *G. combinata*. Ab *Opomyza* ore mystaceo nec nudo, a *Notiphila* & *Ephydra* epistomate retuso nec convexo, a *Piophila* seta antennarum plumata 1. pubescente nec nuda, & ab *Agromyza* & *Phytomyza* nervulo transverso ordinario propius ad marginem alæ retracto, mox dignoscitur *Geomyza*. *Anthophilina* (gen. 195) adhuc proprius accedit, sed antennarum articulo ultimo non orbiculato & seta non nulla distinguitur. A *Drosophila* alis angustioribus & nervo auxiliari breviori, 2:do vero longitudinali plerumque longiori, diserepat.

A. thorace pallido.

1 combinata Linn.? Fall. (var. a. b. c. — *Musca* Linn. — *Tephritis* Fabr. *Opomyza* Meig. exclus. syn. *Musca germinationis* Schrank, quod ad *Opomyzam Germinationis* mibi pertinet) ♂♀. 2 *angustipennis* Stæg. (*Opomyza* eadem Stæg.) ♂♀. 3 *consobrina* Zell. Ins. Lapp. ♂♀. 4 *unguicella* Zell. Ins. Lapp. (*Sapromyza* eadem Zell. l. c.). ♂♀.

B. thorace cinerascente vel obscuro.

- 5 *tripunctata* Fall. (var. a. b. — *Opomyza* Meig.) ♂♀.
 6 *marginella* Fall. (*Opomyza* Meig.) ♂♀. 7 *Unipunctum* Zett. n. sp. ♂♀. 8 *terminalis* Zett. n. sp. ♂♀. 9 *socculata* Stenb.

Geomysza.

A. thorace pallido.

1. *G. combinata*: rufo-testacea, capite pedibusque flavis; alis hyalinis, nervis transversis maculaque apicis fuscis; abdomine nigro, basi pallescente. ♂♀. (Long. 1 $\frac{1}{4}$ — 1 $\frac{1}{2}$ lin.).

Var. a. ♂♀. alis hyalinis, nervis transversis, apiceque dimidiatis, fuscis.

Fall. Geomyzid. 2. 1. ♂♀. Zett. Ins. Lapp, 773. 1. ♂♀. *Musca* Linn. Syst. Nat. 2. 997. 114? Fabr. Ent. Syst. 4. 352. 163. *Tephritis* Fabr. Antl. 317. 2. *Opomyza* Meig. Dipt. 6. 109. 18. ♂♀. (exclus. syn. *Musca germinationis* Schrank, quæ ad *Opomyza Germinationis* nob. pertinet). T. 59. f. 23. ♀. — Macq. Buff. 2. 558. 12.

Var. b. *apicalis* ♂♀. alis hyalinis, nervis transversis, apiceque toto, fuscis.

Opomyza apicalis Meig. Dipt. 6. 109. 19. ♂♀.

Var. c. *venusta* ♂♀. alis hyalinis, nervo transverso ordinario apiceque fuscis.

Opomyza venusta Meig. Dipt. 6. 110. 20. ♀. Macq. Buff. 2. 558. 13. ♀. — *Tephritis maculata* Germar. in Ahrensii Fn. Ins. Europ. fasc. 3. tab. 22. ♂.

Hab. haec omnes varietates simul in graminosis per hortos, prata & pascua Scandinaviæ præsertim meridionalis & mediæ, Jul. Aug. Sept. sat vulgaris; in copula aliquoties etiam deprehensa; scilicet in Scania ad Lund, Abusa, Björnstorps, Silfåkra, Lindholmen, Tranås, Esperöd, Widtsköfle &c., frequens; in Smolandia ad Skärsjö, D. *Ljungh*; in Ostrogothia ad Gusum, Wadstena &c., non parce; in Westrogothia ad Gothoburgum; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in provinciis magis borealis rarissime; in Gotlandiæ pratis ad Öja & Sanda haud raro; in Dania passim, D. *Stæger*. (E Finlandia a D. *Sahlberg*, & e Stetino 8 Jun. 1812 capta var. b. a D. *Dahlbom*, communicata).

♂. *Angusta cylindrica* præsertim ♂. Rufo- l. flavo-testacea, subnitida, setis ordinariis nigris. Caput flavum, epistomate, proboscide palpisque albidi. Antennæ sensiles rotundatae flavæ, seta sat distincte plumata nigra. Seta mystacea utriusque una distincta infra & juxta quam aliquot exiguum; omnes obscuræ. Oculi in viva ferruginei æneo-micantes. Abdomen nigrum l. piceum, basi latius l. angustius pallidum, apice puberulum, in ♀ plerumque rufum nigro- l. piceo-fasciatum. Alæ angustæ, albo-hyalinæ, nervis longitudinalibus pallidis, auxiliari obscuro. Var. a.: nervis transversis medio leniter, ordinario magis perspicue, maculaque apicis subquadrate a costa plerumque paullo infra nervum longit. 3:tium, sed non ad 4:tum extensa, fuscis; var. b.: nervis transversis ut in var. a., macula apicis fusca majori infra nervum long. 4:tum extensa totum apicem alæ implente; var c.: nervis transversis medio immaculato, ordinario leniter, maculaque apicis minori non ultra nervum long. 3:tium extensa, fuscis; in hac varietate c. color thoracis intensius rufus, subcinerascens & alarum costa basi per totum nervum auxillarem evidentius obscura. Halteres albidi. Pedes pallide flavi, tarsis vix infuscatis. Femora antica tenuiter pilosa.

Obs. Linne l. c. suam *Muscam combinatam* "thorace cinereo" describit, unde de identitate nostrae oritur dubium.

2. *G. angustipennis*: rufo-testacea, capite pedibusque flavis; alis hyalinis, puncto apicis fusco; abdomine nigro, basi pallescente. ♂♀. (Long. $1\frac{1}{4}$ sere $1\frac{1}{2}$ lin.).

Opomyza angustipennis Stæg. in litt.

Hab. in Scandinavia meridionali rarius; in Scania semel capta; e Dania a D. Stæger communicata.

♂♀. Priori simillima, & ut mihi videtur vix nisi alarum nervis transversis immaculatis, nec fuscedine cinctis, diversa. Alæ etiam forte paullo angustiores quam in præcedente, puncto I. macula apicis fusca minore a costa tantum ad nervum longitudinal. 3:tiū extensa. Reliqua ut in *G. combinata*, a quatenus auctoritate Nobilissimi Stæger ut distinctam speciem propono.

3. *G. consobrina*: rufa, capite pedibusque flavis; thoracis postico scutelloque cinerascenti rōsis; alis hyalinis, nervis transversis maculaque apicis fuscis; abdomine nigro. ♂♀. (Long. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ lin.).

Opomyza consobrina Zett. Ins. Lapp. 762. 2. ♀.

Hab. in Svecia & Lapponia valde rara; in Smolandia ad villam Skärsjö uterque sexus deprehensus; in Lapponia Umensi ad Lycksele semina semel lecta; in Dania parce, D. Stæger.

♂♀. A *G. combinata*, cui proxime accedit, thoracis postico scutelloque intensius rufis cinereoque micantibus, ut & abdome toto in utroque sexu nigro, nec basi pallido, differre videtur. Frons flava, vertex rufo. Antennæ flavae, seta modice plumata (in specimine lapponico minus bene conservato pubes-

scentia in antennarum seta parum perspicua), obscura. Epistoma & partes oris albida. Seta utrinque mystacina cum adjacentibus exiguis ut in *G. combinata*; (in specimine lapponicus subdetrito seta mystacina parum perspicua). Pectus jam rufum, jam flavum. Abdomen totum nigrum, nitidum, oviductu ♀ brevi, pallido. Alae angustæ, sordide albido-hyalinæ, nervo auxiliari obscuriori. Ambo nervi transversi modice insusciti (unde ab *Opom. venusta* Meig. distinguitur). Macula apicis fusca, plerumque majuscula totum apicem occupans, raro parva & dimidiata. Halteres albi. Pedes pallide flavi. Femora antica tenuiter pilosa.

Specimen typicum a Dr. J. C. Gmelin ex aliis locis ad hoc collectis.

4. *G. ungvicella*: flava, capite pedibusque pallidioribus, tarsorum articulo ultimo nigro; alis subhyalinis immaculatis; abdominis dorso in ♂ toto, in ♀ macula, fuscis. ♂♀. (Long. $\frac{3}{4}$ vix 1 lin.).

Sapromyza ungvicella Zell. Ins. Lapp. 753. 12. ♂♀.

Hab. in graminosis Lapponiae Umenis passim; ad Lycksele, Umenas & Wilhelmina 1—19 Jul. 1832 decem terminas & unicum marem inveni. ♂♂. Magnitudine paullo minore, colore corporis pallidiore, testa antennarum nudiuscula, alis immaculatis & tarsorum apice atro, a precedentibus mox distincta. Seta mystacina utrinque adest, unde ad *Geomyzam* nec ad *Sapromyzam* referenda. Tenera mollis. Caput pallidum. Antennæ rotundæ, flavae, seta fusca. Oculi in vivo virides, in mortua ferruginei. Thorax testaceus, in ♂ vittis 3 obsoletis. Abdomen oblongum, ventre pallido, supra in ♂ nigricans, in ♀ disco fuscum. Alæ pallide hyalinæ, nervis transversis nonnihil magis approximatis quam in prioribus. Halteres pallidi. Pedes in utroque sexu simplices, flavi, tantum articulo ultimo tarsorum atro. — Affinis *G. socculata* infra n:o 9.

Obs. *Geomyz. bipunctata* Fall. in genere *Piophila* querenda.

B. thorace cinerascente l. obscuro.

5. *G. tripunctata*: thorace scutelloque cinereis, capite, antennis pedibusque testaceis; alis hyalinis, nervis transversis maculaque apicis fuscis; abdomine nigro. ♂♀.
(Long. 1½—1¾ lin.).

Fall. Geomyzid. 2. 2. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 774. 2. ♂♀. *Opomyza* Meig. Dipt. 6. 110. 21. ♂♀. Macq. Buff. 2. 558. 14.

Hab. in graminosis & Urticetis per Scandinaviam præsertim versus autumnum, mihi ab initio Julii usque ad ineuntem Octobrem obvia, vulgaris, in copula etiam saepe deprehensa, & e fungo putrido semel exclusa; occurrit nempe in Scania ad Lund, Kjesslinge, Rästen, Björnstorps, Esperöd &c., frequens; in Smolandia, D. *Ljungb*; in Ostrogothia ad Gusum, Wadstena, Fredensborg &c., non parce; in Westrogothia ad Gothoburgum; in Gotlandia ad Fardhem & Kjellunge; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Dalecarlia; in Jemilandia boreali ad Mullsjellet rarius; in Lapponia rarissime; in Dania passim, D. *Stæger*. (E Finlandia a D. *Sahlberg* missa. Ad Gryphiam, Trawemündiam, Hamburgum & Berolinum (ad Moabite) a D. *Dahlbom* lecta).

♂♀. Frons flava. Antennæ flavæ, seta modice plumata, nigra. Epistoma & instrumenta cibaria flavo-alba. Oculi ferruginei, in viva æneo-nicantes. Thorax fusco-cinereus, supra parum nitidus. Scutellum concolor, raro apice rufescens. Abdomen nigrum, nitidum. Alæ nonnihil latiores quam in *G. combinata*, cinereo-hyalinæ, nervis subobscuris; basi leniter infuscatae. Nervi transversi fuscedine late cincti. Macula apicalis fusca superius dimidium apicis occupans ad nervum longitudinalem 3:ium extensa, ut in *G. combinata* var. a. Halteres albi.

Pedes favi, coxis anticus albidis. *Femora* anticae in ♂ suberas-
siora, in utroque sexu pilosula. *Tarsi* rarius leniter subin-
seati.

Var. b. thoracis limbo antico rufescente; de cetero var. a. simili-
lima. Ad Lund in Paradislyckan & ad Björnstorps Scania men-
se Septemb. a D. Dahlbom & me inventa.

6. *G. marginella*: thorace scutelloque cinereis, fron-
te, antennis pedibusque testaceis; vertice obscuro; episto-
mate albido; femoribus anticus fuscis; abdomine nigro; a-
lis nigricanibus, villa media maculisque duabus versus
apicem albis. ♂♀. (Long. circiter $\frac{3}{4}$ lin.).

Fall. Geomyz. 3. 5. ♂♀. Zell. Ins. Lapp. 774. 3. ♂♀.
Opomyza Meig. Dipt. 6. 104. 6. Macq. Buff. 2. 556. 6.

Hab. in graminosis & plantis humilibus s̄epe in ou-
da terra, interdum in Pinetis, per pascua arida & are-
nosa imprimis Scandinavie meridionalis, Jul. Aug. pas-
sim; scilicet in Scania ad Lund, Sjöfakra, Esperöd &c.,
frequens; in Smolandia, D. Ljungb.; in Ostrogotia ad
Lärketorp parce; deinde versus septentrionem tantum
valde rara occurrit; e Dania a D. Stæger missa. (Ad
Moabite & Jungfern-Heide prope Berolinum 7–12 Jul.
1842 a D. Dahlbom lecta mecumque communicata).

♂♀. Per picturam alarum ab aliis sui generis abunde dignota.
Prioribus paullo brevior, sed robustior; subovata. Opaca. Frons
testacea, vertice cinereo. Orbita oculorum albida. Antennae
breviter oblongae, testaceae, seta breviter puberula, fusca. Epi-
stoma & genae albida, seta mystacina nigra. Partes oris palli-
dae. Thorax & scutellum cinerea, ille lineolis 2 fuscis s̄epe
obsoletis. Pleura etiam in bene conservatis dilute brunneo-
lineatae. Abdomen nigrum, subnitidum, apice puberulum, ano
in ♂ subrotundato infexo cinerascente, in ♀ obtuso. Alae mo-
dice angustae, nigricantes l. saturate fuscæ, plaga cuneiformi-

fero a basi alba ad nervum transvers. ordinarium extensa & inter nervos longitudinales 3 & 5 locata, maculaque pone nervum transv. ordinarium majuscula per nervum longitud. 4:tum secata, albo-hyalinis. Costa vaga tenuissime setulosa. Halteres albi. Pedes flavo-testacei, tenuiter pilosuli, femoribus anticis nigricantibus, praesertim in ♂ subincrassatis. Tarsi antici vel toti l. saltē metatarso nigricantes.

7. G. *Unipunctum*: thorace scutelloque griseis, fronte, antennis pedibusque flavo-testaceis; epistomate albido; abdome nigro; alis cinereo-hyalinis, puncto apicis nigro. ♂♀. (Long. vix 1 liū.).

Hab. in Svecia boreali valde rara, scilicet in Dalecarliæ alpibus a D. Prof. *Bohemus* inventa; in Helsingia ad Arbrå 24 Aug. 1810 a me quoque capta.

♂♀. Alis totis hyalinis, puncto tantum apicali nigro, ab omnibus facile dignoscenda. Parva angusta opaca. Frons flava. Antennæ parvæ, rotundatæ, flavae, seta sat longe & distincte plumata, obscura. Epistoma breve, flavo-albidum. Seta mystacea utrinque unica, at setulæ oris plures exiguae. Proboscis flava. Oculi mediocres, rotundi, rufi. Thorax late griseus, linea dorsali dilute brunnea obsoleta. Abdomen nigricans puberulum subnitens. Alæ modice angustæ, cinereo-hyalinæ immaculatæ, puncto tantum in apice nervi longitudinalis 3:ii parvo rotundato nigro. Nervus auxiliaris valde brevis, ejus apici opponitur nervulus transversus medius. Nervus transversus ordinarius a medio modice distans, a inargine interiori sat longe remotus, in medio alæ situs. Costa nuda, basi tantum brevissime puberula. Halteres pallidi. Pedes mediocres, flavi, tar- sorum articulo ultimo saturationi.

8. G. *terminalis*: nigro-fusca, fronte brunnea; antennis pedibusque flavis; epistomate albido; abdome ni-

gro; alis cinereo-hyalinis; macula apicis magna fusca. ♀.
(Long. $\frac{3}{4}$ lin.).

Hab. in Scania rarissime; ad prædium Björnsorp prope Lund d. 26 Jun. 1838 specimen descriptum ab oculatissimo D. Dahlbom inventum.

♂. Potius forte *Geomyzæ* quam *Diaslatæ* species, pictura larum a prioribus diversa. Statura precedentis, fere paullo minor, colore alio. Subnitens. Frons brunnea, antice dilutior, postice setosa. Antennæ parvæ ovatæ flavæ, seta fusca breviter plumata. Epistoma breve, flavum, orbita oculorum alba. Seta mystacina utrinque unica. Oculi majusculi. Thorax & scutellum nigro-brunnea. Abdomen nigrum. Alæ angustæ, cinereo-hyalinæ, macula terminali fusca magna totum apicem alæ occupante. Nervi transversi modice remoli, horum ordinarius ad marginem alæ interiore retractus, leniter insuscatus, medius paullo pone nervum auxiliarem omnium brevissimum ductus. Pedes medios, flavi.

9. *G. socciata*: obscure cibera, epistoma pallida, frontis antico, antenbis pedibusque flavis, tarsorum articulo ultimo atro; abdomine nigro; alis cinereo-hyalinis, immaculatis. ♂. (Long. $\frac{3}{4}$ vix 1 lin.).

Stenhamm. in litteris d. 3 April. 1847.

Hab. in Ostrogothia ad Härads hammar forte rarissime, mibi in unico exemplo ab amicissimo & oculatissimo Doct. Stenhammar superrime communicata.

♂. Magnitudo, statura, formatio partium & tarsorum pictura omnino ut in *G. unguicella* n:o 4, cui proxime accedit, sed verticis, thoraciis abdominalisque colore obscuro nimis recedit; locus etiam natalis ambabus aliis. Nitens. Vertex & occiput cinereo-nigra. Frons antice indeterminate pallida. Antennæ rotundatæ, pallide flavæ, seta nudiuscula, fusca. Facies minime prominens. Epistoma infra oculos non descendens, albidum,

aeta mystacia, utrinque unica sat distincta. Partes oris retractæ, flavæ. Genæ brevissimæ. Oculi magni rotundi. Thorax & scutellum tota cinereo-nigra. Abdomen angustum, subcylindricum, nigrum, ventre saltem basi anguste rufescente. Alæ cinereo-hyalinæ, immaculatæ, nervis nonnihil minus approximatis quam in *G. ungvicella*. Halteres albidæ. Pedes cum coxis toti pallide flavi, articulo tarsorum ultimo tantum nigro. Femora antica reliquis paullo validiora.

182. DIASTATA Meig.

*Corpus minutum, oblongum, opacum, glabriculum, setis in vertice, thoracis lateribus scutellique margine distinctis; molle. Caput rotundatum, subtransversum. Frons latissima praesertim posterius, antice minime prominula. Epistoma latum, infra oculos parum descendens, subimpressum, seta mystacia utrinque unica distincta. Antennæ brevissimæ, deflexæ, articulo ultimo compresso ovato l. ovali subotuso, basi seta dorsali breviter, sed sat dense plumata. Oculi majusculi, rotundi, nudi. Scutellum margine 4-setosum. Abdomen elongatum, segmentis 5 distinctis. Alæ elongatae, modice angustatae, parallelæ, rectæ, hyalinæ, in nostris speciebus saltem ad nervum transversum ordinarium sepiissime infuscatae. Nervi ut in *Geomyza* directi, at transversi paullo magis remoti, horum nempe ordinarius fere in medio alæ & areæ ultimæ insertus, medius vero nonnihil magis ad basin alæ retractus apicique auxiliaris oppositus. Costa subnuda raro ciliata. Squamæ rudimentariae. Halteres nudi. Pedes simplices, parum setulosi. Color cinerascens l. griseus. Motus & habitatio ut in *Geomyza*. Differentia sexus; mas: abdomine angustiore, leniter subclavato, ano obtuso; femina: ano acutiore. Typus generis: *Diastata nebulosa*. (A *Geomyza*, cui valde accedit, vix nisi nervis transver-*

sis non nihil magis remotis discernitur *Diastata*. Hoc vero nota interdum etiam vacillat, unde species *Geomyzæ* & *Diastata* sepe agre distinguuntur, & forte sub uno tantum genere comprehendi debent).

1. *D. nebulosa*: cinerea, fronte, antennis pedibusque testaceis; epistomate albido; abdominis segmentis basi obscuris; alis fuscans; disco maculis duabus nigricantibus totidemque albis. ♂♀. (Long. circiter 1 $\frac{1}{4}$ lin.).

Meig. Dipl. 6. 99. 12. forte? — Macq. Buff. 2. 551. 9? — *Geomyzza nebulosa* Fall. Geomyzid. 3. 4. ♂♀. genuina. — Zett. Ins. Lapp. 774. 4. ♂♀. — An quoque *Diastata ornata* Meig. l. c. 98. 11. & Macq. l. c. 553. 8? — *Geom. obscurella* Zett. Ins. Lapp. ex parte (specimen nempe Nordlandicum ad Finkrog).

Hab. in pratis paludosis; per Scandinaviam a medio mensis Maii usque ad finem Augusti, mihi passim obvia, in copula quoque deprehensa; scilicet in Scania ad Söfåkra, Lindholmen, Tranås; Esperöd &c.; haud raro; in Smolandia, mus. *Ljungii*; in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*, & ad Lärketorp, ipse; in Gotllandia ad Rhone parce; in Helsiugia ad diversorium Kårböle; in Bottnia boreali ad Karungi semel; in Lapponia Tornensis rarissime; in infer-alpinis Nordlandiae Norwegicæ ad diversorium Finkrog quoque rarissime. (E Finlandia a Prof. *Sahlberg*; & ex Austria a D. *Andersch* communicata, Mus. *Falleni*).

♂♀. Opaca. Frons lutea, vertice sat fortiter setoso. Antennæ luteæ, articulo ultimo præsertim versus apicem sepe fuscescente, seta nigricante, in medio evidenter licet non longe plumata. Epistoma flavido-albidum. Prælabrum plerumque prominulum, Palpi pallidi. Proboscis fusca. Seta mystacina utrinque

unica distincta nigra, sub qua setulae plures valde exiguae. Thorax latitudine capitis, saepe obscurus, sed in illæsis cinerascentes, lineolis 2 dorsalibus fuscis, interdum obsoletis. Pleurae glaucescentes. Abdomen plerumque (in detritis) nigricans, subnitens, sed in bene conservatis brunneum, segmentorum marginæ apicali canescens. Segmenta abdominis 5 distincta, sed in ♀ nuper capta 6 numeravi, quorum primum & ultimum minora. Alæ fuscane; in disco longitudinaliter maculae 4 subquadrate, quarum 2 nigricantes nervos transversos transeunt ad nervos longitudinales 3 & 5 extensæ, & 2 albo-hyalinæ cum nigricantibus ita alternantes, ut una inter maculas nigras & altera paullo longior immediate pone maculam posteriorem nigram sint sitæ. Costa basi distincte sed breviter, pone apicem nervi auxiliaris parce & tenuissime setulosa. Haec setulae facile deteruntur, ita ut costa, plerumque nuda appareat. Alæ etiam basi obscuræ. Halteres flavo-albidi. Pedes l. lutei l. testacei, femoribus præsertim anticus interdum fuscioribus. Coxæ cinerascentes. Tarsorum articulus ultimus obscurus.

Obs. Meigen & Macquart l. c. antennas *Diast. nebulosæ* "basi nigras" describunt; in nostris autem speciminiis iisque pluribus, inter quæ etiam Falleniana typica deprehenduntur, antennæ saltem basi semper flavæ, versus apicem vero interdum fuscescentes inveniuntur. *Diast. ornata* Meig. igitur *D. nebulosæ* Fall. magis accedere videtur.

2. *D. unipunctata*: cinerea, fronte, antennis pedibusque obscure testaceis; epistomate albido; ab domine nigro; aliis cinereo-hyalinis, macula basali, nervoque transverso ordinario late, fuscis. ♂♀. (Long. circiter $1\frac{1}{4}$ lin.).

Stenhamm. in litteris.

Hab. in Scandinavia meridionali & media ab ineunte Junio usque ad finem Augusti minus frequens; scilicet in Scania ad Esperöd (in paroecia Tranås) ultrumque sexum mense Julio 1820 inveni, deinde ad Silfåkra specimena quoque deprehendi; in Ostrogothia ad Gusum, D.

D. Stenhammar & Wahlberg; è Daania semina sita unico individuo a D. Stæger missa.

♂. Priore proxima & similis, sed antennis pedibusque saturati luteis, abdomine nigro immaculato, ut & alarum tantum nervo transverso ordinario infuscato, vere diversa. Caput ut in praecedente constructum & setosum. Frons lutea. Antennæ luteæ, articulo ultimo saepe fuscescente; seta ut in *D. nebulosa* brexiter plumata. Thorax & scutellum cinereo-grisea. Pleurae glaucescentes. Abdomen nigrum, subnitens; segmentis 5 distinctis. Alæ sordide hyalinae, macula basali ad nervum auxiliarem fusca. Nervus transversus ordinarius fuscedine late & distincte pinetatis, quæ fuscedo paullo supra nervum transversum & sere ad nervum longitudinalem 3:tiū extenditur. Nervus transversus medius immaculatus, at costalis niger. Costa ut in priori tenuissime setulosa. Halteres albi. Pedes ferrugineo-fusci, femoribus saepe obscurioribus. Coxæ cinerascentes.

Obs. Sub nomine: *Geomyza maculipennis* exempla inter amicos entomologicos olim divulgavimus.

3. *D. Punctum*: grisea, fronte antennarumque obscurarum basi luteis; epistomate albido; vertice fusco-bimaculato; abdomine nigro, basi macula flavida; pedibus pallide flavis; alis fuscis, plaga posteriori hyalina. ♂. (Long. circiter 1 lin.).

Meig. Dipt. 6. 98. 10. Macq. Russ. 2. 553. 3. (e Meigen ut videtur transcripta).
Hab. in Dania; ex Hafnia a Nobiliss. Stæger in tribus exemplis mecum benigne communicata.

♂. Antennis longiusculis obscuris, abdominalis basi lutescente apiceque albo, ut & pictura alarum, ab aliis abunde dignota. Frons lutea, vertice maculis 2 coherentibus obscuris. Antennæ longiusculæ (non vero apicem epistomatis attingentes), nigro-brunneæ, basi lutescentes, seta pubescente obscura. Epi-

stoma flavo-album. Thorax griseus, lineis dorsalibus 4 brunneis, horum lateralibus obsoletis. Calli humerales pallescentes. Pleurae glaucescentes. Scutellum griseum. Abdomen i ♀ subdepressum, in utroque sexu nigricans subnitens, basi macula lutescente vix ad marginem apicalem segmenti 2:di extensa, interdum obsoleta. Anus puncto albo. Alae fuscæ, plaga pone medium disci (h. e. pone nervum transversum ordinarium) a nervo 3:tio longitudinali ad marginem interiore dilatata, albido-hyalina. Costa nuda. Pedes toti cum coxis pallide flavi.

D. costata: cinerea, fronte, antennis pedibusque flavis; epistomate albido; abdomine nigro; alis cinereo-hyalinæ, macula baseos ad costam fusca, nervo costali atro. ♂♀. (Long. sere 1 lin.).

Meig. Dipt. 6. 96. 4. Macq. Buff. 2. 533. 4. *Drosophila fuscula* Fall. Geomyz. 7. 8. ♂♀. certe. — *Drosophila marginella* Zett. Ins. Lapp. 777. 10. ♂♀.

Hab. in Scandinaviae graminosis passim; a Junio ad Octobrem obvia; scilicet in Scania ad Lund, Björnstorps, Tranås, Esperöd, &c., ipse, ad Kjeflinge & Lackalänga, D. Dahlbom; in Smolandia, D. Boheman (1835); in Ostrogothia ad Gusum, Lärketorp, Wadstena &c., sat frequens; in Westrogothia ad Gothoburgum; in Gotlandia parce; in Uplandia ad Holmiam, D. Wahlberg; in Lapponia Umensi ad Stensele, rarissime; in Nordlandia Norwegica ad Schiervæ semel; in Dania mense Aug. aliquoties a D. Stæger etiam lecta mihi sub nomine descripto missa.

♂♀. Per antennarum setam sat distinete licet non longe plumatam, & alas præter maculam basalem juxta costam fuscam nervumque costalem atrum immaculatas, a prioribus, facile dignoscitur. Frons flava. Antennæ breviusculæ flave, articulo ultimo ovali, superne ciliato, seta mediocriter l. potius breviter,

plumata, obscure. Epistoma album. Proboscis testacea. Oculi magni, rotundi; in viva lute rufo l. ferruginei. Thorax & scutellum griseo-cinerea immaculata. Pleurae glaucescentes. Abdomen nigrum; in ♂ subcylindricum, ano subclavato. Alae cinereo-hyalinae immaculatae præter interstitium inter nervum auxiliarem & costam fuscum l. nigricans. Nervus costalis a basi ad apicem ater; nudus, basi tantum ciliatus. Setulae costæ ad apicem nervi auxiliaris perspicue. Halteres albi. Pedes cum coxis pallide flavi, immaculati. — A. *Drosophilā costata* n:o 6, cui similis, nervis transversis magis remotis & antennarum seta brevius plumata distinguitur.

Var. b. ♂. simillima varietati a., sed costa tota a basi ad apicem alba umbra fusca anguste tincta & nervo transverso ordinario suscedine modice late cincto diversa. — *Diast. obscurella* Meig. valde similis videtur, sed antenæ in nostra tota flavæ, nec apice brunneæ, & seta distinctius plumata. — Specimen descriptum ut "Diast. costata" Meig. ♂ a D. Stager e Dania missum.

410. 5. *D. obscurella*: griseo-cinerea, fronte, capiteque pedibusque flavis; epistomate albido; abdomine nigro; alas cinereo-hyalinis, nervis transversis distincte infuscatis. ♂♀. (Long. vix 1 lin.).

Geomyzza obscurella Fall. Geomyz. 4. 6. ♂♀. typica. — Zett. Ins. Lapp. 774. 5. e parte. — (Vix *Diastata obscurella* Meig. Dipt. 6. 96. 3? quam sub forma variante *Diastata costata* potius quærere vellem).

Hab. in aridis & arenosis libenter ad littora maris & lacuum per Scandinaviam meridionalem & medium mensse Julio passim, in copula quoque visa; scilicet in Scaniæ litoribus marinis & arenosis ad Lomma, Malmogiam, Limhamn, Sandhammar, Esperöd, Raslunda &c., frequens; sed etiam in campis aridis Scaniæ interioris ex. gr. ad Lund, Fogelsång, Abusa, Kjeflinge &c. non raro; in Ble-

kingia ad Carlserona, C. *Aspegren*; in Ölandia ad Gärds-lösa; in Smolandia, D. *Bohemæ*; in Ostrogothia ad Gu-sum, D. *Wahlberg*, & prope Wadstena ad ripas lacus Vettërn sat frequens, saepe etiam in copula observata; supra hanc provinciam versus septentrionem vix nisi rarissime inventa; ex Hafnia a D. *Stæger* communicata (Ad Jungfern-Heide & Moabite prope Berolinum 6 Aug. 1842 a D. *Dahlbom* lecta. Ut "Diasta obscurella Macq." e S:t Sever Galliæ etiam a D. *Leon Dufour* par in copula junctum missum).

♂♀. In hoc genere sere minima. Pedibus pallidius flavis & nervis transversis distincte infuscatis a prioribus dignoscitur. Opaca. Frons flava, orbitis oculorum albidis. Antennæ modice breves, flavæ, seta nudiuscula, obscura. Epistoma albidum. Seta mystacina utrinque unica, nigra. Oculi rotundi, in *viva* purpurei, æneo-micantes. Thorax setosus & scutellum griseo-cinerea, immaculata. Abdomen 6-annulatum, dorso nigrum, subnitens, ano maris cinereo-cano. Alæ cinereo-hyalinæ, nervis obscuris; ima basi albescentes. Nervi transversi remotiusculi late infuscati. Ad apicem nervi auxiliaris umbra fusca. Apex nervorum longitudinalium 2, 3 & 4 suscedine etiam plerumque anguste cingitur. Costa ciliata. Halteres albidæ. Pedes pallide flavi, tarsorum articulo ultimo obscuro. Variat femoribus anticus leniter infuscatis.

183. DROSOPHILA Fall.

Corpus parvum aut minutum, oblongo-ovalum, parum l. raro nitidum, glabriulum, setis ordinariis in vertice, thoraci late ribus, scutellique margine quatuor, distinctis vestitum. Caput

rotundatum, subtransversum. Frons latissima præsextim posterius, antice non prominula. Epistoma latum, perpendicularare, infra oculos parum descendens, pro antennarum receptione bi-impressum, seta mystacina utrinque unica distincta, sub qua setula quædam valde exiguae. Genæ parum elongatae. Antennæ incumbentes, breviuscule, articulo ultimo oblongo-ovato, basi seta dorsali longe & vage plumata, radiis nempe distantibus. Oculi rotundati nudi, in viva ferruginei l. plerunque late rubi, unicolores. Abdomen oblongo-ovatum, 6-annulatum. Alæ longi scutæ, modice latæ, parallelæ, rectæ, hyaline, immaculatæ, raro nervis transversis infuscatis, remotis, interdum approximatis. Nervus auxiliaris simplex vix 4:am partem costam attingens (in *D. annulata* n:o 2 longior). Costa nuda. Spinula parva adest. Squame rudimentariæ. Halteres nudi. Prædes mediocres, simplices, nudiusculi, præter femora antica subtus semper parce pilosula. Color niger, griseus, pallidus. Motus haud agilis. Volatus abruptus, insecto ante locum quieti aptum in aëre pendulo. Incessus latus & gravis; attactæ vel inquietæ motu saltatorio ausugere semper tentant imagines. Habitat in graminosis, locis umbrosis humidis, in fungis; spucum exstibillantem arborum avide querunt; in fenestræ etiam interdum tardæ reptantes, larvæ in fungis non putrescentibus, fermentis &c. degunt. Differentia sexus; mas: ano obtuso; femina: ano acutiore. Typus generis: *Drosoph. funebris* n:o 17.

Conspectus Specierum cum Synonymis.

A. Alarum nervi transversi approximati aut subapproximati, h. e. nervus transversus ordinarius distincte & tam longe ante medium areæ ultimæ insertus, ut segmentum nervi longitudinalis 4:ti secundum tertio (*) triplo aut saltem duplo brevius evadat.

*) quod per *segmenta* nervi longitudinalis 4:ti secundum & tertium intelligatur, conferatur nota sub *Ephydra* p. 1809 hujus operis.

*) thorace obscuro, h. e. cinerascente l. nigricante (in *Dr. obscura* n:o 4 obscure testaceo).

1 variegata Fall. ♂♀. **2 annulata** Zett. (*Notiphila eadem* Fall. *Ephydra eadem* Meig.) ♂♀. **3 albo-guttata** Wahlb. ♂♀. **4 obscura** Fall. (an Meigeni eadem?) ♂♀. **5 spurca** Zett. n. sp. ♂. **6 cinerella** Fall. ♀. **7 costata** Zett. Ins. Lapp. ♂♀.

**) thorace pallescente, ferrugineo aut testaceo (*Dr. obscura*: thorace obscure testaceo, in subdivisione priori sub n:o 4 quærenda).

† alarum nervis transversis infuscatis.

8 transversa Fall. Meig. (*D. phalerata* Meig. varietas hujus videtur) ♂♀ & var. b. *laeta* ♀.

†† alarum nervis transversis non infuscatis.

9 tristis Fall. (an Meigeni eadem?) ♂♀. **10 fuscimana** ♂. **11 nigritruncata** Zett. n. sp. ♂♀. **12 approximata** Zett. n. sp. ♀. **13 congesta** Zett. n. sp. ♂.

B. Alarum nervi transversi remoti aut subremoti, h. e. nervus transversus ordinarius aut in medio aut tantum paullo ante medium areæ ultimæ insertus, atque ita ductus, ut segmentum nervi longitudinalis 4:ti secundum tertio aut æque longum aut ad summum $1\frac{1}{2}$ brevius evadat.

α) thorace obscuro, h. e. cinerascente l. nigricante.

14 *glabra* Fall. ♂♀. 15 *Graminum* Fall. (var. a., b. *sordida*, c. *flavipennis* Zett. Ins. Lapp. — An etiam *D. incana* Meig.?) ♂♀ (*). 16 *griseola* Zett. n. sp. ♀. — (**).

β) thorace pallescente, h. e. rufa, testaceo aut flava.

17 *funebris* Fabr. Fall. (*Musca cellaris* Linn., testante Meigen. — *Musca erythrophthalma* Panz.?) ♂♀. 18 *confusa* Stæg. (*Dr. fenestrarum* Meig. non Fall. — *Dr. funebris* var. ♂ Fall.) ♂♀. 19 *Histro* Meig. 20 *picta* Stæg. ♀. 21 *Fenestrarum* Fall. (var. a. b. — *Dr. melanogaster* Meig. ♂. *Dr. virginea* Meig. ♀.) ♂♀. 22 *flava* Fall. ♂♀. 23 *pallida* Zett. (*Dr. graminum* var. d. Fall.) ♂.

Drosophila.

A. Alarum nervi transversi approximati aut subapproximati, h. e. nervus transversus ordinarius distincte ante medium arem ultimæ insertus, ita ut segmentum nervi longitudinalis 4:ti secundum tertio triplo aut saltem duplo brevius evadat.

*) thorace obscuro, h. e. cinerascente l. nigricante (in *D. obscura* n:o 4 obscure testaceo).

1. *D. variegata*: cinerea, thorace lineis subquadratis brunneis; capite albicante, fronte flava, macula verticis

*) *Drosophilam graminum* var. d. Fall. distinctam speciem putamus sub nomine: *D. pallida* n:o 23 infra inveniendam.

**) *Dr. fuscula* Fall. antennarum seta breviter plumata sub *Diastata costata* hujus operis p. 2539 n:o 4 quarenda.

nigra; antennis testaceis; ab domine obscuro, maculis dorsibus flavo-albis; pedibus pallidis, femoribus late tibiarumque annulis fusca; alarum nervis transversis perspicue approximatis. ♂♀. (Long. circiter $1\frac{1}{2}$ lin.).

Fall. Geomyzid. 5. 2. ♂♀. Meig. Dipt. 6. 82. 1. (e descriptione Falleni transcripta). — Macq. Buff. 2. 548. 1. ♂♀.

Hab. in graminosis, soliis fruticum, succo exstillante Quercus, fungis Populi tremulæ, &c., per Sveciam meridionalem & medium, a medio Junii usque ad finem Augusti mihi passim obvia; scilicet in Scania ad Krageholm, Tranås, Esperöd (12—19 Aug. 1846, Profess. *Wahlberg*), parce; in Ostrogothia ad Gusum, idem *Wahlberg*, ad villam Lärketorp in paroecia Mjölby sat frequenter, ipse.

♂♀. Inter nostrates maxima. Opaca. Frons flava, macula verticis magna trigona nigra. Setæ verticis nigrae. Antennæ testaceæ, seta obscura peclinata, superne radiis 4—5. Epistoma albidum, carina media sæpe fusca. Seta utrinque mystacina nigra, sub qua setulæ plures exiguae. Prælabrum prominulum. Proboscis sæpe fusca. Oculi magni tota capitis latera impletæ, in viva late rufi. Thorax cinereus, lineis 5 brunneis, quarum lateralibus minus regularibus, maculiformibus. Scutellum fuscum cano-maculatum. Abdomen ovatum nigro-fuscum, segmento 1:mo fascia interrupta albida, segmentis vero 2, 3 & 4 ad basin singuli in medio maculis semi-rotundis in viva albidis, in mortua plerumque flavis. Alæ cinereo-hyalinæ immaculatæ. Nervus auxiliaris vix ad 4:iam partis costæ nudæ extensus. Segmentum costæ 2:dum 1:mo saltem duplo longius, 3:ium 2:do saltem duplo brevius. Nervi longitudinales: 3:ius in apice alæ desinit, 3:ius 4:tusque versus apicem leniter convergentes, 5:tus ad marginem extensus, 6:tus nullus 1. valde abbreviatus, 7:imus ad basin alæ fere ad marginem productus.

Nervi transversi perpendiculares, eximie approximati; obscuri, hocum medius sat longe pone apicem auxiliaris ductus. Segmentum nervi 4:ti longitudinalis secundum tertio seu ultimo triplo & ultra brevius. Halteres pallidi. Pedes subnudi, mutici, pallide flavi, coxis antlicis femoribusque omnibus a basi & fere ad apicem nigro-fuscis. Tibiæ omnes singulæ annulis 3 fuscis, quòrum 1 ad basin, 1 in medio, & 1 ad apicem.

Var. b. ♀. tota pallida, signaturis verticis, thoracis, abdominis pedumque dilute brunneis; junior, nuper exclusa, in gramine ad Esperöd Scaniae 28 Aug. semel a me inventa.

Obs. Sub nomine: "Dros. maculata Duf." e S:t Sever Gallia pluræ specimina, & horum quedam e pupa cylindrica nuda ferruginea exclusa, nuper a Nobiliss. D. Leon Dufour obtinut, *D. variegata* affinia & subsimilia ejusque magnitudine; sed antennis longioribus, macula verticis nigra deficiente, thoraci dorso argenteo-micante immaculato, pectore scutelloque pallidis, hoc puncto utrinque nigricante, abdomen flavo, segmentis 1:mo immaculato, 2:do puncto utrinque nigricante, 3, 4 & 5 angulo maculis tribus subconfluentibus nigro-brunneis, alio magis hyalinis, nervis transversis modice, nec eximie approximatis, ut & pedibus pallide flavis immaculatis, abunde dignota. Nec talis in Scandinavia occurrit.

D. annulata: cinerea; thorace sublineato; epistomate albicante; antennis sulphureis, basi nigris; abdome nigro, punctis lateralibus albis; pedibus pallidis, femoribus late tibiarumque annulis fuscis; alarum nervis transversis perspicue approximalis, auxiliari longiusculo. ♂♀. (Long. vix $\frac{3}{4}$ lin.).

Notiphila annulata Fall. Monogr. Act. Holm. 1813. p. 250. 3. ♂♀, vera, & Ejusdem Hydromyzid. Svec. 9. 3. ♂♀. *Ephydra eadem* Meig. Dipt. 6. 114. 1. Macq. Buff. 2. 536. 1 (e descriptione Meigeniana transcripta).

Hab. in succo distillante Populi, Betulae, at imprimis Quercas, per Sveciam præserim medium mense Julio minus frequens, in copula etiam observata; scilicet in Ostrogothia in prato sylvatico Krogängen prope Wadstenæ, D. *Dahlbom* & ipse, ad Gusum, D. *Wahlberg*.

♂♀. Priori proxima, sed triplo minor & in multo recedit, atque antennis tuberculatis insignis. Frons cinerea. Antennæ basi nigrae, articulo 2:do in corniculum superne extenso, 3:to flavo, seta distincte plumata, concolore. Epistoma albido-flavum, in medio carinatum, setulis oris exiguis. Oculi majusculli. Thorax opacus, cinereus, lineolis 3 ferrugineis l. fuscis, saepè obsoletis. Abdomen ovatum, subdepressum, nigricans, subnitens, ad basin segmentorum utrinque puncto laterali minuto albo l. argenteo. Alæ cinereo-hyalinæ, nervis pallescentibus, ut in priori directis, at auxiliari longiori fere ad medium costæ extenso, cuius apici nervus transversus medius opponitur. Halteres pallidi. Pedes subnudi (præter femora antica subtus subtiliter pilosula), pallidi, femoribus a basi & fere ad apicem, tibiarum annulis 2, quorum uno basali altero apicali, tarsorumque articulo ultimo, obscure brunneis. Genua omnia & annulus angustus femorum posteriorum flava. Annulus femorum posticorum flavus interdum parum perspicuus. — An novum genus?

Obs. Sub nomine: "*Dros. cornigera*" eliam a D. Prof. *Wahlberg* haec olim missa.

D. albo-guttata: nigra nitida, capite concolore, epistomate inferne thoracisque callis humeralibus punctoque utrinque subalari argenteo-niveis; antennis basi rufescientibus; proboscide flava; pedibus pallidis; alis immaculatis, nervis transversis approximatis. ♂♀. (Long. vix $\frac{3}{4}$ lin.).

Wahlba. Act. Acad. Scient. Holm. 1838. p. 22. II. ♂.

Hab. in Svecia meridionali & media valde rara; in Scania ad Esperöd in graminosis die 16 Septemb. 1818 feminam delegi; in Ostrogothia ad Ursäter prope Gusum in succo stillante Quercus die 21 Jun. 1837 a Cel. Prof. Wahlberg etiam deprehensa nihilque amicissime communicata.

♂. Colore corporis nigro nitido, & epistomatis margine apicali thoracisque punctis humeralibus albis, ab aliis facile dignota.

Notiphilæ nigrinæ p. 1887 quodammodo affinis & similis,

Drosoph. glabra forma & magnitudine æqualis. Ovata. Frons modice lata, nigra, opaca, postice nitens. Antennæ breviuscule, apice rotundatæ, basi rufescentes, articulo ultimo nigro-fusco, seta pectinata, radiis paucis. Epistoma infra oculos parum descendens, lenissime emarginatum, in medio obtuse carinatum, infra medium argenteo-niveum, superne sub antennis determinate nigrum. Setula mystacina in individualis a me visua exigua. Instrumenta ciliaria retracta. Proboscis pallida. Palpi nigri. Genæ brevissimæ, pallide. Oculi maximi tota capitis latera occupantes. Thorax magnus, convexus, niger, nitidus, supra brevissime fusco-subpuberulus, mæulis utrinque 2 lateralibus subrotundis argenteo-niveis, anteriore majori humerali, posteriori minuto punctiformi sub radice alarum. Scutellum nigrum. Abdomen ovatum subdepressum nigrum, nitidum. Alatiusculæ, hyalinæ, certo luminis situ tricolores, nervis pallidis, fere ut in prioribus directis, at transversis vix tam perspicue approximatis. Nervi auxiliaris brevis simplex, transversi modice approximati, horum mediis mox pone apicem auxiliaris duetus, ordinarius a margine sat longe remotus. Segmentum nervi longitudinalis 4:ti secundum tertio seu ultimo $2\frac{1}{2}$ brevius. Costa nuda & spinula nulla. Halteres clava alba. Pedes mutici flavi, femoribus anticis supra dilute fuscis, subtus pilosulis. Femora postica versus apicem interdum etiam dilute brunnea.

Drosophila obscure fusca, capite conicolore, epistomate cinerascente; antennis nigris, basi rufescensibus; abdome nigricante; pedibus ferrugineis; alis subimmaculatis, nervis transversis modice approximatis. ♂♀. (Long. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin.).

Fall. Geomyz. 6. 6. ♂♀. vera. — Meig. Dipt. 6. 85. 11? Macq. Buff. 2. 550. 7? Zett. Ins. Lapp. 776. 4. ♂♀.

Hab. in succo exsudante arborum Betulæ & Quercus, per Scandinaviam, a fine mensis Maji usque ad Augustum, passim; scilicet in Scania ad Lindholmen, Esperöd &c., minus frequens; in Ostrogothia ad Gusum, Wadstenæ, Lärketorp &c., haud paree; in Westrogothia, beat. Gyllenhal; in Uplandia ad Holmiam, D. Wahlberg; deinde vix nisi in betuletis ad Öfver-Torneå mihi obvia; e Dania a D. Stæger communicata.

♂♀. Corpore fusco, antennis parvis abdomineque nigricantibus, pedibus testaceis, aliquæ brunneidine lenissime tinctis, nervis transversis subapproximatis, in hac subdivisione dignoscitur. Parva. Parum nitida. Frons obscura. Antennæ parvæ nigrae, articulis basalibus plerumque rufescensibus, seta undique & distincte plumata. Epistoma in illæsis cinerascens, in mortuis & detritis sepe fuscum. Setulæ mystacinae parvæ, sed perspicuæ. Oculi magni, rotundi. Thorax obscure fuscus, lineis dorsilibus 3 obscurioribus, in individuis non bene conservatis parum perspicuis; in junioribus plus minus fusco-testaceus. Scutellum fuscum. Abdomen ovatum, brunnescenti nigrum; subnitidum. Alæ latiusculæ, sordide hyalinæ, certo situ iricolores, nervis brunneis 1. ferrugineis, ut in priori directis, at segmento nervi longitudinalis 4:1 secundo tertio tantum duplo breviore. Costa nuda; spinula minuta. Halteres albidæ. Pedes jam rufescentes, jam fusco-testacei, jam pallidiores, tarsis apice obscuris.

Obs. Meigen & (secundum illum) Macquart caput & thorax hujus speciei "testacea" describunt; in nostris vero exemplis, iisque multis, haec partes fuscæ vel obscure testacea comprehenduntur, unde synonyma dubia.

D. spuræ nigricans, capite antennisque concoloribus; abdomine nigro; tarsis posticis obscure testaceis; alarum costa posterius infuscata, nervis transversis modice approximatis. ♂. (Long. $\frac{3}{4}$ lin.).

Hab. in Dania forte rarissime, mibi in Svecia non obvia, sed a D. Stæger sub nomine: "*Dros. tristis* Fall.", in unico specimine communicata.

♂. Valde similis *Dr. tristi* n:o 9. eademque pictura alarum gaudens, sed toto corpore obscuriore, nec thorace brunneo-testaceo, & pedibus nigris, nec flavis, tarsis posticis tanum ferrugineis, differt. Opaca. Caput nigricans, vertice setoso. Antennæ nigrae, seta mutilata. Epistema infra oculos parum descendens; seta utrinque mystacina nigra. Os retracum. Oculi magni, rotundi. Thorax convexus nigricans & cinereus, setis lateralibus & posticis nigris. Scutellum concolor. Abdomen oblongo-ovatum, nigrum, nitidum. Alæ cinereo-hyalinæ, costa a medio ad apicem alæ perspicue fusca, suscedens ad nervum longitudinalem 3:tiūm descendente. Nervi transversi obscuri, horum medius apicis auxiliaris brevis oppositus. Segmentum nervi longitudinalis 4:ti secundum tertio circiter $1\frac{1}{2}$ brevius. Nervus costalis subnudus. Halteres albidi. Pedes nigricantes, tarsis posticis obscure testaceis & obscure ferrugineis. Tarsi anteriores eliam subsfuscantes.

Obs. E Finlandia a D. Prof. Sahlberg obtinui specimen nostrum *D. spuræ* magnopere simile, sed alarum suscedo costalis ab apice nervi auxiliaris ad apicem nervi longitudinalis 2:di extensa & tantum interstitium nervi costalis & longitudinalis 2:di implens, ut & pedes toti nigro-picei, tarsis posticis vix dilatioribus, tandemque ni fallor, halteres obscurei, alias omnino speciem produunt.

D. cinerella: cinerea, fronte antennisque lutescentibus, epistomate albescente; abdomine nigro; pedibus obscuris, tarsis flavis; alis cinereo-hyalinis, nervis transversis modice approximatis. ♀. (Long. circiter $\frac{1}{2}$ lin.).

Fall. Geomyz. 7. 9. ♀. verissima (secundum individuum typicum in museo Falleni asservatum). — Meig. Dipt. 6. 88. 19. (e descriptione Falleniana transcripta).

Hab. in graminosis Sveciae meridionalis & mediae rariissime; duo tantum specimenia lustravi, unum in Scania ad Esperöd d. 20 Jul. 1820 captum, alterum in Ostrogothia ad Wadstena 28 Jul. 1824 a me inventum.

♀. Per thoracem cinereum immaculatum, frontem antennasque luteas, pedes nigricantes, tarsis tantum flavis, a praecedentibus optime dignoscitur. Pusilla, opaca. Frons in specimine (vetustiore) Scanico lutea, in Ostrogothico obscure lutea. Vertex setulosus. Antennae parvae, lutescentes, seta fusca pectinata, radiis superne 5—6. Epistoma infra oculos vix l. parum descendens, albo-micans l. canum, in medio subcarinatum, prælabro perspicue prominente cinereo. Setulæ mystacinæ perspicue. Partes oris retractæ, obscuræ. Genæ brevissimæ, albicanter. Oculi magni, rotundi. Thorax cinereus, ad latera & postece ut in prioribus setulosus. Scutellum concolor. Abdomen oblongo-ovatum, subdepressum, nudiuseculum, nigrum, nitidum, apice subacutum. Alæ cinereo-hyalinæ, nervis fuscis, costali nigro. Nervi transversi modice approximati, horum ordinarius fere ante medium alæ insertus, a margine sat longe remotus, medius ad basin alæ retractus, minutus, apici nervi auxiliaris brevissime oppositus. Costa a basi ad exitum nervi auxiliaris ciliata, deinde nuda. Segmentum nervi longitudinalis 4:ti secundum tertio circiter $2\frac{1}{2}$ brevius. Halteres albi. Pedes nigricantes, tarsis omnibus pallide flavis. — Alarum nervus costalis paullo pone apicem alæ desinens ibique cum quarti longitudinalis apice conjunctus. Affinis *Notiphilæ*. ♂ deest.

nigricans, fronte concolore; epistomae nigrae; antennae pedibusque flavis, horum anticeis nigris coxis pallidis; alis hyalinis, nervis pallidis, costali crassiusculo atro, transversis modice approximatis. ♂♀.
(Long. $\frac{3}{4}$ sere. 1. lin.).

Zett. Ins. Lapp. 776. 5. ♂♀.

Hab. in graminosis & fungis Betulæ albæ &c., per Sveciam medium & borealem parcus, per Lapponiam passim frequens, ab ineunte Julio usque ad medium Septembris mihi obvia & in copula etiam deprehensa; scilicet in Scania boreali ad Widtskölle semel; in Smolandia ad Skärsjö rarissime, Ljungb.; in Ostrogothia ad Gusum & Wadstena, rarius; in Uplandia ad Holmiam, D. Wahlberg; in Lapponia Umeni non rara ex. gr. ad Åsele, Stöttingsfjellet, Tresunda, Wilhelmina & Umeås, usque in alpes Brattiksfjellen adscendens; in Lapponia Toruensi parco, ad lacum Torneträsk procedens; in inferalpia Nordlandiæ Norvegicæ laetum in monte subalpino Gamsttind a me lecta.

♂♀: Thorace fronteque obscuris, antennis pedibusque flavis, anticeis nigricantibus, ut & alarum nervo costali subcarasso atro, a prioribus facile dignoscenda. Oblonga, subopaca. Frons obscura, sœpe detrita nigra, ad latera & postice setis ordinariis vestita. Antennæ breves subrotundatæ, seta distincte plumata obscura. Epistoma breve, infra oculos haud descendens, subecarinatum, albidum, in detritis area media sœpe albo-flavum. Prelabrum occultum. Setula mystacinæ nigrae. Instrumenta cibaria retracta, testacea. Genæ brevissimæ, albæ. Oculi majusculi rotundi ferruginei. Thorax & scutellum obscuræ cinctæ l. nigricantia, setis ordinariis ornata. Abdomen oblongum, nigrum, nitens. Alæ elongatæ, subangustatae, albo-hyalinæ, nervis tenuibus pallidis, 2 & 3 longitudinalibus versus apicem

obscerioribus & interdum leniter subfuscatis. Nervus costalis crassiusculus nudus ater. Nervi transversi approximati, horum ordinarius longe a margine remotus, medius auxiliaris medioeriter longi apici oppositus. Segmentum nervi longitudinalis 4:ti secundum tertio circiter $\frac{1}{2}$ brevius. Halteres albi. Pedes pallide flavi, antici brunneo-nigri, coxis anticis albo-flavis. — A *Diastata costata* p. 2539 n:o 4, cui similis, fronte obscura, antennarum seta longius plumata, alis basi immaculatis, nervis transversis minus remotis, nec non femoribus tibiisque anticis nigris, abunde dignoscitur. A *Dros. fuscimana* n:o 10 fronte thoraceque testaceis diversa.

** thorace rufescente, ferrugineo aut testaceo (*Dr. obscura*: thorace obscure testaceo, in subdivisione priori sub n:o 4 invenienda).

† alarum nervis transversis fuscedine cinctis.

8. *D. transversa*: rufo-testacea, nitida, epistomate pedibusque pallidioribus; ab domine flavo, serie subquadriplici punctorum nigrorum; alarum nervis transversis subapproximatis, fuscedine cinctis. ♂♀. (Long. $\frac{2}{3}$ —1 lin.).

Fall. Geomyz. 6. 5. ♂♀. Meig. Dipt. 6. 84. 5. Macq. Buff. 2. 549. 5. Zett. Ins. Lapp. 776. 3. ♂♀. *Drosoph. phalerata* Meig. Dipt. 6. 83. 3. T. 59. f. 3. varietas hujus videtur.

Hab. in graminosis (libenter locis umbrosis), fungis pulridis, senestris, &c., per prata, hortos, pascua & domos Scandinaviæ, ab initio Junii usque ad initium Octobris, sat vulgaris; nempe in Scania ad Lund, Paradislyckan, Abusa, Esperöd &c., frequens; in Smolandia ad Skär-sjö, collectio *Ljunghiana*; in Ostrogothia ad Gusum, Lärketorp; Wadstena, Medhamra, Fredensborg &c., minime parca; in Gotlandia ad Lummelund, Ahlskog, Westerby,

Thorsborg, Rhône, Garde, frequens; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlbergi*; in Jemtlandia ad Faxelfven, Berge & Ålsen, passim; in Lapponiis: Umenstad Nåstansjö & Wilhelmia, Tornensi ad Wittangi (♀ sub cortice truncorum Pini *sylvestris*), rarius; in Dania, D. *Stægeri* (qui etiam specimina sub nomine: "Dr. *phalerata* Meig." misit). (E Finlandia a D. *Sahlbergi*, & a D. *Dahlbomi* in Pinetis ad Neuenkirchen Germaniæ 20 Maii & 12 Sept. capta, necum quoque communicata).

♂. Pictura abdominis & alarum a reliquis statim digneatur. Setæ vesticis thoracisque ordinariæ nigrae. Caput opacum. Frons rufo-ferruginea. Antennæ mediocres l. parvæ, flavæ, raro apice fuscescentes, seta semper longe plumata, nigra. Epistoma albido-flavum, setulis mystacinis obscuris. Prælabrum occultum. Instrumenta cibaria retracta, flava. Genæ breves. Oculi mediocres, rotundi, in viva miniatâ l. late ruhi. Thorax convexus, rufo-ferruginosus, dorso breviter obscure puberulus. Scutellum concolor. Abdomen oblongo-ovatum, sulcidepressum, nitidum, glabriculum, flavum, dorso serie quadruplici punctorum nigrorum (nempe 4 in singulo segmento), quorum media semper majora, perspicuiora, jam subrotundata, jam subtransversa, & lateralia (in segmentis 2, 3 & 4) minora subrotunda, sepe libera, interdum cum mediis oppositis subconfluentia, raro omnino deficiuntia. In abdome saltem ♀ annulos 6 distinctos præter analem numero. Alæ hyalinæ, præseritim versus costam omnium levissime brunneidine diluta tinctæ. Nervi transversi modice approximati, infuscati, horum medius apicis nervi auxiliaris brevis fere oppositus l. mox pone ejus apicem ductus. Segmentum nervi longitudinalis 4:ti secundum tertio 1: vix duplo brevius. Costa nuda. Halteres & pedes toti paleo flavi. — Variat magnitudine; mares plerumque minores. Variat etiam colore plus minus saturate ferrugineo. Variat denique raro abdome fere toto fusco.

Var. b. *læta*. Q. toto corpore pallide flavo, abdomine immaculato, alarum nervis transversis solum infuscatis; forte tantum juvenilis, nam præter colorem pallidiorem in omnibus convenit cum varietate, cum qua etiam inventa ad Lund in Paradislyckan & in Ostrogothia ad Fredensborg.

†† alarum nervis transversis non fuscedine cinctis.

D. tristis: brunneo-testacea, capite abdomeque obscurioribus; pedibus flavis; alarum costa posterius late infuscata, nervis transversis approximatis, segmento nervi longitudinalis 4:ti secundo tertio fere duplo breviori. ♂♀.
(Long. fere $\frac{1}{4}$ lin.).

Fall. Geomyz. 7. 7. ♀. typica. — Meig. Dipt. 6. 86.
12? Macq. Buff. 2. 550. 8?

Hab. in Scania Sveciae meridionalis valde rara; feminam in uliginosis ad Esperöd mense Augusto 1822 detecta. Illustr. Fallén, & utrumque sexum in succo exstillante Quercus ad idem Esperöd 3—10 Aug. 1824 ipse inventa; in Ostrogothia ad Gusum & in Uplandia ad Holmiam etiam a Prof. Wahlberg deprehensa fuerit.

♂♀. Color corporis brunnescens & fuscedo alarum costalis postica speciem designant. Ipsissimum specimen, quod descripsit Fallén jam ante oculos habeo, & illud cum nostris bene congruentibus comparavi. Parum nitida. Caput obscure testaceum. Antennæ minores, fuscae, seta distincte plumata. Seta mystacina nigra. Os retractum. Oculi majusculi rotundi. Thorax & scutellum obscure testacea. Abdomen ovale, in nostris individuis totum nigricans, nitens. Alæ cinereo-hyalinæ, costa a medio ad apicem sat perspicue fusca, fuscedine ad nervum longitudinalem 3:tiū dilatata. Nervi transversi obscuri, horum ordinarius sat longe a margine distans, medius fere apici auxiliaris brevis oppositus. Costa tantum basi subtiliter ciliata.

Halteres & pedes pallide flavi. — Valde affinis & similis *D. tristis* n:o 4, sed thorace forte nonnihil dilutiore, & alarum nervis costali postica perspicua diversa.

Obs. Meigen & Macquart suam *D. tristis* "totam testaceam nitidam, abdominis apice solo nigro, & pedibus obscure flavis" describunt, unde synonyma eorum mihi dubia videntur.

Obs. Sub nomine: "*Dr. tristis* Fall." specimen masculum e Dania a D. Stæger obtinui, quod ad *Dr. spurcam* n:o 5 retuli.

D. fuscimana flavo-testacea, epistomate albido; pedibus pallide flavis; abdomine nigro; thoracis linea dorsali pedibusque anticus fuscis; alis hyalinis, nervis: costali atro, transversis perspicue approximatis, segmento nervi longitudinalis 4:ti secundo tertio triplo breviori. ♂.
(Long. vix $\frac{3}{4}$ lin.).

Meig. Dipt. 6. 87. 17? Zelt. Ins. Lapp. 776. 6. ♂.

Hab. in Lapponia meridionali Umeå rariissime; scilicet in succo exsudante Betulæ albæ ad novaculum Norðanås in paroecia Frederica d. 31 Jul. 1832 a D. Dahlbom, & in fungis ad novaculum Nästansjö in paroecia Wilhelmina d. 13 Jul. a me, captæ. In Scandinavia meridionali non observata, quantum noverim.

C. Parva, angusta, subopaca, testacea, setis ordinariis nigris. Antennæ breviusculæ, sela nigra. Epistoma flavo-album, seta utrinque mystacina nigra. Os retractum. Oculi majusculi, rotundi, in viva rufi. Thorax linea dorsali ferruginea subobsoleta. Abdomen angustum, nigrum, basi piceum. Alæ hyalinæ, nervis tenuibus pallidis, costali atro. Ad apicem nervi 2:di longitudinalis umbra obsoleta. Nervi transversi aperle approximati, horum ordinarius sat longe a margine distans, mediocris paullo post apicem auxiliaris brevis ductus. Segmentum nervi longitudinalis 4:ti secundum tertio circiter $2\frac{1}{2}$ brevius, at seg-

mentum costæ secundum tertio fere triplo longius. Costa nuda. Halteres albidi. Pedes pallide flavi, antici fuscescentes, coxis pallidis.

31. *D. nigroventris*: flavo-testacea, epistomate pedibusque pallide flavis; abdome nigro; alis cinereo-hyalinis, nervis transversis eximie approximatis, segmento nervi longitudinalis 4:ti secundo tertio triplo breviori.
♂♀. (Long. $\frac{3}{8}$ lin.).

Hab. in Smolandia ad Skärsjö rarissime; duo tantum individua lustravi.

♂♀. Priori paullo robustior, sed non longior, ferrugineo-flava, subopaca, setis ordinariis nigris. Antennæ parvæ, flavæ, seta plumata nigra. Epistoma infra oculos parum descendens, in medio subconvexum, totum pallide flavum, seta utrinque mystacina distincta nigra. Organa oris retracta flava, Genæ breves, albicantes. Oculi majusculli rotundi rufi. Thorax & scutellum immaculata. Abdomen ovatum subdepressum nigrum nitidum, ventre pallescente. Alæ hyalinæ, lenissime flavidotinctæ, nervis subferrugineis. Nervi: 2:dus longitudinalis proportione brevis; transversi perspicue approximati, horum ordinarius longe a margine remotus, medius nonnihil pone apicem auxiliaris brevissimi ductus. Segmentum nervi longitudinalis 4:ti secundum tertio fere triplo brevius, at segmentum costæ secundum tertio vix $1\frac{1}{2}$ longius. Costa nuda. Halteres pallidi. Pedes toti pallide flavi. —

Obs. Caveas ne hanc confundas cum simili *Dros. melanogaster* Meig. seu *D. Fenestrarum* nobis infra no 21, quæ tamen nervis transversis magis remotis certe diversa.

32. *D. approximata*: flava, abdome ferruginante; alis hyalinis, nervis transversis perspicue approximatis, segmento nervi longitudinalis 4:ti secundo tertio $2\frac{3}{4}$ breviori. ♀. (Long. $\frac{1}{2}$ lin.).

Hab. in Svecia meridionali & media rarius; scilicet in Scania ad Lund semel a me inventa; in Smolandia a D. Ljungh capta.

♀. Similis *D. flava* (23), nervis transversis magis approximatis diversa. A priori, cui quoque similis, magnitudine paullo minore & abdomine saturate flavo, nec nigro, discrepat. Tota flava, parum nitida, epistomate pedibusque adhuc pallidioribus. Setae ordinariæ nigræ. Antennæ parvæ flave, seta pectinata nigra; superne radios 4—5 in exemplis haud bene conservatis numero. Seta mystacina nigra. Oculi mediocres l. majusculi rotundi, in mortua ferruginei. Abdomen oblongo-ovatum, saturate flavum l. testaceum, versus apicem dilute brunneum. Alæ hyalinæ, nervis pallidis ut in priori directis. Nervus vero 2:dus longitudinalis proportione nonnihil longior, ita ut segmentum costæ 2:dum 3:tio sere duplo longius evadat. Halteres & pedes toti pallide flavi.

D. congesta: pallide flava; alis hyalinis, nervis transversis valde approximatis, segmento nervi longitudinalis 4:ti secundo tertio sere quadruplo breviori. ♂ (Long. $\frac{1}{2}$ lin.).

Hab. in Ostrogothia, ubi ad Lärketorp specimen descriptum inveni.

♂. Differt a priore, cui alias valde similis, abdomine flavo, nec dilutè brunneo, & imprimis nervis transversis adhuc magis approximatis. Tota pallide flava, setis ordinariis nigris. Antennæ parvæ flave, seta, quantum in individuo velutio videri possit, plumata. Seta utrinque mystacina distincta nigra. Oculi mediocres, rotundi, ferruginei. Alæ latiusculæ, nervis tenuibus haud pallidis. Nervi transversi evidenter approximati, horum ordinarius longissime a margine remotus, in disco alæ paullo ante medium insertus, medius nonnihil pone apicem auxiliaris ductus. Nervus 2:dus longitudinalis solito in hoc genere brevior, ita ut segmentum costæ 2:dum 3:tio tantum $1\frac{1}{2}$ longius eva-

dat. Costa nuda. Halteres & pedes toti pallide flavi. — Vix *Agromyzæ* speciei.

B. Alarum nervi transversi remoti aut subremoti, h. e. nervus transversus ordinarius aut in medio aut tantum paullo ante medium areæ ultimæ insertus, ita ut segmentum nervi longitudinalis 4:ti secundum tertio aut æque longum aut ad summum $1\frac{1}{2}$ brevius evadat.

α) thorace obscuro, h. e. cinerascente l. nigricante.

14. *D. glabro*: æneo-nigra, nitida; antennis luteis; pedibus flavis, femoribus fuscis; alis subhyalinis, nervis transversis modice remotis, segmento nervi longitudinalis 4:ti secundo tertio $1\frac{1}{3}$ breviori. ♂♀. (Long. $\frac{2}{3}$ sere 1 lin.).

Fall. Geomyz. 8. 12. ♂♀. Meig. Dipt. 6. 85. 10.

Hab. in graminosis & floribus per prata & pascua Sveciæ meridionalis & mediæ mense Julio passim vulgaris, in fenestris jam mense Aprili aliquoties etiam a me visa; scilicet in Scania ad Lund, Abusa, Esperöd &c., sat frequens; in Smolandia, D. D. Ljungh & Boheman; in Ostrogothia ad Gusum (*Wahlberg*) & Wadstena parce; in Gotlandia in insulis Stora Carlsön & Furillen, nec non ad Nähr minime rara; sed deinde versus septentrionem longius procedens non observata.

♂♀. Ovata robusta, colore corporis æneo nitido ab omnibus fasciâ dignota. Setæ ordinariæ adsunt nigrae. Caput latiusculum æneum nitidum, fronte antice summo margine plerumque flavidio. Antennæ parvæ, luteæ, seta nigra pectinata, radiis 7—8 basi longis versus apicem sensim decrescentibus. Epistoma breve impressum, infra oculos minime descendens, seta utrinque mystacina mediocri & setulis oris parvis. Genæ brevissi-

mm. Proboscis crassa nigra. Oculi maximi rotundi, in viva ferruginei. Thorax, scutellum & ovatum abdomen obscure nigra nitidissima glabricula præter setas ordinarias. Alæ cinereo-hyalinæ, nervis pallescentibus. Nervi: longitudinales paralleli, horum 2:dus elongatus; transversus mediusr paullo ante apicem auxiliaris mediocriter longi ductus (nota singularis). Segmentum costæ 2:dum 3:io fere sextuplo longius, sed segmentum nervi 4:ti longitudinalis secundum tertio $1\frac{1}{2}$. $1\frac{1}{2}$ brevius. Costa basi tenuiter ciliata, spinula parva. Halteres flavo-albi. Pedes jam toti flavi l. lutei, jam femoribus præsertim posticis plus minus late nigricantibus aut brunneis.

D. Graminum: cinerea, subopaca, thoracis linea media fusca; epistomate albido; antennis, frontis antico pedibusque flavis; abdomine nigricante; alis hyalinis, nervis transversis modice remotis, segmento nervi longitudinalis 4:ti secundo tertio $1\frac{1}{3}$ breviori. ♂♀. (Long. $\frac{2}{3}$ vix 1 lin.).

Var. a. ♂♀. cinerea, thoracis linea media fusca; epistomate albido; antennis, fronte antice pedibusque flavis; abdomine nigricante; frequens; in copula.

Fall. Geomyz. 8. 11. var. a. ♂♀. — Meig. Dipt. 6. 86. 13. Macq. Buff. 2. 550. 9. Zell. Ins. Lapp. 777. 9. ♂♀.

Var. b. ♂♀. similis var. a., sed thoracis linea media fusca vix conspicienda.

D. sordida Zell. Ins. Lapp. 777. 7. ♂♀.

Var. c. ♂♀. similis quoque var. a., sed thorace paullo obscuriore.

D. flavipennis Zell. Ins. Lapp. 777. 8. ♂♀.

Hab. in graminosis, foliis fruticum, fenestris, &c., per prata, arva, pascua, silvas, &c., a mense Mayo usque ad Octobrem, ubique vulgatissima; scilicet var. a. in Scania, Blekingia, Smolandia, Ostro- & Westrogothia, Gott-

Iandia (ad Kyllej, Westö &c.) & Nericia, frequentissima; in Uplandja ad Holmiam, D. D. B. Fries & Wahlberg; in Dalecarlia ad Rusgård; in Bottnia boreali ad Johannis Ro; in Lapponiis: Umensi ad Wilhelmina, & Tornensi ad Kengis, rarius; in Dania, D. Stæger. (E Finlandia a D. Sahlberg ut frequens incola communicata; & ad Neuenkirchen Germaniæ jam 15—20 Maji a D. Dahlbom sat copiose capta); var. b. in Lapponia Umensi ad Wilhelmina, & in Norwegia ad Dowre, parce lecta; var. c. in Scania ad Lund, & in Læpponia ad Wilhelmina minus frequenter observata.

♂♀. Statura angusta, tenera, parum nitida, thorace cinerascente lineola media tenui fusca, abdomine obscuriore, fronte antice, antennis pedibusque pallidis, epistomate albicante, alis immaculatis, nervis transversis nec longe remotis, nec approximatis, sed modice distantibus, facile dignoscitur hæc species, individuis passim abundans. Caput rotundatum opacum. Frons flava, vitta media lutea, vertice cinereo l. fusco, nigrosetoso. Antennæ mediocres, ovalæ, flavæ (in ♀ sæpe rufæ), seta pectinata nigra. Epistoma infra oculos vix descendens, albicans, seta utrinque mystacina nigra. Setulæ oris exiguae. Instrumenta cibaria retracta flava. Genæ breves, albicantes. Oculi majusculi, rotundi, microscopice puberuli, ferruginei, in viva late rufi. Thorax cinereus, opacus, lateribus setulosus, linea media, scutellum cinereum etiam transeunte, brunnea. Vestigium lineolæ brunneæ utrinque lateralis quoque adest, sed plerumque parum perspicuum. In var. b. thorax fere immaculatus, & in var. c. totus magis obscurus, interdum fere nigricans. Abdomen oblongum nigricans aut nigro-brunneum, subnitens, ventre interdum pallido. Alæ cinereo-hyalinæ, nervis subpallescens tibus ut in priori directis, at transverso medio apici (nec ante apicem) auxiliaris opposito. Segmentum costæ secundum 3:to circiter quintuplo longius. Costa nuda, basi tenuissime

ciliata, spinula parva. Alæ cæto situ cinereo-subflavescunt. Halteres & pedes toti pallidi, tarsorum apice sepe dilute fusco. Femora antica subtus pilosula. — Variat interdum corpore livido l. rufescente; forte juvenilis.

Obs. *Dr. incana* Meig. Dipt. 6. 86. 14. ab hac parum abludere videtur. — *Dros. graminum* var. d. Fall. l. c. ad diversam speciem referenda, & sub nomine: *D. pallida* n:o 23 apud nos invenienda.

18. *D. griseola:* cinerea, subopaca, thoracis linea media fusca; capite obscuro, regione antennarum flava; antennis fuscis, basi rufescensibus; abdomine nigro; pedibus ferrugineis, femoribus nigricantibus; alis hyalinis, nervis transversis modice remolis, segmento nervi longitudinalis 4:ti secundo tertio $1\frac{1}{3}$ breviori. ♀. (Long. circiter $\frac{2}{3}$ lin.).

Hab. in alpibus Dalecarlicis forte rarissima, mihi non obvia, sed in specimine unico a Detectore D. Professore Boheman ad describendam communicata.

♀. Statura, magnitudo & color corporis omnino ut in praecedente, cui valde similis & affinis, sed antennis, fronte, epistomatis area media femoribusque obscurioribus distincta. Frons obscure cinerea, summo margine antico flavo. Antennæ obscuræ, basi rufescentes, seta peclinata. Epistoma nigricans, lateribus pallidis. Genæ pallide. Pedes flavo-ferruginei, coxis posterioribus & femoribus omnibus nigricantibus seu nigro-brunneis, geniculis posterioribus ferrugineis. Tarsi omnes apice fuscantes. Thorax, abdomen, alæ & reliqua omnino ut in priori.

Obs. *Dros. fuscula* Fall. antennarum seta breviter plumata sub *Diastata costata* hujus operis p. 2539 n:o 4 quærenda.

β) thorace pallescente, b. e. rufso, testaceo aut flavo.

17. *D. funebris*: rufso-ferruginea; epistomate pedibusque pallidioribus; antennis oblongo-ovalis, versus apicem angustioribus; abdome nigricante, aut incisuris tenuissime pallidis (♂), aut fasciis integris flavis (♀); alarum nervis transversis distincte remotis, segmento nervi longitudinalis 4:ti ultimo antecedente parum longiore. ♂♀.
(Long. 1— $1\frac{1}{4}$ lin.).

Mas.: abdomen oblongum, nigricans, raro immaculatum, plerumque segmentorum præcipue 2, 3 & 4 margine apicali tenuissime albido, interdum etiam margine basali eorundem segmentorum anguste pallido, segmento 1:mo sœpe piceo l. rufescente;

Fem.: abdomen oblongo-ovalum, supra nigricans l. nigro-brunneum, segmentis basi fascia in anticis lata, in posticis angustiore, flava; in copula.

Fall. Geomyz. 5. 3. ♂♀. vera. — Meig. Dipt. 6. 82.

2. Zett. Ins. Lapp. 775. 1. ♂♀. *Musca* Fabr. Antl. 299.
76. — *Musca cellaris* ("antennis setariis, pilosa nigra, alis nervosis, oculis ferrugineis") Linn. Fn. Svec. n:o 1848, opinantibus Meigen & Macquart. — *Dros. cellaris* Macq. Buff. 2. 549. 2. ♂♀. T. 22. f. 9. certe. — *Musca erythrophthalma* Panz. Fn. Germ. 17. f. 24. ♀. videtur.

Hab. in Fungis arboreis, Agaricis putridis (ubi ova deponunt seminæ), succo arborum sazialiarum, fenestris, & primo vere in soliis Gageæ luteæ & Ranunculi Fica-

ris, per totam Scandinaviam, & pibus lapponicis tautum exceptis, ab initio Aprilis usque ad finem Novembris, vulgaris, in copula quoque observata; scilicet in Scania, Smolandia, Ostro- & Westrogothia, Ölandia (ex. gr. ad Ottenby), Gotllandia (ad Garde), Uplandia, Bottnia, frequens; in Lapponiis: Umensi ad Tresunda & Lycksele non parce, Lulensi, D. *Andersson*, & Tornensi ad Öster-Torneå, Turtola & Karesuando, rarius; in Norwegiae littoralibus a me frustra quæsita; in Dania freq., D. *Stæger*. — Feminas in fenestris ipso mense brumali aliquando vidi.

♂. Colore corporis rufo-brunneo l. ferrugineo, nec flavo, a seqventibus primo obtutu dignoscitur. In hoc genere majuscula, robusta, subnitida, setis ordinariis nigris. Frons valde lata lutea. Antennæ incumbentes, flavæ, articulo ultimo oblongo saepè fuscescente, versus apicem subangustato, seta versus apicem undique, sed basi tantum superne longe & distincte plumata; obscura. Epistoma infra oculos nonnihil descendens, latum, flavum, in medio obtuse carinatum, setis mystacinis utrinque paucis nigris. Genæ mediocres flavæ. Oculi mediocres rotundi, in viva obscure ferruginei. Thorax convexus puberulus & scutellum rufo-ferruginea. Abdomen nitidum, ut in diagnosis sexus constructum & pictum. Alæ abdomine longiores, ample, sordide hyalinæ, immaculatæ, nervis ferruginantibus. Nervi: longitudinales recti, 3 & 4 paralleli, horum 3:ius in apice desinens; 4:ius pone apicem cum costali conjunctus, 2:dus elongatus, auxiliaris simplex modice brevis; transversi distincte remoti, horum medius apici auxiliaris oppositus, ordinarius fere in medio l. mox ante medium areæ ultimæ insertus, ita ut segmentum nervi 4:i longitudinalis ultimum 2:do parum l. paullo tantum longius evadat. Costa nuda; spinula minuta. Halteres albidi. Pedes toti cum coxis pallide flavi, subnudi, femoribus anticis subtus parce pilosis. — Variat thorax

ce obscure rufo. — Haec species *Dros. virginicae* Meig. valde accedere videtur.

Obs. Varietas *mas*: "corpore toto testaceo, ano solum nigro", Fall. I. c. in descriptione, ad speciem sequentem pertinet.

18. *D. confusa* flava, epistomate albicante, pedibus pallide flavis; antennis oblongo-ovalis, versus apicem angustioribus; abdomine rufo apice nigro (δ), aut fasciis interruptis (φ) nigricantibus; alarum nervis transversis in utroque sexu distincte remotis, segmento nervi longitudinalis 4:ti ultimo antecedente parum longiore. $\delta\varphi$. (Long. 1— $1\frac{1}{4}$ lin.).

Stæg. in Kröy. Tidskr. I. 1. p. 18. 2. $\delta\varphi$. — *Dros. fenestrarum* Meig. Dipt. 6. 83. 4. $\delta\varphi$. Macq. Buff. 2. 549. 4. $\delta\varphi$. *Drosoph. funebris* var. Fall. Geomyz. 5. 3. *mas* in descriptione.

Mas: abdomine flavo, ano fusco l. obscuro;

Fem.: abdomine flavo, fasciis nigris, anticis interruptis, posticis integris.

Hab. in Scandinavia meridionali rarius; mihi in foliis fruticum, & arborum truncis nuper abscissis, in Scania ad Esperöd Jul. Sept. aliquoties obvia; e Dania a D. Stæger in utroque sexu etiam communicata.

$\delta\varphi$. Magnitudo, statura, formatio partium & directio nervorum in aliis exakte ut in precedente, cui igitur valde similis & affinis; sed colore thoracis constanter dilutiore, late flavo, nec ferrugineo l. rufo-brunneo, ut & abdomine in δ flavo apice tantum fusco, in φ pallido fasciis mediis interruptis quoque

trigris, distinguitur. Caput cum apennis longiusculis, seta distincte plumata, setis mystacinis & oculis omnino ut in priori. Thorax & scutellum etiam ut in illo, praeter colorem, ut dicatum, pallidiorem. Abdomen ovatum flavum l. rufo-flavum, in ♂ ano 1. segmentis apicalibus pilosulis fuscis, in ♀ fasciis quatuor (quarum 3 anticus anguste interruptis, 4:ta integra) annoque nigris. Fasciae vero haec e margine segmentorum apicali sat late nigro formantur. In individuo unico semineo anum flavidum vix infuscatum vidi. Alae, halteres & pedes plene ut in antecedente.

Obs. Hujus semine valde simile est specimen semineum, quod sub nomine: "*Dros. fasciata* Perris" (nec Meigeni eadem) e S:t Sever Galliæ a D. *Leon Dufour* nuper obtinui, & ab Illo in Annal. des Scienc. Natur. Paris 1839. p. 49. 14. T. 3. f. 85 descripta & delineata exstat; haec vero corpore "griseo-rufescente", nec pallidius flavo, & abdominis segmento etiam 1:mo fascia nigra interrupta ornato, nec toto flavo subimmaculato, differe videtur. Nec talis in Scandinavia observata.

IV. D. Histrion: flava, epistomate pallidiore; abdome maculis geminis trigonis trigris; alarum nervis: longitudinalibus 3. & 4 versus apicem leniter convergentibus, transversis modice remotis, segmento nervi longitudinalis 4:ti ultimo antecedente circiter $1\frac{1}{2}$ longiore. (Long. circiter 1 lin.).

Meig. Dipt. 6. 8. T. 59. f. 4. Macq. Buff. 2. 550. 6.

Hab. in Svecia rarissime, testante Prof. *Wahlberg*, qui eam in Uplandia ad Holmiam in Haga-Park in succo e trunko Sórbii Aucupariæ cæsæ sudante verno tempore invenerit. A me neque capta, neque visa.

Auctoritate Cel. *Wahlberg* speciem ut Scandinaviæ incolam propono, descriptionem e Weigen l. c. præcipue hauriens. — E.

pistoma & frons antice pallide flavae. Frons postice, antennae
& thorax nitidus, testacea. Abdomen pallide flavum, segmento
1:mo utrinque strigula nigra; in singulo segmentorum 2, 3 &
4 maculis duabus magnis approximatis trigonis nigris angulo
acuto basin segmenti spectantibus & attingentibus. Anus niger.
Venter flavus, incisuris brunneis. Alæ hyalinæ, lenissime brun-
nescentes, nervis 3 & 4 longitudinalibus non exakte parallelis,
sed versus apicem paullulum convergentibus. Halteres albi.
Pedes testacei. — Specimen in figura Meigeni masculum vi-
detur delineatum.

Obs. D. *Leon Dufour* specimina utriusque sexus plura, quorum
pupæ in Boleto mense Octob. captæ, e S:t Sever Gallæ mihi
sub indicio: "Dros. maculata Leon Duf. Annal. des Scienc.
Natur. Paris 1839. p. 50, 15. T. 3. f. 91." communicavit, quæ
huic (*D. Histrion*) in multis accedunt; sed magnitudine (1½
lin.) paullo majore, thoracis dorso dilutissime brunneo-biline-
ato, nec immaculato, scutello fascia transversa lata fusca cer-
to situ perspicua, abdominis dorso segmento 1:mo immacula-
to, 2:do macula utrinque, 3:to, 4:to & 5:to in singulo maculis tribus
majusculis rotundatis, nigris, liberis (in segmento 3:to trans-
versim subconfluentibus), & 6:to minuto retracto subimmacu-
lato, ut & alis hyalinis, nervis longitudinalibus 3 & 4 subpa-
rallelis, vix versus apicem convergentibus, abunde recedunt;
Scandinaviæ Fauna hactenus ignota.

20. *D. picta*: flavo-testacea, epistomate pedibusque
pallidioribus; abdome maculis trifariam dispositis brun-
neo-nigris; alarum nervis transversis modice remotis, seg-
mento nervi longitudinalis 4:ti ultimo antecedente circi-
ter 1½ longiore. ♀. (Long. ¾ lin.).

Stæg. in litteris 5 Aug. 1843.

Hab. in Scandinavia meridionali rarissime, mihi
numquam obvia, sed e Dania in specimine unico pro de-
scribendo mihi a D. Stæger mutuo communicata.

A priori, cui accedit, abdominis maculis nigricantibus trifariam, nec bifariam, dispositis, & nervis longitudinalibus 3 & 4 parallelis, nec versus apicem convergentibus, & *Dr. maculata* (in observatione sub priori) magnitudine minore, colore corporis minus saturate flavo, &c., certe differt. — Frons lata fulvo-flava, opaca. Antennæ breves, oblongæ, testaceæ, seta longe & distincte plumata, nigra. Epistoma infra oculos haud descendens, latum pallidum, seta utrinque mystacea perspicua nigra. Proboscis testacea. Oculi mediocres 1. majusculi rotundi rufi. Thorax testaceus opacus. Scutellum sordide testaceum. Abdomen ovalum nitidum ferrugineo-flavum, dorso linea media subinterrupta obscure brunnea, & præterea in singulo segmento maculis 2 majusculis diffinib[us] ejusdem coloris. Hæ autem signaturæ minus regulares & in 1:mo & ultimo segmentis magis obsoletæ obveniunt. Incisuræ antice certo situ quoque tenuissime brunneæ apparent. Alæ sordido hyalinæ, nervis ferruginantibus, ut in *Dr. fuscobrachialis* (17) directis, sed transversis magis appropinquantibus. Pedes toti pallide flavi immaculati.

M. D. Fenestrarum: rufo-flava, epistomale albicans, pedibus pallidis; ab domine in mare nigro, in semina rufo fasciis integris anoque nigris; alis hyalinis, nervis transversis modice remotis, segmento nervi longitudinalis 4:ti ultimo antecedente circiter 1½ longiori. ♂♀. (Long. $\frac{3}{4}$ lin.).

Mas.: angustior, ab domine toto nigro;

Fem.: ab domine nigro, a basi & ultra medium rufo-fasciato; in copula.

Fall. Geomyz. 6. 4. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 775. 2. ♂♀.
(exclus. syn. Meigeni quod ad *Dr. confusum* nobis n:o

18 pertinet). — Stæg. in Krøy. Tidskr. 1814. I. 1. p. 18.
 1. ♂. — *Dr. melanogaster* Meig. Dipt. 6. 85, 9. (sexu non determinato). ♂. — *Dr. virginea* Meig. Dipt. 6. 84. 6. (sexu non determinato). ♀.

Hab. in graminosis, soliis frūticum & herbarium, at præsertim in fenestrīs cubicolorum, per totam Scandinaviam, a medio Aprilis usque ad medium Octobris, vulgaris, in copula quoque sœpe deprehensa; larvæ in serragine in vasculo vitro conservata aliquoties observatæ; occurrit in Scania ubique frequens; in Smolandia, D. *Ljung*; in Ostrogothia ad Lärketorp, Gusum, &c.; in Ölandia & Gotllandia, parce; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Helsingia ad Storbyn paroeciæ Färila & ad divisorium Kärböle; in Lapponiis: Umensi ad Lycksele, & Tornensi, rarius; in Daniæ Arctio Lappa &c. frequens, D. *Stæger*. (In pinetis ad Neuenkirchen & Elisenheine prope Gryphiam Sept. 1814, D. *Dahlbom*).

♂♀. Per abdomen maris totum nigricans, feminæ rufum fasciis dorsalibus integris anque nigris, hæc species sine difficultate cognoscitur. — Similis & affinis *Dr. funebri* no 17, sed ferre duplo minor angustior, antennis nonnihil brevioribus, magnis obtusis, colore corporis paullo latiori, abdome σ toto nigricante, ut & nervis transversis in utroque sexu minus longe remotis, mox dignoscenda. Frons flava. Antennæ parvæ, oblique exsertæ, nec incumbentes, flavae, seta distincte plumata nigra. Epistoma breve infra oculos non descendens, flavum albo-micans, seta mystacina obscura. Organa cibaria retracta flava. Genæ brevissimæ. Oculi majusculi rotundi microscopice puberuli, rufi, in viva miniati. Thorax rufo-1. ferrugineo-flavus, nitens. Scutellum concolor. Abdomen ut in diagnosi sexuali, maris nempe nigricans nitens, feminæ 1. plerumque nigro-brunneum, nitidum segmentis basi late rufo-flavis, 1. ob-

scure fuscum segmentis anticis basi anguste pallidis, ano semipigro. Alae cordide hyalinis, nervis paullo dilutioribus, ut in priori directis. Nervi transversi ordinarius sat longe a margine distans, medius apici auxiliaris oppositus. Costa nuda. Halteres albidi. Pedes pallide flavi immaculati.

Var. b. ♂. abdomine nigro, basi pallido.

Zett. Ins. Lapp. 776. 2. var. b. ♂. — *Dros. nitidiventris* Macq. Buff. 2. 551. 12. ♂. Meig. Dipt. 7. 377. 22. ♂. (e descriptione Macqvarti transcripta).

Hab. cum var. a. passim.

Obs. In Scania ad Lund (in Paradislyckan) die 4 Oct. individuum unicum semineum forte juvenile inveni: abdomine toto rufso immaculato; & ad Esperöd d. 12 Aug. 2 specimina etiam seminea deprehendi: abdomine toto nigricante; de cetero varietati a. simillima & vix ad aliam speciem referenda.

22. *D. flava*: pallide flava, pedibus dilutioribus, epistomate albicante; alarum nervis transversis distincte remotis, segmento nervi longitudinalis 4:ti ultimo antecedente $1\frac{1}{4}$ longiori. ♂♀. (Long. vix $\frac{3}{4}$ lin.).

Fall. Geomyz. 7. 10. ♂♀. Meig. Dipt. 6. 88. 20 (e descriptione Falleni transcripta).

Hab. in graminosis locis paludosis per prata & silvas Scandinaviae meridionalis & mediæ a fine Julii usque ad initium Septembris minus frequenter observata; nempe in Scania ad Lund, Abusa, utrumque Esperöd (alterum in paroecia Tranås, alterum in paroec. Mellby), rarius; in Westrogothia ad Gothoburgum, & in Uplandia ad Holmiam, Prof. *Wahlberg*; e Dania a Dom. *Stæger*

mas in unico exemplo communicatus. (E Finlandia a Prof. Sahlberg etiam olim missa).

♂. Colore totius corporis in utroque sexu flavo immaculato, a prioribus dignota. Parva, parum robusta, subopaca. Setae ordinariae nigrae. Frons lata flava. Antennae parvae, oblique exsertae (non incumbentes), flavae, articulo ultimo ovato, seta basi pectinata, versus apicem undique plumata, radiis longiusculis nigris, non densis. Epistoma infra oculos non longe descendens, biimpressum, albo-micans, seta mystacina non valida, nigra. Genae longiusculae albidae. Oculi minuseuli rotundi rufoserruginei. Thorax flavus, dorso vestigio lineolae mediae brunneae, sed valde obsoletae & parum conspicienda. Abdomen flavum, appendiculo supra anum saepe fusco. Alae subhyalinæ iridescentes, nervis tenuibus flavis ut in praecedente directis, sed transversis forte nonnihil magis distantibus, ita ut segmentum nervi longitudinalis 4:ti ultimum antecedens longitudine parum ultra $1\frac{1}{2}$ superet. Halteres albidi. Pedes simplices, toti flavo-albidi, subnudi, femoribus anticis subtus ut solito parce pilosulis.

23. *D. pallida*: pallide flava, pedibus dilutioribus, epistomate albicante; thoracis dorso flavo-canesciente linea media dilute brunnea obsoleta; alarum nervis transversis remotis, segmento nervi longitudinalis 4:ti ultimo antecedente $1\frac{1}{4}$ longiori. ♂. (Long. $\frac{1}{2}$ lin.).

Dros. graminum var. d. Fall. Geomyz. 8. 11.

Hab. in graminosis per litus maris Baltici ad Esperöd Scaniæ meuse Julio in 5 speciminiibus a me capta.

♂. Inter minimas hujus generis. Similis priori, sed magnitudine paullo minori & thoracis dorso leniter canesciente, nec pure flavo, differt. *Dr. Graminum* (15) quoque valde affinis,

Sed statura gracilior, thorace flavo cano-micante, ut & abdome pallido, nec nigricante, specie^s recedere videtur. Tandem *Dr. approximata* (12) & *congesta* (13) colore corporis flavo & parvitudine accedit, nervis vero transversis aperte magis remotis ab illis vere diversa. — Parum nitida. Frons lata pallida albido-micans. Epistoma infra oculos vix descendens, albidum, in medio longitudinaliter carinatum, seta mystacina parva nigra. Proboscis flava. Genae breves albidae. Oculi mediocres rotundi rufo-ferruginei. Thorax flavus, disco dorsali praesertim antico in individuis bene conservatis cano-micante, lineola media dilute brunnea I. ferruginea plerumque parum observanda. Abdomen flavum, ano interdum fusco. Alae subhyalinae, nervis tenuibus flavis, ut in priori directis. Halteres albidi. Pedes flavo-albidi immaculati, simplices, nudiusculi, femoribus anticis subtus parce pilosulis.

184. ASTEIA Meig.

Corpus minutum, ovato-oblongum, nitidum, glabriculum, setis ordinariis in vertice, thoracis lateribus scutellique margine vestitum. Antennae deflexae, breves, articulis: 1:mo minutissimo, ultimo rotundato, compresso, basi seta dorsali vase & parce plumata, plumis remotis. Frons latissima, antice non prominula. Epistoma latum, perpendiculare, infra oculos parum descendens, margine antico integro, seta mystacina utrinque unica parva (*). Genae breves. Oculi mediocres rotundi nudi. Abdomen oblongo-ovatum, segmentis 5 distinctis (**).

*) a Clar. Meigen epistoma "nudum" describitur.

**) abdominis annulos 5 distinctos numero, sed forte adsunt 6, licet ultimus minutus retractus.

Alæ haud late, sed abdomine multo longiores, parallelae, rectæ, hyalinæ immaculatae. Nervi: auxiliaris brevissimus; longitudinalis: 2:dus etiam valde brevis, mox pone apicem auxiliaris in costa desinens, 3:tius mox ante, & 4:tus leniter curvatus mox pone apicem alæ excurrentes, horum 4:tus cum costali cunctus, 5:tus sere ad marginem interiore extensus, 6:tus nullus; transversi: ordinarius nullus, medius ad basin aala retractus, apici auxiliaris oppositus. Costa nuda, microscopice tantum ciliata; spinula nulla; margo interior subtilissime ciliatus. Pedes simplices, nudi, inermes. Color e parte ferrugineus l. niger. Motus - - - Habitatio in graminosis & floribus. Differentia sexus; mas: ano rotundato subelavato; femina: ano acuto. — Similis *Drosophilæ*, sed nervis longitudinali 2:do brevissimo, transverso ordinario omnino deficiente, & ab hac & ab aliis hujus Familiae facilissime distincta. — Typus generis: *A. concinna*.

1. *A. concinna*: flava, epistomatis margine antico atro-bipunctato; verticis maculis thoracisque dorso nigris. ♂♀. (Long. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin.).

Meig. Dipt. 6. 90. 2. ♂. Macq. Buff. 2. 621. 2. ♂. T. 23. f. 20 (frons & epistoma nimis prominentia, sed antennarum seta plumata & directio nervorum in alis exacte delineata).

Hab. in Scandinavia meridionali rarissime; e Dania in litore maris locis arenosis a D. Stæger ♀ capta mihi communicata. (Plura exempla mascula ad Hamburgum d. 4 Jul. 1838 a D. Doct. Dahlbom collecta quoque obtinui).

♂♀. Tenera. Frons flava. Vertex flavus, lineolis 2 angustis & punto medio (loco ocellorum) nigricantibus. Antennæ flavae, articulo ultimo rotundato-ovali, seta parcissime plumata nigra.

Seta sub microscopio composito visa rachidem leniter flexuosa, columulis I. radiis 6-9 alternantibus ornata repräsentat. Epistoma pallide flavum, certo silti albido-micans, margine apicali utrinque in regione setæ mystacina puncto parvo atro. Instrumenta cibaria retracta flava. Genæ breves albican tes. Oculi medioctei, in mortua obscurè ferruginei. Thorax flavus, dorso lato nigro nitido, antice in masculis lineolis 2 approximatis pallidis. Scutellum flavum, basi macula nigricans. Abdomen: ♂ breviusculum angustum subcylindricum stramineum, supra in medio leniter fuscum, ano rotundato pallido; in ♀ oblongum angustum apice acutum, totum rufo-flavum. Alæ abdomine duplo longiores, haud latæ, sordide hyalino-iridicolores. Nervi tenues pallescentes ut in diagnosi generis indicatum directi. Nervi longitudinales 3 & 4 non exactissime paralleli, sed versus apicem lenissime convergentes. Alæ basi subangustatæ, alula nulla. Pedes toti pallide flavi, nudi, femoribus anticis subtus tenuissime pilosulis. Tarsorum articulus ultimus obscurus.

Cf. Meigen: tantum unicum individuum masculum hujus speciei in gramine invenit.

2. *A. amoëna*: flava, epistomate inferne argenteomicante; fronte thoracisque dorso nigris; abdome rotundato, rufo, nigro-maculato. ♂♀. (Long. $\frac{1}{2}$ lin.).

Meig. Dipt. 6. 89. I. ♂♀. T. 59. f. 7. ♀ (antennarum seta radiis tantum 3 supernis prave delineata). Macq. Buff. 2. 620. I. ♂♀.

Hab. in Scandinavia meridionali & media mensibus Jun.—Augusto, certe rara; nempe in Ostrogothia ad Häradshammar initio Junii 1842 a D. Stenhammar, & ad Gusum, teste D. Wahlberg; in Uplandia ad Holmiam, affirmante Eodem; mihi non obvia, sed ex Hafnia Dano-

rum ante plures annos a D. Stæger communicata, hodie
in collectione mea deperdita.

♂. "Frons nigra, antice anguste pallida. Antennæ parvæ, ferrugineo-flavæ, articulo 1:mo minutissimo, ultimo compresso, suborbiculato. Epistoma pallide flavum, margine oris argenteo. Oculi virides, lineis 2 purpureis. Thorax rufo-flavus nitidus, dorso nigro postice macula laterali flava. Pectus punctis 2 nitidis nigris. Scutellum rufo-flavum. Abdomen ovatum, rufo-flavum, linea dorsali angusta abbreviata nigra. Incisuræ etiam tenuiter nigricantes per lineolam nigram incompletam ad latera subconfluentes. In segmento 5:to utrinque punctum album. Alæ pure hyalinæ, abdomine multo longiores. Nervi longitudinales: 1:mus (nobis 2:dus) brevissimus; 2:dus (3:tius nob.) reetus ad apicem alæ extensus; 3:tius (4:tus nob.) leniter curvatus mox pone apicem alæ excurrens; 4:tus (5:tus nob.) ad medium marginis interioris ductus; nervi transversi: medius app. ei auxiliaris oppositus; ordinarius deest. Halteres flavi (capitulo sèpe nigro-brunneo). Pedes rufo-flavi."

♀. "Epistoma album, in sinu oris subrufo-flavum. Frons tota nigra, nigredine paullo infra antennas descendente. Abdomen fere globosum, rufo-flavum, basi punctis 5 nigris. Incisuræ segmentorum 2 & 3 anguste nigræ, nigredine ad latera non-nihil dilatata, sed non usque ad summum marginem lateralem extensa. Oviductus brevis niger. Reliqua omnia ut in mare".

Obs. Clar. Meigen hoc insectum in floribus Heraclei legit.

3. *A. elegans*: flavo-ferruginea, epistomatis margine apicali argenteo; fronte thoraceque fusco-lineatis; abdomine ovato-oblongo, nigro-punctato. ♂♀. (Long. circiter $\frac{2}{3}$ lin.).

Hab. in Westrogothia, ubi a D. Prof. Boheman 1834 detecta mihique benigna communicata.

♂Q. Amissis & squamulis priori, sed fronte thoracisque dorso ferrugineis fusco-lineatis, nec totis nigris, &c., distincta. Tota flavo-ferruginea, aperta glabra, setulis ordinariis nigris. Frons lineolis 2 fuscis obsoletissimis. Antennæ mediocres flavæ, articulo ultimo rotundato-ovali, seta pauci-plumata nigra, sub microscopio visa omnino ut in *A. concinna* constructa; radios nempe 6—9 alternantes numero. Epistoma infra oculos haud descendens, toto margine apicali antico argenteo, superne linea transversa nigra terminata, seta mystacina parva. Proboscis testacea. Genæ breves ferrugineæ. Oculi mediocres rotundi, immota obscure ferruginei. Thorax ferrugineo-flavus, dorso vittis subquatuor abbreviatis fuscis obsoletis. Scutellum flavum immaculatum. Abdomen, in ♀ oblongum, apice acutum, totum gallidum, punctis pluribus atris, plerisque in lineas tres transversas dispositis; in ♂ ovatum, signaturis atris, ita confluentibus, ut fere totum dorsum nigrum evadat, relicto uno obtuso 1. rotundato pallido. Alæ longæ subangustatæ hyalinæ, nervis tenuibus pallidis, omnino ut in *Dr. concinna* directis. Halteræ flavæ, clava supra fusca. Pedes graciles, nudi, toti pallide flavati.

Obs. Descriptio supra allata secundum specimen masculum præcipue confecta fuit. Femina, hodie mihi deperdita, in collectione non diutius adest, unde adumbrationem feminæ secundum annotationes hujus sexus olim factas tantum dare potui.

185. STEGANA Meig.

Corpus parvum, ovato-oblongum, nitidulum, glabriulum, setis ordinariis in vertice, thoracis lateribus scutellique margine vestitum. Antennæ incumbentes, breviusculæ, articulo 1:mo brevissimo, ultimo ovato-oblongo compresso apice obtuso, basi

seta dorsali undique longe plumata. Frons modice lata, non prominula, nuda, orbitis oculorum posticis vrticeque ut in cuggeneribus setosis. Ocelli vrticis 3 approximati. Epistoma infra oculos leniter descendens, leniter bi-impressum, latum, margine antico integro, seta mystacina utrinque unica conspicua. Setulæ laterales oris plures valde exiguae. Apertura oris ampla. Haustellum geniculatum, proboscide crassa puberula. Palpi oblongiusculi, dilatati seu obtuse triangulares, compressi. Prælabrum subprominulum. Genæ modice longæ. Oculi magni, perpendiculariter rotundato-oblongi, nudi. Thorax oblongus, ad latera vestigio suturæ transversæ. Scutellum majuscum, planum, margine 4-setosum. Abdomen oblongum, segmentis 6 subæque longis, ultimum parvum. Alæ abdomine longiores, tenuisculæ, incurvæ, deflexæ, suscendine tinetæ. Nervi longitudinales: auxiliaris brevis (circiter 4.tam costæ partem attingens), 2:dus elongatus rectus, 3:tius rectus mox ante, & 4:tus leniter incurvatus mox pone apicem alæ excurrentes (hinc 3 & 4 versus apicem lenissime convergentes ut in *Asteia*), horum 4:tus cum costali conjunctus, 5:tus ad marginem interiorem alæ extensus, basalis ad marginem non continuatus; transversi modice distantes, perpendicularares recti, horum medius apici auxiliaris oppositus, ordinarius paullo ante medium areæ ultimæ insertus, a margine modice remotus. Segmentum costæ 2:dum 3:tio duplo longius, at segmentum nervi longitudinalis 4:ti secundum ultimo saltem $1\frac{1}{2}$ brevius. Costa nuda, basi breviter setulosa. Pedes simplices inermes, puberuli, semoribus anticis subtus pilosulis. Color niger aut ferrugineus. Motu sat agilis. Volatus brevis. Reptatus celer. Habitatio in soliis. Metamorphosis ignota. Differentia sexus; mas: ano obtuso; femina: ano acuto. Typus generis: *St. nigra*.

I. S. hypoleuca: fusco-ferruginea, subtus albicans; capite flavo-alboque maculato; abdomine nigro; pedibus flavicantibus; alis fuliginosis. ♂♀. (Long. ♂ $1\frac{1}{4}$, ♀ 2 lin.).

Mas: minor, "fuscus, subtus albus, thorace ferruginoso, pedibus flavo-albis" Meig.;

Fein. Edulugo major, thoracis dorso ferrugineo, femoribus posterioribus & medio ad apicem obscure brunneis.

Meig. Dipl. 6. 80. 2. ♂♀. Macq. Buff. 2. 551. 2.

Coll. Ins. Lapp. 775. 1. ♀. var.

Hab. in Scandinavia valde rara; in Ostrogothia ad Gusum, testante Prof. Wahlberg; in Lapponia Umensi ad Lycksele in Pino resinosa d. 19 Jun. 1832 unicum individuum femineum inveni; in Dania ad Hafniam, D. D. Westermann & Stæger; ad Strandmölle Selandiæ William D. Drewsen capta mecumque communicata. (Duo præterea exempla exotica in museo meo adsunt).

♂ (qualis ad Kiliam occurrat): frons & thoracis dorsum ferruginea, nitida. Epistoma, corpus subtus & pedes flavido-alba. Abdomen nigro-brunneum. Alæ fuliginosæ, ad costam saturatores. Halteræ albidi.

♀ (qualis in Dania obvia): frons lata rufa, nitida, antice macula gemina fusca sæpe obsoleta, postice setis nigris. Antennæ oblongæ fusco-rufæ, basi superne breviter setulosæ, articuli ultimi seta pallida distincte plumata, plumis fuscis. Epistoma flavido-album, lineis 2 transversis nigris, una sub antennis, altera mox ante marginem apicalem. Seta mystacina & setulæ oris laterales nigrae. Instrumenta cibaria flava. Genæ albidae. Oculi in mortua fusco-brunnei, in viva rufo-brunnei, lineis 2 transversis purpureis. Thorax supra rufo-ferrugineus nitidus subtilissime punctulatus nigro-puberulus, vittis 3 dilute brunneis plerumque parum conspicuis; subtus albidus, vitta pectorali (sub thoracis margine lateral) a capite ad abdomen ducta sat lata determinata atræ. Scutellum magnum, rufo-ferrugineum, maculis duabus brunneis obsoletis. Abdomen oblongum nitidulum, nigrum & nigro-puberulum; apice sensim acuminatum. Alæ latæ, deflexæ, fuscane, ad costam saturatius fu-

liginosæ. Nervus longitudinalis 5:us infra transversum ordinariū ad marginem interiorem curvatim flexus, nec recte excurrentis. Halteres pallidi. Pedes cum coxis albidi, posteriorum femoribus a medio ad apicem, tibiisque basi late, nigris.

Obs. Specimen feminineum Lapponicum a nuper descriptis Daniis discrepat: magnitudine paullo minore (circiter $1\frac{1}{4}$ lin. long.), frontis vittis 2 longitudinalibus fuscis, nec solum maculis anticeis 2 obscuris, thoracis vittis 3 dorsalibus nigro-brunneis ita confluentibus, ut fere totum dorsum obscurum evadat, relicto limbo antico & laterali inæqualiter flavo, scutello supra toto nigricante, alis sordide hyalinis, ad costam tantum fuscanis, ut & femorum tibiarumque posteriorum, nigredine multo dilutior. Cetera omnia exacte quadrant. Vix specie distincta.

2. *S. nigra*: nigra, capite lutescente; antennis pedibusque flavis, femoribus posterioribus obscuris; alis fuliginosis. ♂♀. (Long. 1— $1\frac{1}{4}$ lin.).

Meig. Dipt. 6. 79. 1. T. 58. f. 24 & 25. Macq. Buff. 2. 551. 1. T. 22. f. 10. — *Drosophila curvipennis* Fall. Geomyz. 4. 1. ♂♀.

Hab. in soliis fruticum præsertim *Coryli* Avallanæ, per hortos, prata silvatica, nemora &c., Scandinaviæ meridionalis & mediæ passim, in copula etiam deprehensa; scilicet in Sæania ad Fogelsång prope Lund, Esperöd &c.; in Smolandia, museum *Ljungshii*; in Ostrogothia ad Gusum, Lärketorp, Egebylund, Rismarken prope Wadstena, Medhamra &c., sat frequens; in Westrogothia, beat. *Dalman*; in Ölandia; in Gotlandia ex. gr. ad Näbr, Gothem, Thorsborg, Westerby, Fardhem, Öja &c., non parce; in Helsingia ad Storbyn in paroecia Färila rarissime, sed supra hanc provinciam a me frustra qvæsita; in

Norwegia, in Christianiam, D. Moe, ad Thynas verdalijæ semel, D. Dahlbom; in Dania, D. Stæger. (E Finlandia a Prof. Sahlberg missa).

♂. Prior similis, sed magnitudine duplo minore, antennarum seta plumata albida, nec obscura, epistomate sordide albican-te impicto, nec lineis transversis nigris ornato, palpis nigris, thorace supra & subtus nigro, ut & femoribus posteriori- bus fere totis obscuris, præcipue dignota. Frons modice & aequa lata, lutea, vertice fuscescente, puncto ocellorum obscu-ro. Antennæ flavæ, seta distincte plumata albida. Epistoma sordide albidum, seta mystacina parva nigra. Palpi nigri, basi flavicantes. Proboscis testacea. Genæ albicantēs. Oculi magni, oblongi. Thorax crassiusculus, niger nitidus nigro-puberulus, setis lateralibus distinctis nigris. Scutellum nigrum. Abdomen thorace nonnihil angustius, nigrum nitidum nigro-puberulum. Alæ latæ deflexæ fuliginosæ, ad marginem interiorem indeter-minato fusco-hyalinæ. Nervi ut in priori directi, sed nervus longitudinalis 5:us infra ordinarium minus curvatum flexus. Forte etiam nervi transversi nonnihil magis approximati. Hal-teres albidi. Pedes cum coxis flavidio-albidi, posteriorum fe-moribus fuscis, basi pallescentibus. Tibiæ posticæ etiam basi anguste fuscae.

Variat (in specimine Helsingico) femoribus anticis apice, fronte- que fere tota, nigris. — Variat etiam forte juvenilis pleuris pallescentibus l. rufescensibus, vitta pectorali semper atra.