



not 81

1905

ZWEI NEUE
STREPSIPTEREN

AUS JAVA

VON

Prof. Dr. J. C. H. DE MEIJERE (Hilversum).

MIT EINER TAFEL.

In der Ausbeute des Herrn EDW. JACOBSON befanden sich auch 2 Strepsipteren-Arten, welche er so freundlich war mir zur Bearbeitung zu überlassen. Die eine wurde in zahlreichen Stücken und in beiden Geschlechtern auf einer kleinen Fulgoride gefunden, welche sich von dem Grase »alang-alang'' (*Imperata arundinacea* Cyrill. var. *Koenigii* Benth.) ernährt. Die ersten Exemplare wurden am 20^{ten} Juni 1905 erbeutet. Es zeigten sich auch in den folgenden Tagen zahlreiche stylopirte Exemplare; diese wurden in einem Gazekäfig auf dem genannten Grase eingebunden und am 28^{ten} Juni schlüpfte aus einem derselben das erste männliche Strepsipteron. Auch im Juli fand JACOBSON fortwährend zahlreiche befallene Exemplare eben dieses Homopterons, und züchtete aus denselben noch mehrere Männchen; auch einige stylopirte Larven wurden angetroffen. Öfters zeigte ein und dasselbe Homopteron mehrere Parasiten, sowohl männliche als weibliche. Die männlichen Strepsipteren flogen immer sehr unruhig an der beleuchteten Seite des Gazekäfigs auf und nieder und

TAFELERKLÄRUNG.

- Taf. 7. Fig. 1. *Ceroides Fruhstorferi* n. sp., Kopf.
 » » » 2. » » Spitzenzelle.
 » » » 3. » » *obscura* Brun, Kopf.
 » » » 4. » » Spitzenzelle.
 » » » 5. *Microdon Novae-Guineae* n. sp. Fühler.
 » » » 6. » » *simplicicornis* n. sp. »
 » » » 7. » » *trijunctus* n. sp. »
 » » » 8. » » *limbinervis* n. sp. Flügel.
 » » » 9. » » Fühler.
 » » » 10. » » *Gragei* n. sp. Fühler.
 » » » 11. » » *vespiformis* n. sp. Fühler.
 » » » 12. *Eumerus parallelus* n. sp. »
 » » » 13. *Helophilus bengalensis* Wied. Mittelbein des
 Männchens, a. von hinten, b. von vorn.
 » » » 14. *Helophilus bengalensis*, Haare des Metatarsus.
 » » » 15. » » *quadrivittatus* Wied. Hinterbein
 des ♂.
 » » » 16. *Helophilus niveiceps* n. sp. ♂, Hinterleib.
 » » » 17. *Eristalis obliquus* Wied. 4^{ter} Hinterleibsring
 des Männchens.
 » » » 18. *Eristalis obliquus* ♀, Hinterleib.
 » » » 19. » » *obscuritarsis* n. sp. ♂, Hinterleib.
 » » » 20. » » ♀, »
 » » » 21. » » *quinquestriatus* ♂, Hinterleib.
 » » » 22. » » ♀, »
 » » » 23. » » *lunatus* n. sp. ♀, »
 » » » 24. » » *suavissimus* Walk. ♀, 2^{ter} Hinter-
 leibsring.
- Taf. 8. Fig. 25. *Eristalis maculatus* n. sp. ♀, 2^{ter} Hinter-
 leibsring.
 » » » 26. *Eristalis punctulatus* Macq. ♀, 2^{ter} Hinter-
 leibsring.

- Taf. 8. Fig. 27. *Graptomyza punctata* n. sp. Hinterleib.
 » » » 28. » *maculipennis* n. sp. Flügel.
 » » » 29. » » » Kopf.
 » » » 30. *Chrysogaster rectinervis* n. sp. Flügel.
 » » » 31. *Syrphus serarius* Wied. Hinterleib.
 » » » 32. *Syrphus elongatus* n. sp. Hinterleib.
 » » » 33. » *morokaensis* n. sp. »
 » » » 34. » *longirostris* n. sp. »
 » » » 35. » *circumdatus* n. sp. »
 » » » 36. » *triangulifrons* n. sp. »
 » » » 37. » *luteifrons* n. sp. »
 » » » 38. *Rhinobaccha gracilis* n. sp. Kopf.
 » » » 39. *Baccha pallida* n. sp. Spitzenzelle.
 » » » 40. » *rubella* v. d. Wulp. Spitzenzelle.
 » » » 41. » *Austeni* n. sp. Flügel.
 » » » 42. » *Loriae* n. sp. Spitzenzelle.
 » » » 43. *Spheginobaccha macropoda* Big. Flügel.

CORRIGENDA zu „Studien über südostasiatische Dipteren II.“

- p. 105. Auf Zeile 9 ist, hinter Tetanocerinen, »Calobatinen« einzufügen.
- p. 122. Hinter *Rivellia dimidiata* einzufügen: Süd-Neu-Guinea: Etna-Bai, 1 ♀, Koch leg.
- p. 137. *Sapromyza histrio* n. sp. ist = *Lauwania* (*Sapromyza*) *trypetoptera* Hendel in: WIJTSMAN, Genera insectorum, 68^{me} fasc., Lauwaninae, 1908, p. 47).
- p. 145. *Sapromyza Kertészi* nov. nom. ist = *Lauwania* (*Sapromyza*) *orientis* Hendel, nov. nom., l. c. p. 42).
- p. 155. *Drosophila maculiventris* n. sp. Der Name ist wegen *Dr. maculiventris* v. d. Wulp umzuändern; ich nenne die Art *Dr. guttiventris*.
- p. 160. *Scaptomyza bimaculata*: In der Tabelle auf p. 152 ist diese Art mit aufgenommen, aber ohne Angabe des Gattungsnamens.

J. Hübner

Sammlung Europäischer Schmetterlinge

nebst Fortsetzung von O. Geyer.

1805—41, 790 colorirte Kupfertafeln in-4.

Preis 900 Mark.

G. Herrich-Schäffer

**Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge
von Europa.**

6 Bände Text mit 36 Umrissstafeln
und 636 colorirten Kupfertafeln. 1843—56. gross-4.

Preis 900 Mark.

Daraus einzeln die 6 Textbände
(— als Text, Revision und Supplement zu J. Hübner's Sammlung
europäischer Schmetterlinge —)

in gross-4., mit 36 Umrissstafeln, 1843—56.

Ausserordentlich ermässigtter Preis 20 Mark.

Neue Schmetterlinge aus Europa.

3 Hefte mit 26 colorirten Kupfertafeln (soviel als erschienen
1856—61. gross-4.

Preis 50 Mark.

Lepidoptera exotica nova.

**Sammlung neuer oder wenig bekannter
aussereuropäischer Schmetterlinge.**

Band I und II, Lieferung 1, mit 129 colorirten Kupfertafeln
soviel als erschienen. 1850—69, gross-4.

Preis 300 Mark.

Zu beziehen von

R. Friedländer & Sohn. Berlin N.W. 6. Karlstrasse 14.