

BECKER, T. (1905)

ENTOMOLOGISCHES INSTITUT
der
Eidg. Techn. Hochschule in Zürich

J 3c

KATALOG

DER

PALÄARKTISCHEN DIPTEREN

BEARBEITET VON

TH. BECKER, Dr. M. BEZZI, Dr. K. KERTÉSZ
und P. STEIN.

BAND IV.

CYCLOREHAPHA SCHIZOPHORA : HOLOMETOPA

von TH. BECKER. (1905) (1-273)

CYCLOREHAPHA SCHIZOPHORA : PUPIPARA

von Dr. M. BEZZI.

BUDAPEST.

1905.

328 pp.

- annulipes* v. Ros., Württemb. Corrbl., 63. (1840).
femoralis Meig., S. B., VII. 390. 85. [*Chlorops*] (1838); Beck., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 337. 85. (1902).
flaviventris v. Ros., Württemb. Corrbl., 63. (1840).
fusipes v. Ros., Württemb. Corrbl., 63. (1840).
femoralis Meig. = *cornuta* Fall.
flaviventris v. Ros. = *cornuta* Fall.
flavo-frontata Beck., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 151. 243. (1903). Aegyptus.
furcata Perris, Ann. Soc. entom. Fr., 194. (1876). Gallia.
fusipes v. Ros. = *cornuta* Fall.
megaspis Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 74. 13. (1858); Bezzi, Italia,
Ditt. d. Calabria, 71. (33). (1895). Asia min.
pectoralis Bezzi, Ditt. d. Calabria, 35. (1895). Italia mer.
sibirica Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 73. 12. (1858). Sibiria.
trisulcata Beck., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 152. 244. (1903). Aegyptus.

Microneurum

- Beck., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 152. (1903).
maculifrons Beck., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 153. 246. t. IVe. Aegyptus.
f. 77, 78, 79. (1903).

Anacamptoneurum

- Beck., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 155. (1903).
obliquum Beck., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 155. 252. t. IVe. f. Aegyptus.
80, 81, 82. (1903).

Anatrichus

- Lw., Bidrag til Känded. om Afr. Dipt., 97. 7. (1860).
erinaceus Lw., Bidrag til Känded. om Afr. Dipt., 97. 13. (1860) et Africa mer.,
Zeitschr. f. d. gesam. Naturw., XLIV. 210. 15. (1874); Beck., Aegyptus.
Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 152. 245. t. IVe. f. 70, 71, 72. (1903).

EPHYDRIDAE.

Notiphilinae.

Notiphila

Fall., Act. Holm. Kgl. Vetensk. Akad. Handl., 250. (1813)

Keratocera Rob.-Desv., Myod., 788. 4. (1830).

- annulipes* Stenh., Ephydr., 203. 8. (1844); Zett., Dipt. Scand., V. Europa centr.
1846. 7. (1846); Lw., Neue Beitr., VII. 7. 11. (1860); Schin., F. et sept.

Drosophilinae.

Aulacigaster

MACQ., Suit. à Buff., II. 579. (1835).

Ampycophora WAHLB., Öfvers. af Vetensk. Akad. Förh., 9. (1847).

Apotomella DUF., Ann. Soc. entom. Fr., II. 4. (1846).

Diastata p. p. MEIG., S. B., VI. 379. (1830).

aenea var. β . FALL. = *rufitarsis* MACQ.

diadema MEIG. = *rufitarsis* MACQ.

impressifrons DUF. = *rufitarsis* MACQ.

leucopeza MEIG. = *rufitarsis* MACQ.

rufitarsis MACQ., Suit. à Buff., II. 580. 1. t. XXIII. f. 2. (1835); DUF., Europa.

Metamorph. Ann. Soc. entom. Fr., IV. 455. (1846); ZETT., Dipt.

Scand., VII. 2707. 1. (1848); SCHIN., F. A., II. 270. (1864); BRAUER,

Zweifl. d. K. Mus. Wien, 88. (1883); BEZZI, Contrib. alla F. ditt.

Pavia, 21. 45. (1891).

aenea var. β . FALL., Dipt. Suec. Hydromyz., 11. 11. [*Notiphila*] (1823).

diadema MEIG., S. B., VII. 379. 21. [*Diastata*] (1838); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 305. 21. (1902).

impressifrons DUF., Ann. Soc. entom. Fr., II. 4. 460. t. XI. f. 1—14. [*Apotomella*] (1846).

leucopeza MEIG., S. B., VI. 100. 15. [*Diastata*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 305. 15. (1902).

tarsata WAHLB., Öfvers. af Vetensk. Akad. Förh., 9. 261. t. VII. f. 2. [*Ampycophora*] (1847).

tarsata WAHLB. = *rufitarsis* MACQ.

Urapucha

CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 127. (1903).

spuria THOMS., Eugen. Resa, 599. 291. (1868); CZERNY, Wien. entom. China. Zeitg., XXII. 127. (1903).

Liomyza

MACQ., Suit. à Buff., II. 605. 15. (1830).

Anthophilina ZETT., Ins. Lapp., 785. (1838).

aenea ZETT. olim = *scatophagina* FALL.

curvipennis ZETT. = *scatophagina* FALL.

flavipes FALL. = *scatophagina* FALL.

glabricula MEIG., S. B., VI. 179. 39. t. LXI. f. 37. [*Agromyzaj*] (1826); Europa centr.

MACQ., Suit. à Buff., II. 605. 1. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. et sept.

2678. Observ. 1. (1847); SCHIN., F. A., II. 310. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 340. 39. (1902).

laevigata MEIG., S. B., VI. 179. 40. [*Agromyza*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 605. 2. (1835); SCHIN., F. A., II. 310. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 340. 40. (1902).

scatophagina FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 3. 3. [*Heteroneura*] (1823); MEIG., S. B., VI. 181. 46. [*Agromyza*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2676. 1. (1848) et XIV. 6444. 1. (1860); TIEF., Jahresber. d. naturhist. Mus., XVIII. 10.; CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 127. (1903).

aenea ZETT., olim. vide Dipt. Scand., VII. 2677. (1847).

curvipennis ZETT., Ins. Lapp., 785. 2. [*Anthophilina*] (1838).

flavipes FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 5. 6. [*Agromyza*] (1823).

Europa centr.
et sept.

Periscelis

Lw., Berlin. entom. Zeitschr., II. 113. (1858).

annulata FALL., K. Vetensk. Akad. Handl., 250. 3. [*Notiphila*] (1813) Europa.
et Dipt. Suec. Hydromyz., 9. 3. [*Notiphila*] (1823); MEIG., S. B., VI. 114. 1. [*Ephydra*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 536. 1. [*Ephydra*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2546. 2. [*Drosophila*] (1847); SCHIN., F. A., II. 272. (1864); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 20. 40. (1891); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 309. 1. (1902).

annulipes Lw., Berlin. entom. Zeitschr., II. 118. t. I. f. 31—33. (1858); Silesia.
SCHIN., F. A., II. 272. (1864).

Winnertzi EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 720. (1862); SCHIN., Austria.
F. A., II. 272. (1864).

Gitona

MEIG., S. B., VI. 129. (1830).

Acletoxenus FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 152.
(1868).

distigma MEIG., S. B., VI. 130. t. LX. f. 16—19. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 548. 1. (1835); Lw., Allgem. deutsche naturh. Zeitschr., II. 295. t. II. f. 11, 12. (1847); SCHOLTZ, Zeitschr. t. Entom. Breslau, 1—3. 15. (1855); SCHIN., F. A., II. 274. (1864); KALTENB., Pflanzenf. 396. 19. (1872); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 88. (1883).

formosa Lw. = **ornata** MEIG.

ornata MEIG., S. B., VI. 176. 29. [*Agromyza*] (1830); WALK., Ins. Brit., II. 243. 3. [*Agromyza*] (1853). Europa centr.
et mer.,

formosa Lw., Wien. entom. Monatschr., VIII. 366. (1846). Ins. Canar.

syphoides FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 152. et 897.

[*Acletoxenus*] (1868); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 92.
(1883); STROBL, Wiss. Mitth. aus Bosn. u. d. Herzegov. Wien,

VII. 87. (637). (1900); COLLIN, Entom. Monthl. Mag. 2. Série,
XIII. 1—3. t. 1. (1902).

pruinosa BIGOT., Explor. scient. de la Tunesie, 10. (1888).
sphyoides FRFLD. = *ornata* MEIG.

Tunisia.

Phortica

SCHIN., Wien. entom. Monatschr., VI, 433. (1862).

Amiota Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VI. 93. Cent. II. (1862).

alboguttata WAHLB., Acta Acad. Sc. Holm., 22. 11. (1838); ZETT., Suecia, Dipt. Scand., VI. 2547. 3. [*Drosophila*] (1847); OST.-SACK., Catal. Amer. sept. Dipt. N. Amer., 205. (1878).

poecilogastra Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XLIII. 419. 20. Rossia mer. [*Amiota*] (1874).

variegata FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 5. 2. [*Drosophila*] (1823); Europa. MEIG., S. B., VI. 82. 1. [*Drosophila*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 548. 1. [*Drosophila*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2544. 1. [*Drosophila*] (1847); HEGGER, Sitzgsber. d. K. Akad. d. Wiss., IX. (1852); SCHIN., F. A., II. 274. (1864); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 276. 8. (1882); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 88. (1883); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 21. 41. (1891).

Stegana

MEIG., S. B., VI. 79. 207. (1830).

annulata HALID., WALK., MIK = *coleoptrata* SCOP.

coleoptrata SCOP., Entom. carn., 338. 907. [*Musca*] (1763); SCHIN., Europa centr. F. A., II. 271. (1864); STROBL, Dipt. v. Steyerm., IV. 266. (1894).

annulata HALID., Entom. Mag., I. 172. (1833). WALK., Ins. Brit., III. Nachtrag pag. XIV. (1856); MIK, Wien. entom. Zeitg., 219. (1898).

hypoleuca MEIG., S. B., VI. 80. 2. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 551. 2. (1835); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 385. (1877).

curvipennis FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 4. 1. [*Drosophila*] (1823); Europa centr. SCHIN., F. A., II. 271. (1864).

furta WALK., Ins. Brit., III. XIV. (1856).

nigra MEIG., S. B., VI. 79. 1. t. LVIII. f. 24, 25. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 551. 1. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2579. 2. (1847).

furta WALK. = *curvipennis* FALL.

hypoleuca MEIG., MACQ. = *coleoptrata* SCOP.

hypoleuca ZETT. = Strobl MIK.

nigra MEIG., MACQ., ZETT. = *curvipennis* FALL.

Strobl MIK, Wien. entom. Zeitg., XVII. 216. VI. (1898).

hypoleuca ZETT., Dipt. Scand., VI. 2577. 1. (1847).

Transssylv.,
Suecia.

Asteia

MEIG., S. B., V. 88. 209. (1830).

- amoena** MEIG., S. B., VI. 89. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 620. Europa centr. 1. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2574. 2. (1847); WALK., Ins. et sept. Brit., II. 240. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 280. (1864); BECK., Mitth. Aegyptus. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 184. 314. (1903).
- concinna** MEIG., S. B., VI. 90. 2. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 621. Europa centr. 2. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2573. 1. (1847); WALK., Ins. et sept. Brit., II. 240. (1853); SCHIN., F. A., II. 280. (1864).
- elegantula** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2575. 3. (1847); SCHIN., F. A., II. Suecia. 281. (1864).
- nigra** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6420. 4. (1860). Suecia.

Leucophenga

MIK, Wien. entom. Zeitg., V. 317. (1886).

- maculata** DUF., Ann. Soc. nat., 49. 14. t. 3. f. 85. (1839); ZETT., Europa. Dipt. Scand., XIV. 6428. 19—20. [*Drosophila*] (1860); SCHIN., F. A., II. 276. [*Drosophila*] (1864); MIK, Wien. entom. Zeitg., V. 317. (1886).
- quinquemaculata** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 283. 21. (1893). Styria.

Drosophila

FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 4. (1823).

- aceti** KOLLAR, Heeger Sitzsber. d. K. Akad. d. Wiss. Wien, VII. Austria. (1851); BRAUER, Zweifi. d. K. Mus. Wien, 87. (1883).

adspersa MIK = **repleta** WOLLASTON.

- albilabris** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6425. 3—4. (1860). Suecia.
albopunctata BECK., Acta Soc. scient. Fenn., 64. 135. (1900). Sibiria.
ampelophilica Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VI. 231. II. Centuria (1862). Italia, Afr.
uvarum ROND., Bull. Comiz. Agr. Parma, (1875) et Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, 86.—(1876); BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., XXIII. (1881); COMSTOCK, Report on Ins. (1881); WASHINGTON, Sep. p. 6—9. Plat. XV. (1882); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XXXIII. 188. (1883) et Wien. entom. Zeitg., V. 331. Anmerk. (1886); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia Firenze, 21. 42. (1891). BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 184. 315. (1903).

- analis** MACQ., Dipt. exot., II. 3^{tem} part, 258. 2. (1843); LUCAS, Explor. Algeria. scient. de l'Algérie, III. 500. 269. (1849).

- approximata** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2557. 12. (1847); SCHIN., F. A., Suecia. II. 277. (1864).

- cameraria** HALID., Entom. Mag., I. 174. (1833). Britannia.

- cellaris** FABR., Entom. syst., IV. 332. 85. (1794) et Syst. Antl., 305. Europa centr. 108. [*Musca*] (1805); GEOFFR., Ins., II. 536. 85. Mouche du vinaigre [*Musca*] (1799); ? WALK., Ins. Dipt., II. 237. 1. (1835).
- cellaris** MACQ. = **funebris** FABR., **cinerella** FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 7. 9. (1823); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2551. 6. (1847).
- confusa** STAEG., Kröyer's Tidskr., I. 1. 18. 2. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2565. 18. (1847); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 276. 9. (1882).
- fenestrarum** MEIG., S. B., VI. 83. 4. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 549. 4. (1835); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 500. 267. (1849); WALK., Ins. Brit., II. 237. 4. (1853); SCHIN., F. A., II. 279. (1864).
- congesta** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2558. 13. (1847). Suecia.
- distincta** Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 780. (1862); SCHIN., F. A., II. 277. (1864). Austria.
- erythrophthalma** PANZ. = **funebris** FABR.
- fasciata** MEIG., S. B., VI. 84. 7. (1830); DUF., Ann. Soc. sc. nat., 2. Série, XI, XII. 49. (1838); SCHIN., F. A., II. 278. (1864); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 88. (1883).
- fenestrarum** FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 6. 4. (1823); ZETT., Ins. Lapp., 775. 2. et 776. 2. var. b. (1838); STAEG., Kröyer's Tidskr., 1. 1. 18. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2568. 21. (1847); SCHIN., F. A., II. 278. (1864); HENNEBERG, Die deutsche Essigindustrie, No. 41—42. p. 2, 3. fig. 1, 3. (1902).
- nitidiventris** MACQ., Suit. à Buff., II. 551. 12. (1835); MEIG., S. B., VII. 377. 22. (1838).
- fenestrarum** MEIG., MACQ., WALK., SCHIN., LUCAS = **confusa** STAEG.
- flava** FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 7. 10. (1823); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2570. 22. (1847).
- testacea** v. Ros., Württemb. Corrbl., 62. (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 30. p. 58. (1902).
- flavipes** MEIG., S. B., VI. 108. 15. [*Oponyza*] (1830).
- funebris** FABR., Mantissa Ins., II. 345. 33. (1787) et Ent. syst., IV. 323. 48. [*Musca*] (1794); GMEL., Syst. Nat., I. 5. 2842. 190. [*Musca*] (1793); FABR., Syst. Antl., 299. 76. [*Musca*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 5. 3. (1823); MEIG., S. B., VI. 82. 2. (1830); HALID., Curtis Brit. Entom., 473. (1823—40); ZETT., Ins. Lapp., 775. 1. (1838); WESTW., Introduet., II. 574. (1840); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2563. 17. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 237. 2. (1853); SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, 1—3. p. 19. et 4. p. 32. (1855); HEGER, Sitzgsber. d. K. Akad. d. Wiss. Wien, XXXI. 297. (1874); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 88. (1883); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 21, 43. (1891); HENNEBERG, Die deutsche Essigindustrie, No. 41—42. p. 3. fig. 2. (1902).
- cellaris** MACQ., Suit. à Buff., II. 549. 2. (1835); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 500. 266. (1849).

- erytrophthalma* PANZ., Fauna Germ., XVII. 24. [*Musca*] (1794).
oenopota SCOP., Entom. carn., 337. 905. [*Musca*] (1763).
- fuscula** MEIG. (*nec* FALL.), S. B., VI. 87. 18. (1830). Suecia.
- histrio** MEIG., S. B., VI. 85. 8. t. LIX. f. 4. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 550. 6. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2566. 19. (1847); SCHIN., F. A., II. 278. (1864). Europa centr. et sept.
- ingrata** HALID., Entom. Mag., I. 174. (1833). Britannia.
- Johni** POKORNY, Mittl. d. naturwiss. Ver. Troppau, No. 4. 63—64. (1896); MIK, Wien. entom. Zeitg., XV. 231. (1896). Austria.
- lacateguttata** PORTSCH., Hor. Soc. Entom. Ross., XXVI. 226. (1891). Rossia.
- limbata** v. Ros., Württemb. Corrbl., 62. (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 29. p. 58. (1902). Germania.
- litorella** MEIG., S. B., VII. 374. 6. [*Hydrellia*] (1838). Bavaria.
- littoralis** MEIG., S. B., VI. 87. 16. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 550. 10. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 302. 16. (1902). Germania, Galba.
- maculipennis** GIMMERTH., Corresp. Bl. Riga, I. 106. 5. et Bull. de Moscou, IV. 199. 3. (1847). Rossia.
- melanogaster** MEIG., S. B., VI. 85. 9. (1830); HALID., Entom. Mag., I. 174. (1833); MACQ., Dipt. exot., II. 3. part. 258. (1843); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 500. 268. (1849); SCHIN., F. A., II. 277. (1864); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII, 45. 2. (1867); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 301. 9. (1902). Europa centr. et mer., Afr. sept.
- nigriventris* ZETT., Dipt. Scand., VI. 2557. 11. (1847). Germania.
- nigriceps** MEIG., S. B., VII. 378. 23. (1838). Germania.
- nigricolor** STROBL, Dipt. v. Steyerm., IV. 266. (1898). Styria.
- nigrimana** MEIG., S. B., VI. 87. 17. (1830). Europa centr.
- nigrita** HALID., Entom. Mag., I. 174. (1833); VERRAL, List of Brit. Dipt., 29. 36. (1901). et sept.
- nigriventris* ZETT. = *melanogaster* MEIG.
- nigrosparsa** STROBL, Dipt. v. Steyerm., IV. 267. (1898). Styria.
- nitidapax** BIGOT, Voyage Alluaud aux îles Canaries (1890). Ins. Canariae.
- nitidiventris* MACQ., MEIG. = *fenestrarum* FALL.
- niveo-punctata** DUF., Compt. rend., XXII. 318. et Ann. Soc. entom. Fr., 2. Série Tom., 4. 323. p. IX. (1846). Gallia.
- obscura** FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 6. 6. (1823); ZETT., Ins. Lapp., 776. 4. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2549. 4. (1847); SCHIN., F. A., II. 277. (1864); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 21. 42. (1891). Europa.
- obscura** MEIG. (*nec* FALL.), S. B., VI. 85. 11. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 550. 7. (1835); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 194. (1876); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 133. (1893) et Wien. entom. Zeitg., XIX. 5. 297. (1900). Europa centr. et mer.
- oenopota* SCOP. = *funebris* FABR.
- pallipes** DUF., Ann. Soc. entom. Fr., II. 4. 321. t. IX. f. 1—11. (1846); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 87. (1883). Gallia.

- phalerata** MEIG., S. E., VI. 83. 3. t. LIX. f. 3. (1830); MACQ., Suit. Europa centr. à Buff., II. 549. 3. (1835); SCHIN., F. A., II. 276. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 720. 2. (1872); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 300. 3. (1902).
- picta** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2567. 20. (1847). Suecia.
- punctulata** L.W. = **repleta** WOLLASTON.
- repleta** WOLLASTON, Ann. Nat. Hist., I. 117. f. 7. t. V. (1858). I. Madeira,
adsparsa MIK, Wien. entom. Zeitg., V. 328. (1886). Africa occid.,
punctulata Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VI. 232. 100. (1862). Cuba, Austr.
ruficeps v. Ros., Württemb. Corrbl., 62. (1840); BECK., Jahresber. d. Germania.
Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 31. p. 59. (1902).
- rufifrons** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 50. 63. (1873). Hungaria.
- spurca** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2550. 5. (1847). Fennia.
- testacea** v. Ros. = **flava** FALL.
- transversa** FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 6. 5. (1823); MEIG., S. B., VI. 84. 5. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 549. 5. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 776. 3. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2553. 8. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 237. 3. (1853); SCHIN., F. A., II. 276. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 301. 5. (1902). Europa centr. et sept.
- fristis** FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 7. 7. (1823); MEIG., S. B., VI. 86. 12. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 550. 8. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2555. 9. (1847); HALID., Entom. Mag., I. 174. (1833); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 301. 12. (1902). Europa centr. et sept.
- trivittata** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 282. 20. (1893). Styria.
- unimaculata** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 281. 19. (1893). Styria.
- unistriata** STROBL, Wiss. Mitth. aus Bosnien u. d. Herzegov. Wien, VII. 88. (636). (1900). Dalmatia.
- vararum** ROND., BIGOT. = **ampelophila** Lw.
- variegata** HEGGER, Sitzber. d. k. Akad. d. Wiss. Wien, IX. p. 774—781. 4. Pl. (1852). Austria.
- varipes** MACQ., Suit. à Buff., II. 550. 11. (1835); MEIG., S. B., VI. 377. 21. (1838). Gallia.
- virginea** MEIG., S. B., VI. 84. 6. (1830). Germania.

Chymomyza

CZERNY, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., III. 3. 199. (1903)

Drosophila p. p. ZETT., Ins. Lapp., 776. (1838).

- costata** ZETT., Ins. Lapp., 776. 5. [*Drosophila*] (1838) et Dipt. Scand., VI. 2552. 7. [*Drosophila*] (1847); STROBL, Dipt. v. Steyerm., II. 130. [*Drosophila*] (1894); CZERNY, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., III. 3. 200. 1. (1903). Europa centr. et sept.
- fuscimana** ZETT., Ins. Lapp., 776. 6. [*Drosophila*] (1838); Dipt. Scand., VI. 2556. 10. [*Drosophila*] (1847) et Dipt. Scand., XI. 4336. var. b. [*Drosophila*] (1852); CZERNY, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., III. 3. 200. 2. (1903). Europa centr. et sept.

Scaptomyza

HARDY, Proc. Berw. nat. Club., 362. 2. (1849).

amoena MEIG., S. B., VII. 374. 25. [*Hydrellia*] (1838); BECK., Zeitschr. Bavaria.

f. Hymenopt. u. Dipt., II. p. 300. 25. (1902).

apicalis HARDY., WALK. = **flaveola** MEIG.

flava MEIG. (nec FALL.), S. B., VI. 88. 20. [*Drosophila*] (1830); BECK., Germania.

Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 302. 20. (1902).

flaveola MEIG., S. B., VI. 66. 5. [*Notiphila*] (1830); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., IX. (1850); HEEGER, Sitzgsber. d. K. Akad. d. Wiss. Wien, IX. (1852); SCHIN., F. A., II. 279. [*Drosophila*] (1864); GERCKE, Verh. d. Ver. f. naturwiss. Unterhalt. Hamburg, VI. 56. (1880); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 88. (1883).

apicalis HARDY, Proc. Berw. nat. Club., 362. 2. (1849); WALK., Ins. Brit., II. 238. 6. [*Drosophila*] (1853).

graminum var. d. FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 8. 11. [*Drosophila*] (1823).

pallida ZETT., Dipt. Scand., VI. 2571. 23. [*Drosophila*] (1847).

flavipennis ZETT. = **graminum** FALL.

gracilis WALK., Ins. Brit., II. 239. 7. (1853).

graminum FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 8. 11. var. a. [*Drosophila*] (1823); MEIG., S. B., VI. 86. 13. [*Drosophila*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 550. 9. [*Drosophila*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 777. 9. (1838) et Dipt. Sc., VI. 2560. 15. [*Drosophila*] (1847); HARDY., Proceed. of Berwickshire nat. Club., (1849); WALK., Ins. Brit., II. 238. 5. [*Drosophila*] (1853); SCHIN., F. A., II. 279. [*Drosophila*] (1864); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig. V. 238--242. 245—246. (1881); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 88. (1883); BREZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 21. 44. (1891); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 5. 298. (1900); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 187. 325. (1903).

flavipennis ZETT., Ins. Lapp., 777. 8. [*Drosophila*] (1838).

incana MEIG., S. B., VI. 86. 14. [*Drosophila*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 302. 14. (1902).

ruficornis MEIG., S. B., VII. 375. 28. [*Hydrellia*] (1838); BROK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 300. 28. (1902).

sordida ZETT., Ins. Lapp., 777. 7. [*Drosophila*] (1838).

graminum var. d. FALL. = **flaveola** MEIG.

griseola ZETT., Dipt. Scand., VI. 2562. 16. [*Drosophila*] (1847); SCHIN., Suecia. F. A., II. 279. (1864).

incana MEIG. = **graminum** FALL.

pallida ZETT. = **flaveola** MEIG.

ruficornis MEIG. = **graminum** FALL.

rufipes MEIG., S. B., VI. 87. 15. [*Drosophila*] (1830); BECK., Zeitschr. Germania. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 302. 15. (1902).

sordida ZETT. = **graminum** FALL.

Britannia.

Europa,

Ins. Canar.,

Aegyptus.

Camilla

HALID., Ann. of Nat. Hist., II. 188. (1838).

Noterophila ROND., Prodr. I. 133. (1856).

acutipennis Lw., Berlin. entom. Zeitschr. IX. 269. [*Notiphila*] (1865); Europa mer.

STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 5. 296. [*Noterophila*] (1900).

aerata HALID. = *glabra* FALL.

glabra FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 8. 12. [*Drosophila*] (1823); MEIG., Europa.

S. B., VI. 85. 10. [*Drosophila*] (1830); HALID., Ann. of Nat. Hist.,

II. 188. (1839); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2559. 14. [*Drosophila*]

(1847); SCHIN., F. A., II. 276. [*Drosophila*] (1864); STROBL, Wien.

entom. Zeitg., XII. 132. var. *rufipes* [*Notiphila*] (1893).

aerata HALID., CURTIS, Brit. Ins. App., 281. 1337b. [*Diastata*] (1838).

Geomyzinae.

Cyrtotonotum

MACQ., Dipt. exot., II. 3. 193. (1843).

Diastata p. p. MEIG., S. B., VI. 95. (1830).

Diplocentra Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XIII. 13. (1859).

anus MEIG., S. B., VI. 95. 1. [*Diastata*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 552. 1. [*Diastata*] (1835); KERTÉSZ, Természet. Füzetek, 241—244. f. [*Diplocentra*] (1898); MIK., Wien. entom. Zeitg., XVII. 167. 82. (1898); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 303. 1. (1902). *gibbum* PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., I. 8. 30. Pl. VI. f. 1. [*Helomyza*] (1839); MACQ., Dipt. exot., II. 3 part. 193. f. 25. f. 6, 7. (1843).

Perrisi SCHIN., F. A., II. 23. (1864); NOWICKY, Beitr. z. Kentn. Galiz. Dipt., 33. [*Diplocentra*] (1873); GREGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 34. [*Diplocentra*] (1873); POKORNY, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 419. [*Curtonotum*] (1887); BEZZI, Ditt. d. Calabria, 28. [*Diplocentra*] (1895).

gibbum PERRIS, MACQ. = *anus* MEIG.

Perrisi SCHIN., GRZEGORZEK, POKORNY, BEZZI. = *anus* MEIG.

Diastata

MEIG., S. B., VI. 94. 211. (1830).

adusta MEIG., S. B., VI. 96. 2. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 552. 2. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 302. 2. (1902). *albinervis* v. ROS., Württemb. Corrb., 62. (1840). Germania, Gallia, Germania.

- apicalis** ROBERT, Ann. Soc. entom. Fr., 459. 461. (1834); MEIG., S. B., Belgium.
VII. 378. 17. (1838).
- capitata** ROBERT, Ann. Soc. entom. Fr., I. 3. 460. (1834). Belgium.
- frontalis* MEIG., S. B., VII. 378. 18. (1838).
- claripennis** MACQ., Suit. à Buff., II. 554. 10. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia.
379. 19. (1838).
- costata** MEIG., S. B., VI. 96. 4. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 553. Europa centr.
4. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2539. 4. (1847); SCHIN., F. A., et sept.
II. 289. (1864); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 363. 4. (1864);
BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 304. 4. (1902).
- fuscula* FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 7. 8. [*Drosophila*] (1823).
- marginella* ZETT., Ins. Lapp., 777. 10. [*Drosophila*] (1838).
- costata var. b.** ZETT. = **vagans** Lw.
- frontalis** MEIG. = **capitata** ROBERT.
- fulvifrons** HALID., Entom. Mag., IV. 151. (1837). Britannia.
- fuscula** FALL. = **costata** MEIG.
- gracilipes** MEIG., S. B., VI. 100. 16. (1830). = *Campoicnemus* ♀ sp.? Germania.
BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 305. 16. (1902); vide:
Leptopezina MACQ.
- inornata** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 364. 5. (1864). Silesia.
- marginalis** MEIG., S. B., VI. 97. 8. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Germania,
553. 6. (1835). Gallia.
- marginella** ZETT. = **costata** MEIG.
- nebulosa** FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 3. 4. [*Geomyza*] (1823); MEIG., Europa centr.
S. B., VI. 99. 12. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 554. 9. (1835); et sept.
ZETT., Ins. Lapp., 774. 4. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2536. 1. (1847);
SCHIN., F. A., II. 289. (1864); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VIII.
359. 1. (1864).
- ornata* MEIG., S. B., 98. 11. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 553.
8. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 305. 11.
(190-).
- nitida** MEIG. = **striata** ROBERT.
- ornata** MEIG. = **nebulosa** FALL.
- rufipes** MEIG., S. B., VI. 99. 13. (1830). Germania ?
- rufitarsis** MEIG., S. B., VI. 99. 14. (1830). Germania.
- striata** ROBERT, Ann. Soc. entom. Fr., I. 3. 460. (1834). Belgium.
- nitida* MEIG., S. B., VII. 379. 20. (1838).
- unipunctata** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2537. 2. (1847); Lw., Berlin. Europa centr.
entom. Zeitschr., VIII. 361. 2. (1864). et sept.
- vagans** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 362. 3. (1864). Europa sept.,
costata var. b. ZETT., Dipt. Scand., VI. 2539. 4. (1847). Asia, Amer.

Geomyzza

FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 3. 5. (1823); S. str. Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 14. (1865).

Anthophilina ZETT., Dipt. Scand., VII. 2698. (1848); ROND., Agromyz. Bull. Soc. entom. Ital. (1875).

Leptomyza p. p. MACQ., Suit. à Buff., II. 581. (1835).

Trixoscelis ROND., Prodr., I. 134. (1856).

approximata Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 20. 3. (1865); CZERNY, Sicilia, Wien. entom. Zeitg., XXII. 123. (1903). Italia mer.

arenaria HALID. = *obscurella* FALL.

bilineata MACQ., Suit. à Buff., II. 556. 7. [*Opomyza*] (1835); MEIG., Gallia. S. B., VII. 381. 32. [*Opomyza*] (1838).

canescens Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 21. 4. (1865); CZERNY, Silesia. Wien. entom. Zeitg., XXII. 123. (1903).

frontalis FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 7. 1. [*Anthomyza*] (1823); MEIG., S. B., VI. 111. 24. [*Opomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 581. 1. [*Leptomyza*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2698. 6. [*Anthophilina*] (1848); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 22. 5. (1865); ROND., Agromyz., 22. 3. [*Anthophilina*] (1875); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 123. [*Leptomyza*] (1893); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 308. 24. (1902) et Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 187. 323. (1903); CZERNY, Wien entom. Zeitg., XXII. 125. (1903).

nigrimana MEIG., S. B., VI. 92. 2. [*Ochthiphila*] (1830) et S. B., VI. 105. 7. [*Opomyza*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 306. 7. (1902); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 124. (1903).

maculata MACQ. = *obscurella* FALL.

marginella FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 3. 5. (1823); MEIG., S. B., VI. 104. 6. [*Opomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 556. 6. [*Opomyza*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 774. 3. (1838) et Dipt. Suec., VI. 2532. 6. (1847); SCHIN., F. A., II. 287. (1864); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 16. 1. (1865); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 306. 6. (1902); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 124. (1903).

nigrimana MEIG. = *frontalis* FALL.

obscurella FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 4. 6. (1823); MEIG., S. B., VI. 96. 3. t. 59. f. 15. [*Diastata*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 552. 3. [*Diastata*] (1838); ZETT., Ins. Lapp., 774. 5. p. p. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2540. 5. [*Diastata*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 235. 1. [*Diastata*] (1853); SOHN., F. A., II. 288. [*Diastata*] (1864); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 18. 2. (1865); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 20. 38. [*Diastata*] (1891); BECK., Zeitschr. f. Hy-

meopt. u. Dipt., II. 304. 3. (1902); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 124. (1903).

arenaria HALID., Ann. of nat. Hist., II. 187. [*Helomyza*] (1839).
maculata MACQ., Suit. à Buff., II. 558. 15. [*Opomyza*] (1835);

MEIG., S. B., VII. 381. 34. [*Opomyza*] (1838).

pedestris Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 23. 6. (1865); STROBL, Rhodus, Wien. entom. Zeitg., XIX. 5. 300. (1900); BECK., Mitth. Zool. Hispania. Mus. Berlin, II. 3. p. 187. 324. (1903); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 124. (1903).

posticata MEIG., S. B., VI. 66. 4. [*Notiphila*] (1830).

puberula ZETT., Ins. Lapp., 785. 2. [*Anthophilina*] (1838) et Dipt. Scand., VII. 2697. 4. [*Anthophilina*] (1848); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 256. (1902); XXII. 125. (1903).

Germania.
Lapponia,

Tryptochaeta

ROND., Prodr., I. 134. 7. (1856).

? *Campicheta* MACQ., Suit. à Buff., II. 547. (1835).

basalis MEIG. = *punctum* MEIG.

circumdata MEIG. = *punctum* MEIG.

fumipennis MEIG. = *obscuripennis* MEIG.

griseola ZETT. = *punctum* MEIG.

luctuosa MEIG., S. B., VI. 97. 7. [*Diastata*] (1830); MACQ., Suit. à Germania. Buff., II. 553. 5. [*Diastata*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt. II. 304. 7. (1902).

nigricornis Lw. = *obscuripennis* MEIG.

obscuripennis MEIG., S. B., VI. 97. 5. [*Diastata*] (1830); BECK., Zeit- Germania. schr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 304. 5. (1902).

fumipennis MEIG., S. B., VI. 97. 6. [*Diastata*] (1830); SCHIN., F. A., II. 289. [*Diastata*] (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt. 304. 6. (1902).

nigricornis Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 367. 8. (1864).
punctum MEIG., S. B., VI. 98. 10. [*Diastata*] (1830); MACQ., Suit. à Europa. Buff., II. 553. 7. [*Diastata*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2538. 3. [*Diastata*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 236. 2. [*Diastata*] (1853); ROND., Prodr., I. 134. (1856); SCHIN., F. A., II. 289. [*Diastata*] (1864); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 366. 7. (1864); BEZZI., Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 20. 39. (1891).

basalis MEIG., S. B., VI. 98. 9. [*Diastata*] (1830); BECK., Zeit- schr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 304. 9. (1902).

circumdata MEIG., S. B., VI. 103. 4. [*Opomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 555. 3. [*Opomyza*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 306. 4. (1902).

griseola ZETT., Dipt. Scand., XII. 4799. 7—8. [*Geomyza*] (1855); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 125. (1903).

rufipes MACQ., Suit. à Buff., II. 547. 1. [*Campicheta*] (1835).

Gallia.

Opomyza

FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 10. (1820).

asteia HALID., Entom. Mag., I. 177. (1833).

Hibernia.

fasciata MACQ., Suit. à Buff., II. 556. 5. (1835); MEIG., S. B., VII.

Gallia.

381. 31. (1838).

florum FABR., Entom. syst., IV. 352. 164. [*Musca*] (1794) et Syst.

Europa.

Antl. 317. 3. [*Tephritis*] (1805); MEIG., S. B., VI. 102. 2. t. LIX.

f. 22. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 555. 2. (1835); ZETT., Ins.

Lapp., 762. 3. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2416. 2. (1847); WALK.,

Ins. Brit., II. 234. 2. (1853); SCHIN., F. A., II. 285. (1864); Lw.,

Berlin. entom. Zeitschr., IX. 29. 2. (1865); KALTENB., Pflanzenf.,

743. 46. (1872); ROND., Lonchein., 12. 1. (1874); BEZZI, Contrib.

alla F. ditt. di Pavia, 20. 37. (1891); SINTENIS, Wien. entom.

Zeitg., XI. 180. (1892).

Nataliae EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 781. (1862);

SCHIN., F. A., II. 285. (1864).

novempunctata GIMMERTH., Bull. de Moscou, XV. 683. [*Sapro-*

myza] (1842).

trinotata O. G. COSTA, Atti Acad. Soc. Napoli, V. 91. 9. [*Sapro-*

myza] (1844).

fuscipennis MACQ., Suit. à Buff., II. 557. 8. (1835); MEIG., S. B., VII.

Gallia.

384; 83. (1838).

germinationis L. Fauna Suec., 1874. [*Musca*] (1761); SCHrank,

Europa.

Enum. Ins. Austr., 473. 961. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. Nat.,

I. 5. 2857. 122. [*Musca*] (1793); FABR., Ent. syst., IV. 356. 183.

[*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 278. 28. [*Dacus*] (1805); FALL.,

Dipt. Suec. Opomyz., 11. 1. (1820); MEIG., S. B., VI. 102. 1. (1830);

MACQ., Suit. à Buff., II. 555. 1. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 761. 1.

(1838) et Dipt. Scand., VI. 2415. 1. (1847); WALK., Ins. Brit., II.

234. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 284. (1864); Lw., Berlin. entom.

Zeitschr., 28. 1. (1865); ROND., Lonchein., 12. 2. (1874); BEZZI,

Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 20. 36. (1891); SINTENIS, Wien.

entom. Zeitg., XI. 180. (1892).

guttipennis ZETT., Ins. Lapp., 762. 4. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2419.

Sibiria,

4. (1847); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 64. 133. (1900).

Lapponia.

Henselli SINTENIS = **lineatopunctata** v. Ros.

Europa centr.

lineatopunctata v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 62. (1840).

et sept.

Henselli SINTENIS, Festschr. d. naturf. Ver. Riga, 3—6. (1895);

MÍK., Wien. entom. Zeitg., XII. 46. (1893); BECK., Jahresber.

d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 34. pag. 59.

(1902).

punctatonervosa Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 30. 3. (1865).

Nataliae EGG. = **florum** FABR.

Bavaria.

nigriceps MEIG., S. B., VII. 380. 28. (1838).

Rossia.

nigriventris Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 32. 5. (1865).

<i>novempunctata</i> GIMMERTH. = <i>florum</i> FABR.	
<i>punctatonervosa</i> Lw. = <i>lineatopunctata</i> v. Ros.	
<i>punctella</i> FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 11. 2. (1820); ZETT., Dipt. Suecia, Scand., VI. 2418. 3. (1847); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 32. 4. (1865); SINTENIS, Sitzgsber. d. Dorpat. naturf. Ges., 481. (1891) et Wien. entom. Zeitg., XI. 177—180. (1892).	Silesia.
<i>scutellata</i> ROB., Ann. Soc. entom. Fr., I. 3. 461. (1834).	Belgium.
<i>Thalhammeri</i> STROBL, Wiss. Mith. a. Bosn. u. d. Herzegov. Wien, VII. 87. (637). (1900).	Dalmatia.
<i>trinotata</i> COSTA = <i>florum</i> FABR.	

Balioptera

Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 347. (1864).

<i>adusta</i> Lw., Europ. Dipt., III. 303. 206. (1873).	Bavaria.
<i>angustipennis</i> ZETT., Dipt. Scand., VI. 2529. 2. [<i>Geomyza</i>] (1847).	Suecia.
<i>apicalis</i> MEIG., S. B., VI. 109. 19. [<i>Opomyza</i>] (1830); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 353. 3. (1864).	Europa centr. et sept.
? <i>maculata</i> AHRENS, Fauna Ins. Europ., III. 22. t. XXII. f. 3. [<i>Tephritis</i>] (1817).	
<i>terminalis</i> ZETT., Dipt. Scand., VI. 2533. 8. [<i>Geomyza</i>] (1847).	
<i>bimaculata</i> MEIG., S. B., VI. 108. 17. [<i>Opomyza</i>] (1830); SCHIN., F. A., II. 287. [<i>Geomyza</i>] (1864).	Austria.
<i>bracata</i> ROND., Lonchein., 11. 6. [<i>Geomyza</i>] (1874).	Italia.
<i>calceata</i> ROND., Lonchein., 11. 5. [<i>Geomyza</i>] (1874).	Italia.
<i>combinata</i> L., Syst. Nat., XII. 997. 114. [<i>Musca</i>] (1766); FABR., Syst. entom., 785. 65. (1775) et Spec. Ins., II. 451. 84. [<i>Musca</i>] (1781); GMEL., Syst. Nat., I. 5. 2855. 114. [<i>Musca</i>] (1793); FABR., Ent. syst., IV. 352. 163. [<i>Musca</i>] (1794) et Syst. Antl., 317. 2. [<i>Tephritis</i>] (1805); FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 2. 1. [<i>Geomyza</i>] (1823); MEIG., S. B., VI. 109. 18. t. LIX. f. 23. [<i>Opomyza</i>] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 558. 12. [<i>Opomyza</i>] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 773. 1. [<i>Geomyza</i>] (1838) et Dipt. Scand., VI. 2527. 1. [<i>Geomyza</i>] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 234. 3. [<i>Opomyza</i>] (1853); SCHIN., F. A., II. 287. [<i>Geomyza</i>] (1864); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 351. 1. (1864); ROND., Lonchein., 10. 2. [<i>Geomyza</i>] (1874).	Europa.
<i>consobrina</i> ZETT., Ins. Lapp., 762. 2. [<i>Opomyza</i>] (1838) et Dipt. Scand., VI. 2529. 3. [<i>Geomyza</i>] (1847).	
<i>germinationis</i> SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 961. [<i>Musca</i>] (1781).	
<i>combinata</i> var. c. ZETT. = <i>venusta</i> MEIG.	
<i>consobrina</i> ZETT. = <i>combinata</i> L.	
<i>costata</i> v. Ros. = <i>venusta</i> MEIG.	
<i>divergens</i> Lw., Europ. Dipt., III. 302. 205. (1873).	Bavaria.
<i>germinationis</i> SCHRANK = <i>combinata</i> L.	
<i>maculata</i> AHRENS = <i>apicalis</i> MEIG.	

- majuscula** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 356. 5. (1864). Europa mer.
pictipennis ROND., Lonchein., 10. 3. [*Geomyza*] (1874); BEZZI, Ditt. Italia.
 d. Calabria, 66. (28). (1895).
terminalis ZETT. = **apicalis** MEIG.
tremula HALID. = **venusta** MEIG.
tripunctata FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 2. 2. [*Geomyza*] (1823); Europa,
 MEIG., S. B., VI. 110. 21. [*Opomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff.,
 II. 558. 14. [*Opomyza*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 774. 2. (1838) et
 Dipt. Scand., VI. 2531. 5. [*Geomyza*] (1847); WALK., Ins. Brit.,
 II. 234. 4. [*Opomyza*] (1853); SCHIN., F. A., II. 287. [*Geomyza*]
 (1864); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 355. 4. (1864); ROND.,
 Lonchein., 11. 4. [*Geomyza*] (1874); STROBL, Wien. entom. Zeitschr.,
 XIX. 5. 299. (1900); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 64.
 134. (1900).
unipunctum ZETT., Dipt. Scand., 2533. 7. [*Geomyza*] (1847); CZERNY, Suecia.
 Wien. entom. Zeitg., XXII. 126. (1903).
venusta MEIG., S. B., VI. 110. 20. [*Opomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Europa.
 Buff., II. 558. 13. [*Opomyza*] (1835); SCHIN., F. A., II. 287. [*Geo-*
myza] (1864); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 352. 2. (1864);
 ROND., Lonchein., 10. 1. [*Geomyza*] (1874).
combinata var. c. ZETT., Dipt. Scand., VI. 2527. 1. [*Geomyza*]
 (1847).
costa'a v. Ros., Württemb. Corrbl., 62. [*Opomyza*] (1840); BECK.,
 Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 36. p.
 59. (1902).
tremula HALID., Entom. Mag., I. 177. [*Opomyza*] (1833).

Anthomyza

FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 7. (1823).

Anthophilina ZETT., Dipt. Scand., VII. (1848); ROND., Prodr.,
 VII., Agromyz., (1875).

Leptomyza p. p., MACQ., Suit. à Buff., II. (1835).

- albibimana** MEIG., S. B., VI. 107. 12. [*Opomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 557. 11. [*Opomyza*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 307. 12. (1902); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 251. 4. (1902). Europa centr. et sept.
armillaris ROND., Agromyz., 23. 4. [*Anthophilina*] (1875).
glabra MEIG., S. B., VII. 380. 13. [*Opomyza*] (1838); SCHIN., F. A., II. 286. [*Opomyza*] (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 308. 13. (1902); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 251. 4. (1902).
nigrimana MEIG., S. B., VII. 400. 90. [*Agromyza*] (1838).
armillaris ROND. = **albibimana** MEIG.
Bezzii CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 252. 9. (1902). Italia.
brevipennis ZETT. = **sabolusa** HALID.

- cingulata** HALID., Nat. hist. rev. II. Proceed., 64. t. II. f. 10. [*Geomyza*] (1855); CZEERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 253. 11. (1902). Hibernia.
- flavella** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2704. 11. [*Anthophilina*] (1848). Suecia.
- glabra** MEIG. = **albimana** MEIG.
- gracilis** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 8. 3.. (1823); MEIG., S. B., VI. 112. 25. [*Opomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 581. 3. [*Leptomyza*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 785. 1. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2693. [*Anthophilina*] (1848); PERRIS, Mém. Soc. sc. Agricolt. et Arts de Lille, (1853); GIRAUD, Verh. zool.-bot. Ver. Wien, XIII. 1251. (1863); Lw., Zeitschr. gesam. Naturw., XXIV. 394. 171. (1864); SCHIN., F. A., II. 282. [*Leptomyza*] (1864); KALTENB., Pflanzenf., 764. 35. (1872); ROND., Agromyz., 23. 6. [*Anthophilina*] (1875); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 386. (1877); BRAUER, Zweitl. d. K. Mus. Wien, 87. (1883); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 308. 25. (1902); CZEERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 251. 3. (1902). Europa centr. et sept.
- socculata* ZETT., Dipt. Scand., VI. 2534. 9. [*Geomyza*] (1847).
- laeta** MEIG., S. B., 111. 23. [*Opomyza*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2703. 10. [*Anthophilina*] (1848); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 308. 23. (1902); CZEERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 253. 10. (1902). Europa centr. et sept.
- nigrimana** MEIG. = **albimana** MEIG.
- pallida** ZETT., Ins. Lapp., 785. 4. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2702. 9. Europa. [*Anthophilina*] (1848); SCHIN., F. A., II. 281. (1864); ROND., Agromyz., 24. 7. [*Anthophilina*] (1875); CZEERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 251. 2. (1902).
- sabulosa** HALID., The Entom. Mag., IV. 151. [*Geomyza*] (1837); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXIV. 394. 172. (1864); CZEERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 251. 1. (1902). Europa centr. et sept.
- brevipennis* ZETT., Dipt. Scand., XI. 4335. 9. [*Geomyza*] (1852).
- saliens* Lw., Schrift. d. naturf. G. Danzig, 5. (1850).
- saliens** Lw. = **sabulosa** HALID.
- socculata** ZETT. = **gracilis** FALL.
- sordidella** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2695. 2. [*Anthophilina*] (1848); SCHIN., F. A., II. 282. [*Leptomyza*] (1864). Europa centr. et sept.
- unguicella** ZETT., Ins. Lapp., 753. 12. [*Supromyza*] (1838) et Dipt. Lapponia. Scand., VI. 2530. 4. [*Geomyza*] (1847); CZEERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 252. 6. (1902).
- ungulata** Lw., Europ. Dipt., III. 301. 204. (1873); CZEERNY, Wien. Rossia asia. Entom. Zeitg., XXI. 252. 5. (1902).

Paranthomyza

CZEERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 254. II. (1902).

flavipes ZETT., ROND. = **nitida** MEIG.

nitida MEIG., S. B., VII. 380. 27. [*Opomyza*] (1838); SCHIN., F. A., Europa. II. 288. [*Geomyza*] (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt.,

II. 308. 27. (1902); Czerny, Wien. entom. Zeitg., XXI. 254. (1902).
flavipes Zett., Dipt. Scand., VII. 2696. 3. [*Anthophilina*] (1848);
 Rond., Agromyz., 23. 5. [*Anthophilina*] (1875); Czerny, Wien.
 entom. Zeitg., XXI. 254. (1902).

Euthycheta

Lw., Berlin. entom. Zeitg., VIII. 365. 6. (1864).
spectabilis Lw., Berlin. entom. Zeitg., VIII. 365. 6. (1864). Silesia.

Anagnota

Beck., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 309. 30. (1902).
bicolor Meig., S. B., VII. 380. 30. [*Opomyza*] (1838); Zett., Dipt. Europa centr. Scand., VII. 2701. 8. [*Anthophilina*] (1848); Schin., F. A., II. 286. et sept. [*Opomyza*] (1864); Beck., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 309. 30. (1902); Czerny, Wien. entom. Zeitg., XXI. 255. (1902).

Chiromyia

Rob.-Desv., Myod., 621. (1830).

Lisella Rob.-Desv., Myod., 649. (1830).

Scyphella Rob.-Desv., Myod., 650. (1830).

Thyrimyza Zett., Dipt. Scand., VI. 2336. (1847).

bipunctella Zett. = *flava* L.

chrysopthalma Zett. = *oppidana* Scop.

femorella Fall., Zett. = *flava* L.

fenestrarum Rob.-Desv. = *flava* L.

flava L., Fauna Suec., 1869. [*Musca*] (1761); Geoffr., Hist. abreg. Ins., II. 537. 86. [*Musca*] (1762); Müller, Fauna Friedrichsd., 749. [*Musca*] (1764); L., Syst. nat. ed., XII. 2. 997. 115. [*Musca*] (1766); Deg., Ins., VI. 34. 13. [*Musca*] (1733); Müller, Zool. dan. Prodri., 2059. [*Musca*] (1776); Deg., Ins. ed. Goeze, VI. 18. 13. [*Musca*] (1780); Schrank, Enum. ins. Austr., 171. 957. [*Musca*] (1781); Fourcroy, Entom. Paris, II. 496. 8. [*Musca*] (1785); Villers, Entom. linn., III. 502. [*Musca*] (1789); Schrank, Fauna boica, III. 125. 2464. [*Musca*] (1803); Fall., Dipt. Suec. Ortal., 33. 13. [*Sapromyza*] (1820); Hagenb., Symb. faun. helv., I. 47. t. XV. f. 29. [*Sapromyza*] (1822); Meig., S. B., V. 260. 4. [*Sapromyza*] (1826); Rob.-Desv., Myod., 649. 1. [*Lisella*] (1830); Meig., S. B., VI. 177. 31. [*Agromyza*] (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 609. 18. [*Agromyza*] (1835); Zett., Ins. Lapp., 753. 11. [*Sapromyza*] (1838) et Dipt. Scand., VI. 2336. 27. [*Sapromyza*] (1847); Walk.,

Europa,
Africa sept.,
Amer. sept.

List Dipt. Brit. Mus., IV. 985. [*Sapromyza*] (1849); SCHIN., F. A., II. 283. [*Scyphella*] (1864); ROND., Bull. Soc. entom. ital., VI. 247. 2. [*Thyrimyza*] (1874); BEZZI, Riv. Ital. speleolog., I. 13. 13. [*Peletophila*] (1903); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., IV. 133. 5. [*Peletophila*] (1904); BEZZI, Atti Soc. Ital. di scienze nat., XLIII. 178. (1904).

bipunctella ZETT., Dipt. Scand., VI. 2341. 32. [*Sapromyza*] (1847).

femorella FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 34. 15. [*Sapromyza*] (1820);

ZETT., Dipt. Scand., VI. 2338. 28. [*Sapromyza*] (1847); BECK.,

Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., IV. 132. 2. [*Peletophila*] (1904).

fenestrarum ROB.-DESV., Myod., 621. 1. [*Chyromyia*] (1830).

flavicornis ROB.-DESV., Myod., 650. 1. [*Scyphella*] (1830).

? *luteola* SCOP., Entom. carn., 349. 943. [*Musca*] (1763); VILLERS,

Entom. linn., III. 523. 289. [*Musca*] (1789).

macrura ROND., Bull. Soc. entom. ital., VI. 247. 1. [*Thyrimyza*] (1874).

flava FABR., Rossi = *oppidana* SCOP.

flavicornis ROB.-DESV. = *flava* L.

latifrons Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 50. 64. [*Scyphella*] Hungaria, (1873). Ins. Canar.

lutea FALL., MEIG., ZETT., SCHIN., BECK. = *oppidana* SCOP.

luteola SCOP., VILLERS = *flava* L.

macrura ROND. = *flava* L.

minima BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., IV. 133. 6. [*Peletophila*] Livonia. (1904).

nigricornis ROB.-DESV. = *oppidana* SCOP.

oppidana SCOP., Entom. carn., 349. 944. [*Musca*] (1763); VILLERS, Europa.

Entom. linn., III. 523. 290. [*Musca*] (1789); ROND., Bull. Soc. entom. ital., VI. 247. 3. [*Thyrimyza*] (1874); BEZZI, Atti Soc. Ital. di Scienze nat., XLIII. 180. (1904).

chrysopthalma ZETT., Dipt. Scand., VI. 2343. 34. [*Sapromyza*] (1847) et XIV. 6366. 34. [*Sapromyza*] (1860).

flava FABR., Syst. entom., 786. 71. [*Musca*] (1775) et Spec. Ins.,

II. 452. 92. [*Musca*] (1781); ROSSI, Fauna etrusc., II. 316.

1535. [*Musca*] (1790); FABR., Entom. syst., IV. 355. 177.

[*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 317. 6. [*Tephritis*] (1805).

lutea FALL., Dipt. Suec. Ortal., 34. 14. [*Sapromyza*] (1820);

MEIG., S. B., V. 263. 11. [*Sapromyza*] (1826); ZETT., Dipt.

Scand., VI. 2342. 33. [*Sapromyza*] (1847); SCHIN., F. A., II.

283. [*Scyphella*] (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u.

Dipt., IV. 131. 1. [*Peletophila*] (1904).

nigricornis ROB.-DESV., Myod., 650. 2. [*Scyphella*] (1830).

puncticornis HAGENB., Symb. faun. helv., I. 48. t. XV. f. 30. [*Sapromyza*] (1822).

puncticornis HAGENB. = *oppidana* SCOP.

quadrinotata BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., IV. 132. 4. Ins. Canariae. [*Peletophila*] (1904).

Tethina

HALID., Ann. nat. Hist., II. 188. (1839).

illota CURTIS, Brit. Ins., 1338. 27. App., 281. [*Opomyza*] (1829); Europa centr.
HALID., Ann. nat. Hist., II. 188. (1839).

Leptopezina*)

MACQ., Suit. à Buff., II. 554. (1835).

gracilipes MEIG., S. B., VI. 100. 16. [*Diastata*] (1830); MACQ., Suit. Germania.
à Buff., II. 554. (1835); vide: **Diastata gracilipes**. MEIG.

Ochthiphilinae.

Ochthiphila

FALL., Dipt. Suec. Ochthid., 9. (1823).

? **Chamaemyia** PANZ., Fauna Germ., CV. 12. (1806).

Estelia ROB.-DESV., Myod., 635. 1. (1830).

albiceps MEIG., S. B., VI. 94. 7. (1830).

Germania.

aridella FALL., Dipt. Suec. Ochthid., 10. 2. (1823); MEIG., S. B., VI.

Europa centr.

92. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 545. 1. (1835); ZETT., Ins.

et sept.

Lapp., 620. 4. (1835) et Dipt. Scand., V. 1950. 6. (1846); WALK.,

Ins. Brit., II. 192. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 293. (1864); ROND.,

Lonchein., 18. 5. (1874).

cinerea ROB.-DESV., Myod., 635. 1. [*Estelia*] (1830).

Gallia.

coronata Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 221. 2. (1858); STROBL,

Europa centr.

Wien. entom. Zeitg., XIX. 9. 305. (1900).

et mer.

elegans PANZ., Fauna Germ., CV. 12. [*Chamaemyia*] (1806); MEIG.,

Europa centr.

S. B., VI. 93. 5. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 546. 4. (1835);

et sept.

ZETT., Dipt. Scand., V. 1949. 5. (1846); SCHIN., F. A., II. 292.

(1864).

fasciata Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 222. 3. (1858).

Germania.

flavipalpis HALID., CURTIS = **maritima** ZETT.

flavipes MACQ., Suit. à Buff., II. 546. 6. (1835); MEIG., S. B., VII. 378.

Gallia.

9. (1838).

frontella ROND., Lonchein., 18. 3. (1874).

Italia.

geniculata ZETT., Ins. Lapp., 720. 3. (1838) et Dipt. Scand., V. 1949.

Europa.

4. (1846); SCHIN., F. A., II. 293. (1864); STROBL, Wien. entom.

Zeitg., XIX. 9. 308. (1900).

geniculata HALID., Curtis Brit. Ins., 1336. 5. App. 281. (1829) et Ann.

Britannia.

nat. Hist., II. 188. (1839); WALK., Ins. Brit., II. 192. (1853).

herbarum ROB.-DESV. = **juncorum** FALL.

*) genus dubium.

- impunctata** ROB.-DESV., Myod., 636. 3. [*Estelia*] (1830). **Gallia.**
inconstans BECK., Mittb. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 187. 326. (1903). **Aegyptus.**
juncorum FALL., Dipt. Suec. Ochthid., 9. 1. (1823); MEIG., S. B., VI. **Europa.**
92. 3. t. LIX. f. 11. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 545. 2. (1835);
ZETT., Ins. Lapp., 719. 1. (1838) et Dipt. Scand., V. 1945. 1. (1846);
WALK., Ins. Brit., II. 192. 2. (1853); SCHIN., F. A., II. 293. (1864);
ROND., Lonchein., 18. 4. (1874).
herbarum ROB.-DESV., Myod., 635. 2. [*Estelia*] (1830).
juncorum var. b. FALL. = **maritima** ZETT.
maritima ZETT., Dipt. Scand., V. 1946. 2. (1846); SCHIN., F. A., II. **Europa.**
293. (1864); ROND., Lonchein., 17. 1. (1874); STROBL., Wien. entom. Zeitg., XIX. 9. 306. (1900).
flavipalpis HALID., Curtis Brit. Ins., 1336. 6. App. 281. (1829);
HALID., Ann. of nat. Hist., II. 187. (1839).
juncorum var. b. FALL., Dipt. Suec. Ochthid., 9. 1. (1823).
nigripes MACQ., Suit. à Buff., II. 546. 7. (1835); MEIG., S. B., VII. 378. **Gallia.**
8. (1838).
obscuripes ROND., Lonchein., 19. 6. (1874); BEZZI, Contrib. alla F. Italia.
ditt. di Pavia, 33. 111. (1891).
pallipes BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., 154. (1880). **Cauc., Persia.**
polystigma MEIG., S. B., VI. 92. 4. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II.
546. 3. (1835); ZETT., Ins. Brit., V. 1948. 3. (1846); GIRARD, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 1289. t. XXII, f. 2. (1863); SCHIN., F. A., II. 293. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 742. 41. (1872); ROND., Lonchein., 18. 2. (1874).
pulchra v. Ros., Württemb. Corrbl., 62. (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 32. p. 59. (1902). **Germania.**
spectabilis Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 220. 1. (1858). **Germania, Austria.**

Leucopis

MEIG., S. B., VI. 133. 217. (1830).

- alpipennis** MEIG., S. B., VI. 135. 4. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. **Europa centr.**
582. 2. (1835); BREMI, Isis, (1846); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2713. **et sept.**
4. (1848); SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, I—III. 9. (1855).
griseola ZETT., Ins. Lapp., 786. 1. (1838).
nudiceps ZETT., Ins. Lapp., 789. 9. [*Agromyzta*] (1838).
albipuncta ZETT., Dipt. Scand., XII. 4810. 3—4. (1855). **Suecia.**
annulipes ZETT., Dipt. Scand., VII. 2712. 2. (1848); BOHEM., Öfvers. af Kgl. vetensk. Akad. Förh., IX. 195. (1848); GOUREAU, Ann. Soc. entom., France, III. (1863); SCHIN., F. A., II. 295. (1864); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 92. (1883). **Europa centr.**
grisea BOUCHE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 144. 11. (1847). **et sept.**
griseola MEIG., S. B., VI. 134. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 582: 1. (1835).
aphidiperda ROND., Lonchein., 22. 3. (1874). **Italia.**
aphidivora ROND., Lonchein., 21. 2. (1874). **Italia.**

argentata HEEGER, Isis, 998. t. IX. f. 1—16. (1848); SCHIN., F. A., II.	Germania,
295. (1864); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 187. 328. (1903).	Aegyptus.
argenticollis ZETT., Dipt. Scand., VII. 2714. 5. (1848) et XII. 4811. (1855).	Suecia.
armillata ROND., Lonchein., 24. 10. (1874).	Italia.
Ballestrerii ROND., Lonchein., 25. 12. (1874).	Italia.
bursaria ROND., Lonchein., 24. 9. (1874).	Italia.
cinerella ZETT., Dipt. Scand., VII. 2715. 6. (1848).	Suecia.
geniculata ZETT., Dipt. Scand., XII. 4810. 1—2. (1855).	Suecia.
grisea BOUCHÉ = annulipes ZETT.	
griseola FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 8. 4. [<i>Anthomyza</i>] (1823); ZETT., Ins. Lapp., 786. 1. (1838); RATZEB., Forstins., III. 170. 5. (1844). BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 144. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2710. 1. (1848); SCHIN., F. A., II. 294. (1864); FR. LÖW, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 949. (1866); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 348. (1870); ROND., Lonchein., 23. 6. (1874); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 92. (1883); STROBL., Wien. entom. Zeitg., XIX. 9. 309. (1900); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 187. 327. (1903).	Europa, Aegyptus.
punctella ZETT., Ins. Lapp., 789. 8. (1838).	
griseola MEIG., MACQ. = annulipes ZETT.	
griseola p. p. ZETT. = albipennis MEIG.	
griseola HARTIG, BRAUER = obscura HALID.	
hirta WALK., List of Dipt., IV. 1116. (1849).	Suecia sept.
hyalipennis ZETT., Dipt. Scand., VII. 2715. (1848).	Suecia
impunctata v. Ros., Württemb. Corrb., 62. (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemb., No. 36. p. 59. (1902).	Germania.
lusoria MEIG., S. B., VI. 135. 3. (1830); ROND., Lonchein., 22. 5. (1874); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 314. 3. (1902).	Germania, Italia.
magnicornis LW., Thiere Andalus. Rosenh.. 386. (1856).	Hispania.
minuscula ROND., Lonchein., 23. 7. (1874).	Italia.
misaphida ROND., Loncheia., 25. 13. (1874).	Italia.
nigricornis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 782. (1862); SCHIN., F. A., II. 295. (1864).	Austria.
nudiceps ZETT. = albipennis MEIG.	
obscura HALID., Entom. Mag., I. 173. (1833); HARDY, Scotl. Natural., I. 256. Record. 388. (1872); ROND., Lonchein., 21. 1. (1874).	Hibernia.
griseola HARTIG, Jahrb. f. Forstkunde, II. (1838); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 92. (1883).	
palliditarsis ROND., Lonchein., 24. 8. (1874); STROBL., Wiss. Mitth. a. Bosn. u. d. Herzegov. Wien, VII. 89. (639). (1900).	Italia, Bosnia.
Palumbii ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Lonchein., 25. 11. (1874); STROBL., Wiss. Mitth. a. Bosnien u. d. Herzegov. Wien, VII. 89. (639). (1900).	Sicilia, Bosnia.
punctella ZETT. = griseola FALL.	
punticornis MEIG., S. B., VI. 134. 2. (1830); BOUCHÉ, Stettin. entom.	Europa c. et s.

Zeitg., VIII. 143. 10. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2712. 3. (1848); SCHIN., F. A., II. 294. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 540. 96. (1872); DEWIRZ, Sitzgsber. d. Ges. d. Freunde d. Naturf. Berlin, 7. 103. (1881); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 92. (1883); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 314. 2. (1902).

silesiaca Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 782. (1862); SCHIN., Silesia. F. A., II. 295. (1864); FR. WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 277. 18. (1882).

talaria ROND., Lonchein., 22. 4. (1874). Italia.

tibialis ZETT., Observat. entom. (1834) et Dipt. Scand., VII. 2716. Suecia. (:848).

Acrometopia

SCHIN., Wien. entom. Monatschr., VI. 434. (1862).

Oxyrhina p. p. ZETT. (*nec* MEIG.), Dipt. Scand., V. 1953. 143. (1846).

Wahlbergi ZETT., Dipt. Scand., V. 1954. 1. [*Oxyrhina*] (1846); SCHIN., Europa centr. F. A., II. 291. (1864); TIEF, Jahrb. d. naturh. Mus., XVIII. Klagenf. 10. et sept.

Sephanilla

ROND., Bull. Soc. entom. Ital., VI. 25. X. (1874).

sertulata ROND., Bull. Soc. entom. Ital., VI. 26. (1874). Italia.

Milichinae.

Milichia

MEIG., S. B., VI. 131. (1830).

Argyrites p. p. LATR. (1829).

Lobioptera WAHLB., Kgl. Vetensk. Akad. Förh., 259. (1847).

albomaculata STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 9. 310. [*Lobioptera*] Hispania. (1900).

decora Lw., Zeitschr. ges. Naturw., 9. [*Lobioptera*] (1870); ROND., Corsica. Agromyz., 4. 2. (1875).

ludens WAHLB., K. Vetensk. Akad. Förh., 259—61. No. 9. t. VII. f. Europa centr. 1. [*Lobioptera*] (1847); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2727. 1. [*Lobi-* et sept., *optera*] (1848); SCHIN., F. A., II. 297. [*Lobioptera*] (1864); RADD., Aegyptus. Archiv f. Freunde d. Naturg., XXVII. 102. [*Lobioptera*] (1873); BECK., Mith. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 187. 329. [*Lobioptera*] (1903).

margaritata MIK = **marginata** MIK.

marginata MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 796. [*Lobioptera*] Austria. (1864).

- margaritata* MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. t. XXI. f. 5. [*Lobioptera*] (1864).
- palposa* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2722. 4. (1848); ROND., Agromyz., Suecia, Italia. 4. [*Lobioptera*] (1875).
- speciosa* MEIG., S. B., VI. 132. t. LX. f. 23, 24. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 583. 1. [*Lobioptera*] (1835); SCHIN., F. A., II. 297. [*Lobioptera*] (1864); Lw., Zeitschr. ges. Naturw., 9—14. [*Lobioptera*] (1870); ROND., Agromyz., 4. 1. (1875); HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XXII. 250. (1903). Europa centr. et mer.

Stenoporomyia

HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XXII. 250. (1903).

- Tiefi* MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 178. 3. [*Lobioptera*] Carinthia. (1887) et Wien. entom. Zeitg., VI. 238. [*Lobioptera*] (1887); HENDEL, Wien. entom. Zeitschr., XXII. 250. (1903).

Phyllomyza

FALL., Dipt. Suec. Ochthid., 8. 1. (1823).

flavitarsis MEIG., MACQ., SCHIN., GERCKE = *securicornis* FALL.

morosa MEIG., MACQ. = *securicornis* FALL.

securicornis FALL., Dipt. Suec. Ochthid., 8. 1. (1823); MEIG., S. B., VI. 171. 13. t. LXI. f. 27. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 614. 1. (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 1956. 1. (1846); SCHIN., F. A., II. 312. (1864); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 61. 313. (1900).

flavitarsis MEIG., S. B., VI. 107. 13. [*Opomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 614. 2. (1835); SCHIN., F. A., II. 312. (1864); GERCKE, Wien. entom. Zeitg., VIII. 226. 7. t. II. f. 11. (1889); *morosa* MEIG., S. B., VI. 170. 8. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 607. 9. [*Agromyza*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 338. 8. (1902).

Desmometopa

Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 185. VI. Centuria (1865).

annulimanum v. Ros. = *annulitarse* v. Ros.

annulitarse v. Ros., Würtemb. Corrbl., 63. [*Agromyza*] (1840). Germania.

annulimanum v. Ros., Würtemb. Corrbl., 63. [*Agromyza*] (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Würtemb., No. 56, 57. p. 64, 65. (1902).

annulitarse ZETT. = *latipes* MEIG.

flavipes MEIG., S. B., VI. 108. 15. [*Opomyza*] (1830); BECK., Zeitschr. Germania. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 307. 15. (1902).

- griseolum** WULP, Tijdschr. v. Entom., XIV. 198. (13). (1871). Hollandia.
- latipes** MEIG., S. B., VI. 177. 34. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Europa.
- Buff., II. 609. 20. [*Agromyza*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2746. 12. [*Agromyza*] (1848); WALK., Ins. Brit., II. 242. 2. [*Agromyza*] (1853); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6452. 12. [*Agromyza*] (1860); SCHIN., F. A., II. 308. [*Agromyza*] (1864); WULP, Tijdschr. v. Entom., XIV. t. VIII. f. 2—7. p. 195. (10). [*Madiza*] (1871); GERCKE, Wien. entom. Zeitg., VIII. 222. 2. t. II. f. 5. (1887); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 61. 312. (1900).
- annulitarse ZETT., Dipt. Scand., VII. 2674. 5. [*Madiza*] (1848).
- M. atrum** MEIG., S. B., VI. 170. 6. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 607. 7. [*Agromyza*] (1835); SCHIN., F. A., II. 304. [*Agromyza*] (1864); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 277. 15. (1882); MIK, Wien. entom. Zeitg., XVII. 146. (1898). Europa centr.
- M. nigrum** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2743. 10. [*Agromyza*] (1848); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 61. 311. (1900). Europa.
- niloticum** BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 188. 330. (1903). Aegyptus.
- sordidum** FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 10. 5. [*Madiza*] (1820); MEIG., S. B., VI. 173. 19. [*Agromyza*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2784. 46. (1848) et XIV. 6462. 46. [*Agromyza*] (1860); SCHIN., F. A., II. 305. [*Agromyza*] (1864); WULP, Tijdschr. v. Entom., XIV. 197. (12). [*Madiza*] (1871). Europa centr. et sept.

Meoneura

ROND., Prodr., I. 128. (1856).

Psalidotus BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 192. (1903).

lonicerae KALTENB. = *obscurella* FALL.

obscurella FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 6. 9. (1823); MEIG., S. B., VI. 184. 55. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 612. 36. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2770. 32. (1848); ROND., Prodr., I. 128. (1856); SCHIN., F. A., II. 300. (1864); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 91. (1883).

lonicerae KALTENB., Pflanzenf., 306. 60. (1872); SCHRODER, Muscidae.

Illustr. Zeitschr. f. Entom., 3. 3. (1898).

primus BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 192. 344. t.

IVe f. 89, 90, 91. (1903).

primus BECK. = *obscurella* FALL.

Madiza

FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 8. (1820).

glabra FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 9. 3. (1820); MEIG., S. B., VI. 137. 4. [*Gymnopapa*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 584. 4. [*Gymnopapa*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 782. 2. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2873. 4. (1848); SCHIN., F. A., II. 188. (1864). Europa centr. et sept.

- griseola** WULP, Tijdschr. v. Entom., XIV. 198. (1871). Hollandia.
rufitarsis MEIG., S. B., VII. 384. 5. [*Gymnopa*] (1838); SCHIN., F. A., Germania.
 II. 188. (1864).
sordida WEYENBERGH, Tijdschr. v. Entom., XVII. 157. (1873—74); Hollandia.
 BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 84. (1883).

Agromyzinae.

Odinia

ROB.-DESV., Myod., 648. 1. (1830).

Alticomerus ROND., Prodr., I. 121. (1856).

Milichia MEIG., p. p., S. B., VI. 131. (1830).

boletina ZETT., Dipt. Scand., VII. 2721. 3. [*Milichia*] (1848); SCHIN., Europa.

F. A., II. 298. [*Milichia*] (1864); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 32. 110. [*Milichia*] (1891).

maculata MEIG., S. B., VI. 132. 2. [*Milichia*] (1830); MACQ., Suit. à Europa.

BUFF., II. 582. 2. [*Milichia*] (1835); SUFFEIAN, Stettin. entom. Zeitg., II. 26. 9. [*Milichia*] (1841); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 324.

1. [*Milichia*] (1843); SCHIN., F. A., II. 298. [*Milichia*] (1864); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 92. [*Milichia*] (1883).

ornata ZETT., Ins. Lapp., 787. 1. [*Milichia*] (1838) et Dipt. Scand., VII. 2718. 1. [*Milichia*] (1848).

trinotata ROB.-DESV., Myod., 648. 1. (1830); ROND., Agromyz., 5. [*Milichia*] (1875).

ornata ZETT. = **maculata** MEIG.

Peleterii ROB.-DESV., Myod., 649. 2. (1830).

Gallia.

puilchra ZETT., Dipt. Scand., VII. 2724. (1848).

Suecia.

tamaricis BIGOT, Dipt. recueillis en Tunesie, 10. (1884).

Tunisia.

tarsata ZETT., Dipt. Scand., VII. 2723. 5. (1848).

Suecia.

trinotata ROB.-DESV., ROND. = **maculata** MEIG.

Neoalticomerus

HENDEL, Wied. entom. Zeitg., XXII. 252. (1903).

formosa Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 328. 2. [*Milichia*] (1843); Europa centr. ZETT., Dipt. Scand., VII. 2720. 2. [*Milichia*] (1848); SCHIN., F. A., et sept. II. 298. [*Milichia*] (1864).

litorella var. b. FALL., Dipt. Suec. Oehthid., 10. 3. [*Ochthiphila*] (1823).

litorella var. b. FALL. = **formosa** Lw.

Cacoxenus

Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 217. (1858).

indagator Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 218. (1858); **GIRAUD**, Europa centr. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 488. (1861); **SCHIN.**, F. A., II. 299. (1864); **RADD.**, Archiv d. Ver. f. Naturk. Mecklenb., (1873); **BRAUER**, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 92. (1883); **Ost.-SACK.**, Berlin. entom. Zeitg., XXXVI. 411. (1891); **MIK**, Wien. entom. Zeitg., XI. 182. 7. (1892) et XIII. 182. (1894).

Agromyza

FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 3. (1823).

abbreviata MEIG., S. B., VI. 176. 30. (1830).	Suecia.
abiens ZETT., Dipt. Scand., VII. 2747. 13. (1848); SCHIN., F. A., II. 301. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 17. 12. (1875); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 263. 268. (1881).	Europa.
reptans var. <i>b.</i> FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 4. (1823).	
aenea MEIG., Macq. = aeneiventris FALL.	
aeneiventris FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 4. 2. (1823); NYLANDER,	Europa.
Notitia pro Fauna et Flora Fenn., (1847); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2777. 39. (1848); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, I—III. 16. (1855); SCHIN., F. A., II. 304, (1864); ROND., Ann. Soc. entom. Fr., II. 3. XLVII. et Agromyz., 14. 1. (1875).	
aenea MEIG., S. B., VI. 169. 4. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 607. 5. (1835); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., XXXVII., CXIII. CXIV. (1868) et XLV. 240. (1876); KALTENB., Pflanzenf., 279. 11; 321. 13; 365. 37. (1872).	
aenescens ZETT., Dipt. Scand., XII. 4814. 8—9. (1855).	Suecia.
albicornis MEIG., S. B., VII. 401. 95. (1838); SCHIN., F. A., II. 307. (1864).	Bavaria.
albipennis MEIG., S. B., VI. 171. 12. (1830); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4813. 8—9. (1855).	Germania.
albitarsis MEIG., S. B., VI. 171. 11. (1830).	Suecia.
albitarsis ZETT., Dipt. Scand., VII. 2735. 2. (1848).	Germania.
albo-hyalinata ZETT., Dipt. Scand., VII. 2742. 9. (1848).	Suecia.
alpicola STROBL, Dipt. v. Steyerm., IV. 272. (1898).	Styria.
ambigua FALL. (var. <i>d. reptans</i>), ZETT. = nigripes MEIG.	
amoena MEIG., S. B., VI. 187. 68. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 613. 41. (1835); BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 142. 1. (1847); SCHIN., F. A., II. 306. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 298. 15. (1872).	Europa centr.
analis ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 18. 15. (1875).	Italia.
annulipes MEIG., S. B., VI. 185. 61. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 612. 38. (1835).	Germania.
anthracina MEIG., S. B., VI. 173. 20. (1830); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 246. (1881).	Germania.
arctica LUNDB., Vidensk. Medd., 304. 148. (1900).	Groenlandia.

<i>artemisiae</i>	KALTENB., Pflanzenf., 358. 77. (1872).	Germania.
<i>atra</i>	MEIG., S. B., VI. 178. 37. (1830); FRELD., Zool. Misc. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 163. (1868); KALTENB., Pflanzenf., 717. 15. (1872) et Verh. d. nat. Ver. d. Pr. Rheinl., XIX. 61. (1862); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig, V. 285. (1881); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 92. (1883).	Germania. Gallia.
<i>graminis</i>	KALTENB., Pflanzenf., 730. 42. - 748. 9. — 750. 10. (1872).	
<i>nigra</i>	MACQ., Suit. à Buff., II. 610. 24. (1835).	
<i>atratula</i>	RATZEB., Forstins., III. 170. 6. [<i>Leucopis</i>] (1844); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., VIII. 58. 2. (1889).	Germania.
<i>atricornis</i>	MEIG., S. B., VII. 399. 84. (1838).	Belgium.
<i>stripes</i>	ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6461. 34—35. (1860); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 62. 318. (1900).	Suecia, Hispania.
<i>basilaris</i>	BRISCHKE Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 259. (1881).	Germania.
<i>bicolor</i>	MEIG., S. B., VII. 401. 94. (1838); SCHIN., F. A., II. 307. (1864).	Bavaria.
<i>bellidis</i>	KALTENB., Pflanzenf., 336. 1. (1872).	Germania.
<i>bicolor</i>	MEIG., S. B., VII. 399. 83. (1838).	Belgium.
<i>bicornis</i>	KALTENB., Mik. = <i>curvipalpis</i> ZETT.	
<i>bimaculata</i>	MEIG., S. B., VI. 172. 15. (1830).	Germania.
<i>blanda</i>	MEIG., S. B., VI. 187. 69. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 613. 42. (1835).	Germania.
<i>breviseta</i>	ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6451. 9—10. (1860).	Suecia.
<i>bryoniae</i>	KALTENB., Pflanzenf., 255. 6. (1872).	Germania.
<i>calceata</i>	MEIG., S. B., VII. 398. 78. (1838).	Belgium.
<i>capitata</i>	ZETT., SCHIN. = <i>geniculata</i> MEIG.	
<i>carbonaria</i>	ZETT., Dipt. Scand., VII. 2739. 6. (1848); SCHIN., F. A., II. 303. (1864); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 249. 251. (1881); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 135. (1893) et XIX. 63. 323. (1900).	Europa centr. et mer.
<i>nigra</i>	ZETT., Ins. Lapp., 788. 5. (1838).	
<i>carbonella</i>	ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6455. 22—23. (1860).	Suecia.
<i>cicerina</i>	ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 19. 18. (1875).	Italia.
<i>cinerascens</i>	MACQ., Suit. à Buff., II. 610. 25. (1835); MEIG., S. B., VII. 400. 88. (1838).	Gallia.
<i>cingulata</i>	ZETT., Dipt. Scand., VII. 2754. 18. (1848).	Suecia.
<i>cirsii</i>	ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 15. 2. (1875).	Europa centr.
<i>pulicaria</i>	ZETT., Dipt. Scand., VII. 2778. 40. (1848); SCHIN., F. A., II. 304. (1864).	et mer.
<i>confinis</i>	MEIG., S. B., VI. 176. 28. (1830); SCHIN., F. A., II. 311. [<i>Ceratomyza</i>] (1864); KALTENB., Pflanzenf., 710. 2. (1872); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 340. 28. (1902).	Germania.
<i>congesta</i>	BECK., Mith. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 190. 339. (1903).	Aegyptus.
<i>coxata</i>	ZETT., Dipt. Scand., VII. 2737. 4. (1848).	Suecia.
<i>crassisetata</i>	STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 63. 325. d. (1900).	Hispania.
<i>cunctans</i>	MEIG., S. B., VI. 178. 36. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II.	Europa et. ctm.

610. 23. (1835); SCHIN., F. A., II. 304. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 778. 23. (1872); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 64. 327. (1900); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 190. 335. (1903).
- curvipalpis** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2782. 44. (1848); SCHIN., F. A., II. 305. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. VII. Agromyz., 16. 6. (1875); MIK, Wien. entom. Zeitg., V. 101. 1. (1886) et Fauna v. Hernst., 532. f. 11. (1886).
- bicornis* KALTENB., Pflanzenf., 330. 33. (1872); MIK, Wien. entom. Zeitg., V. 276. 7. (1886).
- discrepans** WULP., Tijdschr. v. Entom., XIV. 206. (1871). Hollandia.
- dorsata** SIEBKE, Nyt. Mag. f. Naturv., 169. (1864) et Enum. Ins. Norv., 179. 8. (1877). Scandinavia.
- echii** KALTENB., Pflanzenf., 449. 20. — 445. 3. — 451. 6. (1872). Germania.
- elegantula** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2749. 14. (1848). Suecia.
- elongula** ZETT., Ins. Lapp., 790. 15. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2780. 42. (1848). Lapponia.
- errans** MEIG., S. B., VI. 178. 35. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 609. 21. (1835); SCHIN., F. A., II. 303. (1864). Germania.
- cupatorii** KALTENB. = *fasciola* MEIG.
- exigua** MEIG., S. B., VI. 184. 58. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2773. 35. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 243. 6. (1853); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 62. 319. (1900). Europa.
- exilis** MEIG., S. B., VI. 186. 64. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 612. 39. (1835). Germania.
- fasciata** STROBL = *grossicornis* ZETT.
- fasciola** MEIG., S. B., VII. 402. 98. (1838); SCHIN., F. A., II. 307. (1864); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 258. (1881).
- cupatorii* KALTENB., Pflanzenf., 330. 12. (1872).
- ferruginea** WULP., Tijdschr. v. Entom., XIV. 205. t. 8. f. 10. (1871). Hollandia.
- flaveola** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 6. 11. (1823); MEIG., S. B., VI. 180. 44. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 611. 30. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2764. 27. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 243. 4. (1853). Europa centr. et sept.
- flaveola** var. **FALL.** = **scutellata** FALL.
- flaviceps** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 6. 12. (1823); MEIG., S. B., VI. 185. 59. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2762. 25. (1848). Europa centr. et sept.
- flavicornis** ZETT., Dipt. Scand., XII. 4812. 2—3. (1855). Suecia.
- flavifrons** MEIG., S. B., VI. 184. 57. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 612. 37. (1835); SCHIN., F. A., II. 302. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 54. 26 et 57. 9. (1872) et Verh. nat. Ver. d. Preuss. Rheinl., XIX. 101. (1862). Germania.
- flavimana** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6458. 27—28. (1860). Suecia.
- flaviventris** STROBL = *grossicornis* ZETT.
- flavocincta** STROBL = *grossicornis* ZETT.
- flavogeniculata** v. Ros., Württemb. Corrbl., 63. (1840). Germania.
- flavonotata** HALID., Entom. Mag., I. 173. (1833). Britannia.
- flavo-scutellaris** ZETT., Ins. Lapp., 790. 13. (1838). Suecia.

- scutellata* var. FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 7. 13. (1823).
- frontalis** MEIG., S. B., VI. 175. 24. (1830); KALTENB., Pflanzenf., 533. Germania.
12. (1872); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 277. (1881).
- fronticornis** ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 19. 16. (1875). Italia.
- fulvella** ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 18. 14. (1875). Italia.
- fuscinipes** MACQ., Suit. à Buff., II. 606. 3. (1835); MEIG., S. B., VII. 396. Gallia.
70. (1838).
- fuscolimbata** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 62. 317. (1900). Hispania.
- gei** BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 250. (1881). Germania.
- geniculata** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 6. 10. (1823); MEIG., S. B., VI. 181. 45. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 611. 31. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2761. 24. (1848); SCHIN., F. A., II. 302. (1864); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 244. (1881); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 62. 319. (1900).
- capitata** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2750. 15. (1848).
- graminis** KALTENB. = **atra** MEIG.
- grossicornis** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6456. 22—24. (1860); STROBL, Europa.
Wien. entom. Zeitg., 63. 325. (1900).
- fasciata** STROBL, Progr. Seitenst., 38. [*Phylloomyza*] (1880).
- flaviventris** STROBL, Dipt. v. Steyerm., IV. 271. (1898).
- flavocincta** STROBL, Progr. Seitenst., 37. [*Phylloomyza*] (1880).
- gyrans** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 4. 3. (1823); MEIG., S. B., VI. 182. 48. t. LXI. f. 35. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 611. 33. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 789. 11. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2766. 28. (1848); SCHIN., F. A., II. 303. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 16. 8. (1875); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 63. 324. (1900).
- haemorrhoidalis** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2753. 17. (1848). Suecia.
- heraclei** BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 143. 9. (1847); KALTENB., Pflanzenf., 284. 14. (1872).
- hieracii** KALTENB., Pflanzenf., 403. 40. (1872). Germania.
- hilarella** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2776. 38. (1848). Suecia.
- holosericea** BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 143. 8. (1847); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, I—III. 11. (1855); KALTENB., Pflanzenf., 461. 47. (1872). Germania.
- humeralis** v. ROS., Württemb. Corbl., 63. (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 59. p. 65. (1902). Germania.
- hyalipennis** MEIG., S. B., VII. 397. 73. (1838); SCHIN., F. A., II. 306. (1864). Germania.
- imbuta** MEIG., S. B., VII. 400. 86. (1838); SCHIN., F. A., II. 307. (1864). Germania.
- impatientis** BRAISCKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 245. (1881). Germania.
- incisa** MEIG., S. B., VI. 182. 50. (1830); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 16. 9. (1875). Italia, Germania.
- infuscata** MEIG., S. B., VI. 184. 56. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2771. 33. (1848); SCHIN., F. A., II. 300. (1864). Europa centr. et sept.
- lacertella** ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 20. 21. (1875). Italia.
- lacteipennis** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 4. 4. (1823); MEIG., S. B.,

- VI. 183. 53. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 612. 35. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 789. 12. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2768. 30. (1848); SCHIN., F. A., II. 300. (1864); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 61. 314. (1900) et Wiss. Mitt. a. Bosn. u. d. Herzegov. Wien, VII. 8. 9. (639). (1900).
- lamii* KALTENB., Pflanzenf., 488. 12. (1872). Germania.
- laminata* BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 285. (1881). Germania.
- lappae* Lw., Stettin. entom. Zeitg., XI. 380. (1850); KALTENB., Pflanzenf., 370. 29. (1872). Germania.
- lateralis* MACQ., Suit. à Buff., II. 609. 17. (1835); MEIG., S. B., VII. 399. 81. (1838); BOUCHE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 143. 4. (1847); SCHIN., F. A., II. 307. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 445. 14. (1872); LINDEM., Bull. Soc. Imp. de Nat. de Moscou, No. 3. (1886). Europa centr.
- laterella* ZETT., Ins. Lapp., 788. 7. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2744. Suecia.
11. (1848).
- lateritia* ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 17. 13. (1875). Italia.
- leucocephala* MEIG., S. B., VI. 174. 22. (1830); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 19. 17. (1875). Italia,
- Germania.*
- limbatella* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2755. 19. (1848). Suecia.
- lineella* ZETT., Ins. Lapp., 790. 16. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2752. Suecia.
16. (1848).
- luctuosa* MEIG., S. B., VI. 182. 49. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 612. 34. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2759. 22. (1848); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 16. 7. (1875); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 134. (1893). Europa centr. et mer.
- lutea* MEIG., S. B., VI. 177. 32. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 609. 19. (1835); SCHIN., F. A., II. 301. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 83. 9. (1872) et Verh. naturf. Ver. d. Preuss. Rheinl., XIX. 21. (1862); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 91. (1883); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 61. 316. (1900). Europa centr. et mer.
- Macquarti* GOURBAU, Ann. Soc. entom. Fr., II. 9. p. 133. t. V. No. 1. Gallia.
- f. 1—10. (1851).
- maura* MEIG., S. B., VII. 399. 85. (1838); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2781. 43. (1848); SCHIN., F. A., II. 305. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 15. 5. (1875); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 260. 273. (1881); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 64. 330. (1900). Europa.
- pulicaria* ZETT., Ins. Lapp., 788. 6. (1838).
- reptans* var. d. FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 3. 1. (1823).
- Miki* STROBL, Dipt. v. Steyerl., IV. 272. (1898). Styria.
- minuta* MEIG., S. B., VII. 401. 93. (1838); SCHIN., F. A., II. 307. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 201. 158. (1872). Germania.
- minutissima* ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6459. 33—34. (1860). Suecia.
- mobilis* ROND. (*nec* MEIG.), Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 17. 10. (1875); BOUCHE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 143. (1847); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 277. 281. (1881). Europa centr. et mer.

- morio** BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 258. (1881). Germania.
- morionella** ZETT., Dipt. Scand., VII. 1783. 45. (1848); SCHIN., F. A., II. 305. (1864). Suecia.
- muscaria** GERCKE = **vagans** FALL. Germania.
- muscina** MEIG., S. B., VI. 177. 33. (1860). Germania.
- myosetidis** KALTENB., Pflanzenf., 452. 6. (1872). Germania.
- nana** MEIG., S. B., VI. 170. 9. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2736. 3. (1848); GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., IX. 135. t. V. No. 2. f. 1—9. (1851). Europa centr.
- nigra** ZETT. = **carbonaria** ZETT.
- nigra** MACQ. = **atra** MEIG.
- nigrimana** MEIG., S. B., VII. 400. 90. (1838). Belgium.
- nigripes** MEIG., S. B., VI. 170. 7. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 607. 8. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 788. 2. (1838); GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., IV. 227. t. 8. III. No. 2. f. 10—17. (1846); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2738. 5. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 242. 1. (1853); KALTENB., Pflanzenf., 123. 28. — 764. 30. (1872); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 243. (1881); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 338. 7. (1902).
- ambigua* ZETT., Ins. Lapp., 788. 4. (1838).
- ambigua* FALL., (*var. d. reptans*) Dipt. Suec. Agromyz., 4. (1823).
- nigritarsis** MEIG., S. B., VI. 174. 21. (1830); SCHIN., F. A., II. 306. (1864). Germania.
- niveipennis** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2741. 8. (1848). Suecia.
- Novakii** STROBL, Balkan. Dipt. Serajevo., 45. (1902). Europa.
- obscuripennis** MACQ., Suit. à Buff., II. 609. 22. (1835); MEIG., S. B., VII. 400. 87. (1838). Gallia.
- orbona** MEIG., S. B., VI. 186. 65. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 613. 40. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2774. 36. (1848); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 19. 19. (1875); KALTENB., Pflanzenf., 118. 21. (1872) et Verh. naturf. Ver. d. Preuss. Rheinl., XXI. 228 etc. (1864); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 190. 337. (1903).
- ornata** MEIG., S. B., VI. 176. 29. (1830). Germania.
- pallida** MEIG., S. B., VII. 399. 82. (1838); SOHN., F. A., II. 306. (1864). Germania.
- pallipes** MACQ., Suit. à Buff., II. 610. 26. (1835); MEIG., S. B., VII. 400. 89. (1838). Gallia.
- pallitarsis** MACQ., Suit. à Buff., II. 608. 12. (1835); MEIG., S. B., VII. 396. 72. (1838); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., XLVI. 386. (1877). Gallia.
- pascuum** MEIG., S. B., VII. 402. 96. (1838); SCHIN., F. A., II. 307. (1864). Germania.
- pectinata** MEIG., S. B., VI. 179. 41. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 610. 27. (1835); SCHIN., F. A., II. 300. (1864). Gallia.
- perpusilla** MEIG., S. B., VI. 181. 47. (1830). Germania.
- piliseta** BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 190. 338. (1903). Aegyptus.
- pinguis** FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 10. 4. [*Madiza*] (1820); MEIG., S. B., VI. 173. 18. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2779. 41. Europa.

- (1848); SCHIN., F. A., II. 305. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 15. 4. (1875).
- pistaciae** CURTIS, Trans. entom. Soc., III. 3. 45. Britannia.
- populi** KALTENB., Verh. naturf. Ver. d. Press. Rheinl., XXI. 350. Germania. (1864).
- posticata** MEIG., S. B., VI. 172. 16. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 608. 13. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 788. 3. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2740. 7. (1848); SCHIN., F. A., II. 303. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 331. 34. (1872); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 260. (1881). Europa centr. et sept.
- virgaureae** KALTENB., Pflanzenf., 331. 34. (1872).
- potentillae** KALTENB., Pflanzenf., 227. 15. (1872). Germania.
- proboscidea** STROBL, Wiss. Mitth. a. Bosn. u. d. Herzegov. Wien, VII. 91. (641). (1900). Bosnia.
- pseudocunctans** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 64. 328. (1900). Hispania.
- puella** MEIG., S. B., VI. 187. 67. (1830); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 20. 20. (1875).
- pulicaria** MEIG., S. B., VI. 170. 5. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 607. 6. (1835); SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, IV. 29. (1856); KALTENB., Pflanzenf., 54. 24. — 487. 11. (1872); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 15. 3. (1875). Europa centr. et mer.
- pulicaria** ZETT. (Ins Lapp.) = **maura** MEIG.
- pulicaria** ZETT. (Dipt. Scand.), SCHIN. = **cirsii** ROND.
- pulicarioides** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 63. 326. (1900). Hispania.
- pumila** MEIG., S. B., VI. 185. 62. (1830). Germania.
- pusilla** MEIG., S. B., VI. 185. 60. (1830); GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., IX. t. V. No. 3. f. 1—6. (1851); WALK., Ins. Brit., II. 243. 5. (1853); SCHIN., F. A., II. 301. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 525. 31. (1872); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 249. 270—273. (1881); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 91. (1883); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 32. 108. (1891); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 342. 60. (1902) et Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 190. 336. (1903). Europa centr. et mer., Aegyptus.
- pusio** MEIG., S. B., VI. 187. 66. (1830); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 20. 22. (1875). Germania, Italia.
- pygmaea** MEIG., S. B., VI. 183. 51. (1830). Germania.
- remotinervis** STROBL, Balkan-Dipt. Serajevo, 44. (1902). Turcia.
- reptans** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 3. 1. (1823); MEIG., S. B., VI. 168. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 606. 1. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 787. 1. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2734. 4. (1848); SCHIN., F. A., II. 302. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 17. 11. (1875); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 262. (1881). Europa.
- reptans var. d.** FALL. = **maura** MEIG.
- reptans var. b.** FALL. = **abiens** ZETT.
- riparia** WULP, Tijdschr. v. Entom., XIV. 205. (1871). Hollandia.
- rubi** BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 250. (1881). Germania.

- ruficeps** Macq., Suit. à Buff., II. 608. 16. (1835); Meig., S. B., VII. Gallia. 398. 80. (1838).
- ruficornis** Macq., Suit. à Buff., II. 608. 14. (1835); Meig., S. B., VII. Gallia. 397. 74. (1838).
- ruffifrons** Macq., Suit. à Buff., II. 610. 28. (1835); Meig., S. B., VII. Gallia. 401. 91. (1838).
- rufimana** Macq., Suit. à Buff., II. 611. 29. (1835); Meig., S. B., VII. Gallia. 401. 92. (1838).
- rufipes** Meig., S. B., VI. 169. 3. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 606. Germania. 4. (1835); Schin., F. A., II. 302. (1864).
- Schineri** GIRAUD, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 484. (1861); KALTENB., Pflanzenf., 560. 211. (1872); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 277. 16. (1882); Beck., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 189. 332. (1903).
- scutellaris** v. Ros., Württemb. Corrbl., 63. (1840); Beck., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 58. p. 65. (1902).
- scutellata** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 7. 13. (1823); Meig., S. B., VI. 183. 54. (1830); ZETT., Ins. Lapp., 790. 14. var. b. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2772. 34. (1848); Schin., F. A., II. 306. (1864); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 248. (1881); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 277. 17. (1882); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 62. 317. (1900).
- flaveola* var. FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 6. 11. (1823).
- scutellata** var. FALL. = *flavo-scutellaris* ZETT.
- signata** Meig., S. B., VII. 398. 79. (1838); Schin., F. A., II. 306. (1864).
- simplex** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XIII. 46. No. 84. (1869); GIARD, Bull. Soc. entom. Fr., No. 11. p. 179. (1904).
- solidaginis** KALTENB., Pflanzenf., 331. 35. (1872).
- sordida** BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 272. (1881).
- spiraeae** KALTENB., Pflanzenf., 238. 94. (1872).
- squamata** BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 189. 333. (1903).
- strigata** Meig., S. B., VI. 186. 63. (1830); BOUCHE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 142. 2. (1847); Schin., F. A., II. 306. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 408. 12. (1872); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 259. 260. 266. (1881).
- sulfuriceps** STROBL, Dipt. v. Steyerm., IV. 270. (1898). Styria.
- superciliosa** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6455. 21—22. (1860); STROBL, Dipt. v. Steyerm., II. 138. (1894). Styria, Suecia.
- tarsella** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2763. 26. (1848). Suecia.
- thapsi** BOUCHE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 143. 7. (1847); KALTENB., Pflanzenf., 461. 46. (1872). Germania.
- thoracica** Macq., Suit. à Buff., II. 611. 32. (1835); Meig., S. B., VII. 403. 100. (1838). Gallia.
- tibialis** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 5. 5. (1823); Meig., S. B., VI. 179. 38. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2758. 21. (1848). Europa centr. et sept.
- trebinjensis** STROBL, Wiss. Mitth. a. Bosn. u. d. Herzegov. Wien, VII. 90. (640). (1900). Hercegovina.

<i>trifolii</i> KALTENB., Pflanzenf., 129. 66. (1872).	Germania.
<i>tristella</i> THOMS., Eugen. Resa, p. 609. 314. (1868).	China.
<i>trivittata</i> Lw., Berlin. entom. Zeitg., XVII. 52. 67. (1873).	Hungaria.
<i>tuberculata</i> BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 189. 334. (1903).	Aegyptus.
<i>vagans</i> FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 5. 7. (1823); MEIG., S. B., VI. 183. 52. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2767. 29. (1848); SCHIN., F. A., II. 300. (1864); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 61. 315. (1900).	Europa.
<i>muscaria</i> GERCKE, Cnemacantha muscaria Hamburg, (1890); MIK, Wien. entom. Zeitg., X. 189. XIX. (1891).	
<i>variceps</i> ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6453. 15—16. (1860).	Suecia.
<i>variegata</i> MEIG., S. B., VI. 180. 43. (1830); BOUCHE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 143. 5. (1847); KALTENB., Pflanzenf., 134. 5. — 136. 20. — 139. 22. (1872); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 247. (1881).	Germania.
<i>variegata</i> MEIG., S. B., VII. 402. 97. (1838); SCHIN., F. A., II. 307. (1864).	Germania.
<i>varipes</i> MACQ., Suit. à Buff., II. 607. 10. (1835); MEIG., S. B., VII. 396. 71. (1838).	Gallia.
<i>verbasci</i> BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 143. 6. (1847); KALTENB., Pflanzenf., 463. 16. (1872); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 270. (1881).	Germania.
<i>viciae</i> KALTENB., Pflanzenf., 143. 49. (1872).	Germania.
<i>violae</i> CURTIS, Gardeners chronicle (1844).	Britannia.
<i>virgaureae</i> KALTENB. = <i>posticata</i> MEIG.;	
<i>virgo</i> ZETT., Ins. Lapp., 789. 10. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2775. 37. (1848); STROBL, Dipt. v. Steyerm., II. 138. (1894).	Suecia, Styria.
<i>vittata</i> MEIG., S. B., VII. 403. 101. (1838); SCHIN., F. A., II. 307. (1864).	Germania.
<i>vittigera</i> ZETT., Dipt. Scand., VII. 2760. 23. (1848).	Suecia.
<i>xanthocephala</i> ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6457. 25—26. (1860); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 242. 243. (1881).	Europa centr. et sept.
<i>xylostei</i> KALTENB., Verh. naturf. Ver. d. Preuss. Rheinl., XIX. 93. (1862); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 92. (1883).	Germania.

Domomyza

ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 7. VIII. (1875).

<i>anthracipes</i> ROND., Agromyz., 11. 7. (1875).	Italia.
<i>articulata</i> ROND., Agromyz., 10. 4. (1875).	Italia.
<i>brevinervis</i> ROND., Agromyz., 11. 10. (1875).	Italia.
<i>cincta</i> ROND., Agromyz., 10. 5. (1875).	Italia.
<i>cinerascens</i> STROBL = <i>nigripes</i> SCHIN.	
<i>frontella</i> ROND., Agromyz., 9. 1. (1875); STROBL, Dipt. v. Steyerm., II. 139. (1894) et Wien. entom. Zeitg., XIX. 62. 321. (1900).	Europa centr. et mer.
<i>gracilis</i> MEIG., S. B., VI. 171. 10. [<i>Agromyza</i>] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 607. 11. [<i>Agromyza</i>] (1835); SCHIN., F. A., II. 306. [<i>Agromyza</i>] (1864).	Europa centr.
<i>luteitarsis</i> ROND., Agromyz., 10. 3. (1875).	Italia.

- mobilis** MEIG., S. B., VI. 169. 2. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Europa centr. Buff., II. 606. 2. [*Agromyza*] (1835); BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitschr., VIII. 143. 3. [*Agromyza*] (1847); SCHIN., F. A., II. 306. [*Agromyza*] (1864); KALTENB., Pflanzenf., 530. 56., 544. 13. [*Agromyza*] (1872).
- nigrella** ROND., Agromyz., 11. 8. (1875). Italia.
- nigripes** SCHIN. (nec MEIG.), F. A., II. 303. [*Agromyza*] (1864); ROND., Agromyz., 10. 6. (1875); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 62. 322. [*Agromyza*] (1900); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 191. 340. (1903). Europa centr. et mer., Aegyptus.
- cinerascens* STROBL, Dipt. v. Steyerm., II. 140. (1894).
- rondensis* STROBL, Wien. entom. Zeitschr., XIX. 62. 322. var. *nigripes* (1900).
- obscuritarsis** ROND., Agromyz., 9. 2. (1875); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 191. 341. (1903). Italia, Aegyptus.
- parva** ROND., Agromyz., 11. 9. (1875). Italia.
- pulla** MEIG., S. B., VI. 180. 42. [*Agromyza*] (1830). Germania.
- rondensis** STROBL = **nigripes** SCHIN.

Liriomyza

- MIK, Wien. entom. Zeitg., XIII. 284. (1894).
- urophorina** MIK, Wien. entom. Zeitg., XIII. 290. t. III. (1894). Austria.

Ceratomyza

- SCHIN., Wien. entom. Monatschr., VI. 434. (1862).
- Odontocera** MACQ., Suit. à BUFF., II. 615. (1835).
- acuticornis** MEIG., S. B., VI. 175. 26. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à BUFF., II. 615. 2. [*Odontocera*] (1835); SCHIN., F. A., II. 311. (1864). Europa centr.
- occulta** MEIG., S. B., VII. 403. 99. [*Agromyza*] (1838); SCHIN., F. A., II. 307. [*Agromyza*] (1864).
- affinis** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 9. 2. [*Chlorops*] (1823); MEIG., S. B., VI. 176. 27. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à BUFF., II. 615. 4. [*Odontocera*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2798. 3. [*Chlorops*] (1848); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, IV. 29. (1856); KALTENB., Pflanzenf., 396. 17. [*Agromyza*] (1872). Europa centr. et sept.
- denticornis** PANZ., Fauna Germ., CIV. 22. [*Chlorops*] (1806); MEIG., S. B., VI. 175. 25. t. LXI. f. 33, 34. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à BUFF., II. 614. 1. [*Odontocera*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 791. 1. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2796. 1. [*Chlorops*] (1848); WALK., Ins. Brit., II. 243. 7. [*Agromyza*] (1853); SCHIN., F. A., II. 311. (1864); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 32. 109. (1891); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 64. 332. (1906). Europa.
- denticulata** PANZ., Fauna Germ., CIV. 22. (1806) teste FALL.

- Meigeni** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 9. 1. [*Chlorops*] (1823).
nigriventris STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 64. 332. (1900).
nigroscutellata STROBL, l. c. (1900).
- denticulata** PANZ. = **denticornis** PANZ.
- femoralis** MEIG., S. B., VII. 297. 76. [*Agromyza*] (1838); SCHIN., F. Europa centr. A., II. 311. (1864); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 64. 331. et mer. (1900).
- flavicornis** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 782. (1862); SCHIN., Austria. F. A., II. 311. (1864).
- fulvipes** MEIG., S. B., VI. 174. 23. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Europa centr. Buff., II. 608. 15. [*Agromyza*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 339. 23. (1902).
- lateralis** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2799. 4. [*Chlorops*] (1848). Suecia.
- Meigeni** FALL. = **denticornis** PANZ.
- nigriventris** STROBL = **denticornis** PANZ.
- nigroscutellata** STROBL = **denticornis** PANZ.
- occulta** MEIG. = **acuticornis** MEIG.
- spinicornis** MACQ., Suit. à Buff., II. 615. 5. [*Odontocera*] (1835); MEIG., Europa centr. S. B., VII. 398. 77. [*Agromyza*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., VI. et sept. 2798. 2. [*Chlorops*] (1848).
- tarsata** MEIG., S. B., VII. 397. 75. [*Agromyza*] (1838). Germania.

Cryptochetum

ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 7. VII. (1875).

grandicorne ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 7. (1875). Italia.

Aphaniosoma

BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 186. (1903).

approximatum BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 186. 321. t. Aegyptus. IVe f. 86, 87, 88. (1903).

Leptometopa

BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 188. (1903).

rufifrons BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 188. 331. t. IVe f. Aegyptus. 83, 84, 85. (1903).

Pseudopomyza

STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 284. 22. (1893).

nitidissima STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 284. 22. (1893); THALH., Austria. Fauna dipt. transsilv. Colocza, 24. (1902); HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XXI. 261. (1902).

Rhicnoëssa

Lw., Wien. entom. Monatschr., VI. 174. 71. (1862).

- alboguttata** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 6. 302. (1900). Hispania.
albosetulosa STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 7. 303. (1900); BECK., Hispania,
 Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 184. 316. (1903). Aegyptus.
cinerea Lw., Wien. entom. Monatschr., VI. 175. (1862) et Berlin. Turcia,
 entom. Zeitschr., IX. 35. 1. (1865); STROBL, Wien. entom. Zeitg., Hispania,
 XIX. 6. 301. (1900); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 185. Aegyptus.
 320. (1903).
cinerella HALID., Entom. Mag., IV. 151. [*Leptomyza*] (1837); WALK., Europa.
 Ins. Brit., II. 235. 3. [*Opomyza*] (1853); Lw., Berlin. entom.
 Zeitschr., IX. 38. 4. (1865); ROND., Agromyz., 22. 1. [*Anthophilina*] (1875); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 256. (1902).
grisea FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 7. 2. [*Anthomyza*] (1823); MEIG., Europa.
 S. B., VI. 112. 26. [*Opomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II.
 581. 2. [*Leptomyza*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2699. 7.
 [*Anthophilina*] (1848); ROND., Agromyz., 22. 2. [*Anthophilina*] (1875); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 8. 304. (1900); CZERNY,
 Wien. entom. Zeitg., XXI. 255. (1902).
longirostris Lw., Berlin. entom. Zeitg., IX. 36. 2. (1865); BECK., Sicilia,
 Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 185. 317. (1903). Aegyptus.
pallipes Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 37. 3. (1865); BECK., Mitth. Graecia,
 Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 185. 318. (1903). Aegyptus.
pictipes BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 185. 319. (1903). Aegyptus.

Selachops

WAHLB., (refer. BOHEM.) Arsberät. om zool. framst., 173. (1843).

Encoelocera Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 321. 1. (1844).

bicolor Lw. = *flavocincta* WAHLB.

flavocincta WAHLB., Arsberätt. om zool. framst., 173. (1843); ZETT., Europa.
 Dipt. Scand., VII. 2793. 1. (1848); SCHIN., F. A., II. 220. (1864);
 ROND., Prodr., VII. Agromyz., 6. 1. (1875); BEZZI, Contrib. alla
 F. ditt. di Pavia, 23. 54. (1891).

bicolor Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 321. 1. [*Encoelocera*] (1844).

Phytomyzinae.

Phytomyza

FALL., Dipt. Suec. Phytomyz., 2. (1823).

Chromatomiyia HARDY, Ann. nat. Hist. Serie, II. 4. (1849).

Napomyza p. p. WULP (1871).

abdominalis ZETT., Dipt. Scand., VII. 2819. 6. (1848); BRISCHKE, Europa centr.
 Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 237. (1881). et sept.

- acuticornis** Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 78. 19. (1858); STROBL, Silesia,
Wiss. Mitth. a. Bosnien u. d. Herzegov. Wien, VII. 92. (642). Dalmatia.
(1900).
- aeneonitens** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 308. 26. (1893). Austria.
- affinis** FALL., Dipt. Suec. Phytomyz., 3. 3. (1823); MEIG., S. B., VI.
192. 11. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 618. 9. (1835); ZETT., Ins.
Lapp., 793. 6. (1838); BOIE, Kröjer's Tidskr., 2. 3. 248. (1838);
ZETT., Dipt. Scand., VII. 2827. 15. (1848); LUCAS, Explor. scient.
de l'Algérie, III. 501. 272. (1849); WALK., Ins. Brit., II. 246. 6.
(1853); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, I—III. 11. (1855);
SCHIN., F. A., II. 316. (1864); HEEGER, Sitzgsber. d. K. Akad. d.
Wiss. math. nat. cl., XXXI. 297. t.; KALTENB., Pflanzenf., 348.
17. (1872); INCHBALD, Plant. mining dipt. The Entomol. Lond.,
217—222. (1882) et Observ. on Ins. live. The Entomol. Lond.,
193—195. (1883); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 90. (1883);
BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, V. 260. (1881); BEZZI,
Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 31. 108. (1891); STROBL, Wien.
entom. Zeitg., XIX. 65. 335. (1900); LUNDB., Dipt. Groenland.,
306. 151. (1900); BECK., Acta Soc. scientif. Fenn., XXVI. 63. 131.
(1900) et Mith. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 191. 342. (1903).
- flavicoxa* STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 65. 335. var.
affinis (1900).
- nigricornis** MACQ., Suit. à Buff., II. 618. 11. (1835); MEIG., S. B.,
VII. 404. 33. (1838); HARDY, Ann. nat. Hist. Serie, II. 4.
385—392. [*Chromatomyia*] (1849); KALTENB., Pflanzenf., 15.
7. (1872).
- agromyzina** MEIG., S. B., VI. 191. 9. (1830); KALTENB., Pflanzenf., Germania.
295. 12. (1872); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 272.
(1881).
- albiceps** MEIG., S. B., VI. 194. 20. (1830); ZETT., Ins. Lapp., 793. 5. Europa centr.
(1838) et Dipt. Scand., VII. 2830. 17. (1848); HARDY, Ann. nat.
Hist., II. 4. 385. [*Chromatomyia*] (1849); HEEGER, Sitzgsber. d. K.
Akad. d. Wiss. Wien, IX. 774—781. (1852); SCHOLTZ, Zeitschr. f.
Entom. Breslau, I—III. 11. (1855); SCHIN., F. A., II. 317. (1864);
KALTENB., Pflanzenf., 21. 8. — 118. 22. — 272. 13. — 314. 2. —
320. 11. — 339. 23. — 364. 35. — 367. 2. — 381. 77. — 387. 63.
— 399. 47. — 451. 5. — 483. 21. — 488. 13. — 492. 2. (1872);
BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 238. 263. (1881);
INCHBALD, Plant mining dipt. The Entom. London, 217—222.
(1882); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 90. (1883); STROBL,
Wien. entom. Zeitg.. XII. 136. (1893) et XIX. 65. 336. (1900).
- pisi* KALTENB., Pflanzenf., 118. 22. (1872) et Verh. naturf. Ver.
d. Preuss. Rheinl., XXI.
- syngenesiae* HARDY, Ann. nat. Hist., II. 4. 385. [*Chromatomyia*]
(1849).
- albipennis** FALL., Dipt. Suec. Phytomyz., 4. 9. (1823); MEIG., S. B., Europa centr.
VI. 191. 10. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 617. 7. (1835); ZETT., et sept.