

# BOLLETTINO

DEI

## Musei di Zoologia ed Anatomia comparata

della R. Università di Torino

N. 158 pubblicato il 1º Luglio 1893

VOL. VIII

Dott. E. GIGLIO-TOS (1893)

### Diagnosi di nuovi generi e di nuove specie di Ditteri

#### IX.

Tutti i ditteri, di cui nel presente lavoro do le brevi diagnosi, appartengono alla collezione BELLARDI di Ditteri messicani.

#### Tachininae.

Gen. **Gymnomomma** v. d. Wulp.

**G. novum** n. sp. — Foem. — *Facie flavâ, genis pilosis, fronte lateribus nigrescente, antennis flavis articulo tertio nigro, apice lato, truncato, securiforme; thorace nigro, flavo-olivaceo pollinoso; scutello, abdomineque fulvis; in segmentis primo, secundo et tertio macula nigra dorsuali sub-quadrata; in segmentis secundo et tertio setis duabus discalibus praeter marginales; pedibus fulvis; alis bruneo-flavescensibus; calypteris halteribusque fulvis.* — Long. mm. 9.

**Microtrichomma** nov. gen.

Generi **Echinomyiae** affine: *facies, genae, epistomium et frons ut in Echinomyia: genae nudae; palpi sub-clavati; antennae ut in Echinomyia; articulo tertio orato, vix secundo longiore: oculi hirti; abdomen setis duabus discalibus in segmento secundo et tertio, duabus marginalibus in secundo et plurimis in tertio, multis discalibus in quarto, munitum.*

*Species typicae:*

Gen. **Tanypeza** Fall.

**T. mexicana** n. sp. — *Viridis aenea sub-nitida: fronte et facie pallide-ochraceis: antennis flavis stylo sub-nudo: macula verticalis, maculisque latis in pleuris argenteis, thorace scutelloque vix cinereis: pedibus flavis, tarsis anticis praeter basim nigris, coeteris totis nigris: tibiis meditis et posticis basi et apice late fuscescentibus: halteribus melleis: alis flavidis.* — Long. mm. 8-9.

**Tylemyia** (mihi).

Sostituisco questo nome a quello di *Omalocephala* (meglio *Homalocephala*) usato da MACQUART nel 1843 per un dittero della Guiana descritto col nome di **O. fusca** in Diptères exotiq. II, 3<sup>e</sup> part. p. 232, tab. XXXI, fig. 12, 12<sup>a</sup>, 12<sup>b</sup>. Tale nome era già stato prima usato da SPINOLA nel 1839 per un genere di Rincoti.

Species typica: **Tylemyia fusca** = *Omalocephala fusca* Macq.

Gen. **Calobata** Meig.

**C. plectilis** n. sp. — Foem. — *Nigra: femoribus mediis et posticis in medio late fulvis, tarsis anticis praeter apicem flavidis: alis flavidis.* — Long. mm. 15.

**Drosophilinae.**

Gen. **Drosophila** Fall.

**D. excita** n. sp. — Foem. — *Nigra: facie cinerea, genis latissimis nigris, stylo superne plumoso: pleuris, fasciisque apicalibus segmentorum abdominis cinereis: alis sub-fuscis.* — Long. mm. 5.

**Chloropinae.**

Gen. **Chlorops** Meig.

**C. unicornis** n. sp. — *Flava: antennis, triangulo lato frontali, thoracis vittis tribus latis, abdome, tarsis omnibus et tibiis posticis nigris: alis limpidis: fronte conice longe producta.* — Long. imm. 4, a capite ad apicem alarum.