

CAROLI A LINNE,

Equitis Aur. de Stella Polari,

ARCHIATRI REGII, MED. & BOTAN. PROFESS. UPSAL.,
ACAD. PARIS. UPSAL. HOLMENS. PETROPOL.
BEROL. IMPER. LOND. ANGL. MONSPEL.
TOLOS. FLORENT. EDINB. BERN. SOC.

SYSTEMA NATURÆ

PER

REGNA TRIA NATURÆ,

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES,

GENERA, SPECIES,

CUM

CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS,
SYNONYMIS, LOCIS.

TOMUS I.

EDITIO DUODECIMA, REFORMATA.

Cum Privilegio S:æ R:æ M:tis Sveciae & Electoris Saxon.

HOLMIÆ,

IMPENSIS DIRECT. LAURENTII SALVII,

1766.

- albifrons. 71. *M. antennis plumatis pilosa nigra, fronte alba.* *Fn.*
*svec. 1834.**
Reaum. inf. 4. t. 26. f. 5.
Habitat in Europa.
- furta. 72. *M. antennis plumatis pilosa nigra, alis deflexis fuscis
margine laterali albis.*
Habitat Upialiae, sub soliis Herbarum. *C. P. Thun-
berg.*
*Corpus atrum, pilis adspersum, magnitudine Pediculi.
Alæ nigrae, semper deflexæ, imprimis posteriora
versus. Pedes albi. Singularis admodum Antennæ
testaceis, subrotundis, sed una cum proboscide re-
tractis intra cranium, nec crano infident antennæ.*
- sepul- 73. *M. antennis plumatis pilosa nigra, abdomine atro ni-*
chralis. *tidulo: supra glaberrimo.* *Fn. svec. 1835.**
Habitat in Europa.
*Statura Muscæ domestica, sed tota atra; alter sexus
seta non pilosa.*
- fera. 74. *M. antennis setariis pilosa nigra, abdominis lateribus
testaceis diaphanis.* *Fn. svec. 1836.**
Habitat in Europa.
- grossa. 75. *M. antennis setariis pilosa nigra, alis basi ferrugineis.*
*Fn. svec. 1837.**
Reaum. inf. 4. t. 26. f. 10.
Habitat in Stercore bovino.
Similis M. meridianæ, sed major omnibus nostris muscis.
- rotundata. 76. *M. antennis setariis pilosa, thorace sublineato, abdo-
mine subrotundo flavo: maculis longitudinalibus fu-
scis, confertis.* *Fn. svec. 1838.**
Scop. carn. 883.
Habitat in Europa.
*Maculae 5 dorsales, in altero sexu distantes, in altero
contiguae.*
- tremula. 77. *M. antennis setariis pilosa atra nitens, alarum basi,
squamæ halteribusque ferrugineis.*
Scop. carn. 885.
Habitat in Europa: Svecia.

subfusca. 84. M. antennis setariis pilosa tota atra, alis hyalinis, femoribus posticis saltatoriis.

Habitat in Svecia, volitat saliendo cadendoque femoribus quasi dependentibus; quiescens territa salit ut Pulex.

Magnitudo Pulicis absque ulla albedine.

toralis. 85. M. antennis setarlis pilosa aterrima. Fn. svec. 1846.

Scop. carn. 890.

Habitat in Europa.

serrata. 86. M. antennis setarlis pilosa fusca, alarum costa pilis brevissimis ferrata, abdomine pedibusque ferrugineis.

Fn. svec. 1847.*

Habitat in Europa.

scellaris. 87. M. antennis setariis pilosa nigra, alis nervosis, oculis ferrugineis. Fn. svec. 1848.*

Scop. carn. 905, Musca cenopota.

E. N. C. 12. obs. 58.

Raj. inf. 261.

Reaum. inf. 5. t. 8. f. 7, II, 12.

Geoffr. paris. 2. p. 536. n. 85.

Habitat in cellis vinariis aliisque.

meteori. 88. M. antennis setarlis pilosa nigra, abdomine subcincta, alis basi subflavis, oculis brunneis. Fn. svec. 1849.*

It. wgoth. 37.

Habitat in Europa, nebula instar, ingruente imprimis pluvia, ora Equorum obvolitantis. Amoen. acad. 3. p. 358. Sub aestivatione citissime obvolans.

Similis M. domesticæ, sed ♂ minor. Abdomen omnino ovatum, nec depresso. Antennæ seta vix pubescente.

putris. 89. M. antennis setariis subpilosa atra, alarum costa nigra, oculis ferrugineis. Fn. svec. 1850.*

Scop. carn. 904.

α. Fn. svec. 1. n. 1110.

β. Fn. svec. 1. n. 1109.

Gaed. inf. 1. t. 73.

List. gaed. t. 132.

Mer. eur. t. 43. f. 83.

Frisch. inf. 1. t. 7.

Habitat a in Fimeti, β in Caseo, larva saliente.