

# Diptera Americae septentrionalis indigena.

Descriptis

H. L o e w. (1862)

## Centuria secunda.

1. <i>Corethra trivittata.</i>	31. <i>Rhamphomyia impedita.</i>
2. <i>Simulium quadrivittatum.</i>	32. - <i>exigua</i>
3. <i>Leptis ochracea.</i>	33. - <i>unimaculata.</i>
4. - <i>costata.</i>	34. <i>Hilara umbrosa.</i>
5. <i>Bolbomyia nana.</i>	35. - <i>femorata.</i>
6. <i>Leptogaster badius.</i>	36. - <i>velutina.</i>
7. - <i>pictipes.</i>	37. - <i>unicolor.</i>
8. - <i>varipes.</i>	38. - <i>nigriventris.</i>
9. - <i>murinus.</i>	39. - <i>trivittata.</i>
10. - <i>testaceus.</i>	40. - <i>mutabilis.</i>
11. - <i>incisuralis.</i>	41. - <i>brevipila.</i>
12. - <i>favillaceus.</i>	42. - <i>atra.</i>
13. - <i>obscuripes.</i>	43. - <i>leucoptera.</i>
14. - <i>tenuipes.</i>	44. - <i>gracilis.</i>
15. - <i>flavipes.</i>	45. - <i>basalis.</i>
16. <i>Brachystoma binummus.</i>	46. <i>Cyrtoma halteralis.</i>
17. - <i>nigrimana.</i>	47. - <i>longipes.</i>
18. <i>Syneches albonotatus.</i>	48. - <i>pilipes.</i>
19. <i>Empis barbata.</i>	49. <i>Clinocera simplex.</i>
20. - <i>nuda.</i>	50. - <i>lineata.</i>
21. - <i>spectabilis.</i>	51. <i>Hemerodromia valida.</i>
22. <i>Pachymeria brevis.</i>	52. - <i>obsoleta.</i>
23. <i>Rhamphomyia vittata.</i>	53. - <i>notata.</i>
24. - <i>testacea.</i>	54. - <i>scapularis.</i>
25. - <i>rava.</i>	55. - <i>defecta.</i>
26. - <i>mutabilis.</i>	56. - <i>vittata.</i>
27. - <i>aperta.</i>	57. <i>Drapetis pubescens.</i>
28. - <i>frontalis.</i>	58. <i>Stilpon varipes.</i>
29. - <i>polita.</i>	59. <i>Dolichopus albiciliatus.</i>
30. - <i>lugens.</i>	60. - <i>socius.</i>

- |     |                                    |      |                                 |
|-----|------------------------------------|------|---------------------------------|
| 61. | <i>Dolichopus fulvipes.</i>        | 81.  | <i>Anorostoma marginata.</i>    |
| 62. | - <i>praeustus.</i>                | 82.  | <i>Blepharoptera pubescens.</i> |
| 63. | - <i>setosus.</i>                  | 83.  | - <i>armipes.</i>               |
| 64. | <i>Tachytrechus angustipennis.</i> | 84.  | - <i>tristis.</i>               |
| 65. | <i>Chrysotus cornutus.</i>         | 85.  | <i>Allophyla laevis.</i>        |
| 66. | - <i>picticornis.</i>              | 86.  | <i>Helomyza apicalis.</i>       |
| 67. | <i>Hydrophorus parvus.</i>         | 87.  | - <i>assimilis.</i>             |
| 68. | <i>Sympycnus nodatus.</i>          | 88.  | - <i>plumata.</i>               |
| 69. | <i>Psilopus melampus.</i>          | 89.  | - <i>latericia.</i>             |
| 70. | - <i>dimidiatus.</i>               | 90.  | - <i>longipennis.</i>           |
| 71. | - <i>tener.</i>                    | 91.  | <i>Diplocentra helva.</i>       |
| 72. | <i>Lispe sociabilis.</i>           | 92.  | <i>Psilopa nobilis.</i>         |
| 73. | <i>Trypetia sarcinata.</i>         | 93.  | <i>Amiota humeralis.</i>        |
| 74. | - <i>atra.</i>                     | 94.  | - <i>leucostoma.</i>            |
| 75. | - <i>geminata.</i>                 | 95.  | <i>Drosophila dimidiata.</i>    |
| 76. | - <i>timida.</i>                   | 96.  | - <i>amoena.</i>                |
| 77. | - <i>abstensa.</i>                 | 97.  | - <i>tripunctata.</i>           |
| 78. | - <i>finalis.</i>                  | 98.  | - <i>adusta.</i>                |
| 79. | <i>Lauxania albovittata.</i>       | 99.  | - <i>ampelophila.</i>           |
| 80. | <i>Scoliocentra helvola.</i>       | 100. | - <i>punctulata.</i>            |

1. *Corethra trivittata* nov. sp. ♂. Pallide flavescens, vittis thoracis tribus, melanoto, abdominis fasciis, annulis femorum apicali tibiarumque altero basali, altero apicali ex fusco nigris, alis cinereo maculatis. — Long. corp.  $2\frac{1}{6}$  lin., Long. al.  $2\frac{1}{2}$  lin.

Dilutissime flavescens, pilis longis, plerisque subfuscis vestita. Antennae nigro annulatae, pilis confertis subfuscis verticillatae. Thorax dorsum nigro trivittatum, vittâ mediâ geminâ postice, lateralibus antice valde abbreviatis. Scutelli latera fusca. Metanotum ex nigro fuscum. Abdomen fusco fasciatum. Pedes pallide flavi, inde ab apice articuli tarsalis primi pallide subfusci, annulis femorum apicali, tibiarum duobus (altero basali, altero apicali) nigricantibus. Alae maculis aliquot parvis ex nigro cinereis variegatae. (Maine; Osten-Sacken.)

2. *Simulium quadrivittatum* nov. sp. Atrum, opacum, thorace vittis quatuor albis ornato, halteribus flavis, tibiis tarsisque posterioribus albido-cingulatis, alis hyalinis. — Long. corp.  $\frac{5}{6}$  lin., Long. al.  $\frac{4}{6}$  lin.

tudinalium apicibus fusco limbatis, setulis costae mediocribus. — (Connecticut; Norton.)

**Nota.** Ad Helom. flavum Meig. propo accedit, sed quam illa maior est et thoraci dorsum atomis fuscis aspersum habet. Ab Helom. assimilis Meig. speciminibus immaturis, quibus colore similis est, venâ transversâ posteriore minus obliquâ distinguuntur. — Helom. latericiam Helom. quinquepunctatam, a Sayo descriptam, esse crederem, nisi auctor antennas "quinquepunctatae" suae colore ex rufso fuso tinctas esse affirmaret. — Ab Helom. plumatâ haec nostra Helom. latericia oculis maioribus ovatis, genis angustioribus et scutello toto piloso differt.

**90. *Helomyza longipennis* nov. sp. ♂ et ♀.** *Flava, alis subhyalinis, venis transversis anguste fusco-limbatis, pleurarum dimidio superiore, praeter pilos minutos tres quatuorve ante suturam, omnino nudo, dimidio inferiore, praeter pilos ordinarios nigros; pube tenuissimâ albida vestito, setâ antennarum plumatâ.* — Long. corp. 3—3½ lin., Long. al. 3⅓—3⅔ lin.

Flava, opaca, colore frontis, thoracis et scutelli saepè magis in latericum vergente. Antennae fulvae, articulo tertio ovato, setâ pilis brevioribus quam in speciebus praecedentibus plumatâ. Oculi mediocres, rotundi; genae latiusculae; seta mystacina utrinque unica validiuscula. Thoracis dorsum punctis subsfuscis, propter paryilatem obsoletissimis aspersum, punctis setas ordinarias ferentibus distinctioribus. Scutellum totum pilis rarioribus vestitum. Pleurarum dimidium superius, praeter pilos minutos tres quatuorve ante suturam positos, nudum; dimidium inferius pube subtili pallidâ pilisque ordinariis nigris vestitum. Segmentorum abdominalium singulorum margo posticus plerumque nigricans, interdum latius niger. Pedes pallide flavi, tarsis apicem versus infuscatis, rarius articulis tribus ultimis ex fusco nigris. Alae maiusculae, subhyalinae, ex luteo cincrascentes, venis transversis anguste fusco-limbatis. — (New-York; Osten-Sacken.)

**Nota.** A Meigenii Helom. olente, cui propinqua, setâ antennarum plumatâ separatur.

**91. *Diplocentra helva* nov. sp. ♂ et ♀.** *Helva, facile albida, abdominis linea media et vittâ utrinque lateralî maculis segmentorum singulorum angulatis compositâ fuscis, lateralibus thoracis marginibus praeter setas nulis, pleuris subnudis, alis ex luteo*

*subfuscis, vena transversâ posteriore fusco limbatâ. — Long. corp. 3½ — 3 lin., Long. al. 3 — 3½ lin.*

*Hclva. Frons lutea, triangulo ocellari et vittis setas ferentibus pallide ochraceo tectis. Antennae luteae, articulo tertio interdum subsusco. Facies ex flavo albida, setis mystacinis minutis. Palpi flavi. Thoracis dorsum pilis validis scabrum, margine laterali præter setas nudo; breves pleurarum pili rarissimi. Abdominis segmentum secundum utrinque maculam ovalam, sequentia singula vitulam medium postice abbreviatam et utrinque maculam angulatam habent, ita ut abdomen fusco trivittatum sit; anguli laterales antice singuli segmentorum nigri. Pedes pallide flavescentes. Alae ex luteo subsuscae, vena transversâ posteriore anguste fusco-limbatâ, venis longitudinalibus secundâ, tertâ et quartâ apicem versus divergentibus. — (North Red River; Kennicot.)*

92. *Pstlopa nobilis* nov. sp. ♂. *Nigro-viridis, fronte atrâ, puncto frontali albo, primis duobus antennarum articulis nigris, tertio rufi, facie pallide ochracea, femoribus nigris, tibiis tarsisque flavis, hypopyglio albido, perlongo. — Long. corp. 1½ lin., Long. al. 1½ lin.*

*Frons altra, opaca, supra antenas puncto albo ornata. Duo primi antennarum articuli nigri, tertius rufus, angulo apicali subacute. Facies angusta, pallide ochracea. Genae angustissimae. Palpi flavi. Thoracis dorsum et scutellum nigro-viridia, modice nitida. Abdomen aeneo-nigrum, latera versus albo-pollinosum, segmento ultimo chalybescente. Hypopygium perlustum, theca albida, pene nigra. Pedes flavi, femoribus præter apicem nigris. Halteres sulphurei. Alae limpidae. — (Distr. Columbiæ; Osten-Sacken.)*

93. *Amiota humeralis* nov. sp. ♀. *Atra, nitida, facie totâ humeris et maculâ subalarî niveis, pedibus pallide flavis. — Long. corp. 1½ lin., Long. al. 1½ lin.*

*Simillima Amiotae alboguttatae Wahlb., sed robustior et facie totâ niveâ distincta. — Atra, nitida, breviter ferrugineo-pilosa. Frontis dimidium superius nigricans, inferius sordide albicans. Antennae fuscae. Genae angustissimae, pallide flavae. Clypeus niger. Humeri nivei. Pleurae sub alarum basi maculâ niveâ ornatae. Pedes pallide flavi. Alae subhyalinae, venis longitudinalibus tertâ et quartâ apicem versus convergentibus. — (District Columbia; Osten-Sacken.)*

94. *Amiota leucostoma* nov. sp. ♀. *Ex ferrugineo rufa, facie, humeris pleurarumque maculâ subalari candidis, abdominis apice segmentorumque praecedentium singulorum dimidio basali atris.* — Long. corp.  $1\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $1\frac{3}{4}$  lin.

Frons ex ferrugineo rufa, opaca. Antennarum articuli duo primi fronti concolores, tertius fuscus. Facies candida. Thoracis dorsum ex ferrugineo rufum, subnitidum, polline tenuissimo flavicante aspersum; humeri candidi. Scutellum magnum thoraci concolor. Pleurae ex ferrugineo rusae, sub alis maculâ candidâ ornatae. Abdomen latiusculum, apice tumido, segmentis duobus ultimis totis, duorum praecedentium dimidio basali et secundi maculis lateralibus atris. Pedes pallide flavicantes. Halteres albi. Alae lutescentes, immaculatae, venis longitudinalibus tertia et quartâ convergentibus. — (Pennsylvania; Osten-Sacken.)

95. *Drosophila dimidiata* nov. sp. ♀. *Supra atra, infra alba, abdomine albo et atro variegato, alis subcinereis, puncto costali atro.* — Long. sorp. 1 lin., Long. al.  $1\frac{1}{4}$  lin.

Frons atra, praeter triangulum ocellare et praeter vitulas a verticis lateribus decurrentes opaca. Antennae nigrae. Facies cum clypeo atra, dimidio superiore ex fusco nigro. Occiput atrum; proboscis et genae albæ. Thoracis dorsum atrum, nitidum; scutellum concolor, sed opacum. Pectus album. Abdominis segmentum primum maximâ ex parte nigrum; segmenta tria sequentia alba, margine laterali et fasciâ singulorum posticâ late interruptâ atris; segmenta duo ultima alba, nigro trimaculata. Pedes albi. Halterum pedunculus albidus, capitulum nigrum. Alae ex flavo subcinerascentes, in apice segmenti costalis primi puncto atro notatae. (Illinois; Le Baron.)

96. *Drosophila amoena* nov. sp. ♂ et ♀. *Rufescens, abdome atro, pectore pedibusque dilutissime flavicantibus, alis subhyalinis, maculis duabus transversis fuscis, alterâ discoidali majore, alterâ subapicali minore, apice ipso albo.* — Long. corp  $1\frac{1}{4}$  lin., Long. al.  $1\frac{1}{2}$  lin.

Frons flava, margine laterali albido-pollinoso. Antennae flavae, articulo tertio saepè subfuscato. Genae angustae et facies albo-pollinosæ. Thoracis dorsum et scutellum rufescentia, modice nitida; pleurae paulo pallidiores. Abdomen angustum, atrum, nitidum, basi tamen refescente. Pedes pallidissime flavicantes. Halteres albidi. Alae ex cinereo subhyalinæ, apice albo, maculis duabus transversis fuscis, alterâ discoidali majore, alterâ subapicali minore, sub-

fasciatae, venis longitudinalibus tertia et quartâ modice convergentibus. — (District Columbia; Osten-Sacken.)

97. *Drosophila tripunctata*, nov. sp. ♀. Pallide testacea, infra cordido albida, tertio antennarum articulo subfuscō, segmentorum abdominalium marginibus posticis atris, alarum venis transversale apicibusque venarum longitudinalium anguste nigro limbatis. — Long. corp. 1 $\frac{1}{2}$  lin., Long. al. 1 $\frac{1}{2}$  lin. Pallidissime testacea. Frons flava, opaca. Antennarum articuli duos primi flavescentes, tertius subfuscus. Seta antennarum radiis longitudinaliis plumata. Facies nasuta. Abdominis segmenta singula praeter ultimum fasciā posticā atrā marginata, quae in segmentis posterioribus longitudinalem medium dilatatur. Pleurae et pedes ex flave cordido albantes. Alae ex luteo cinereae, venis transversis transversisque longitudinalium apicibus anguste nigro limbatis, ita ut in marginis apicali puncta tria minuta nigra conspiciantur; venae longitudinalis tertia et quarta parallelae. — (Washington; Osten-Sacken.)

98. *Drosophila adusta* nov. sp. ♂ et ♀. Pallide testacea, supra subbadia, thoracis vittis duabus latissimis et limbo laterali albo pollinoso, abdominis apice atro, alis subcinereis, maculâ apicali nigra notulis. — Long. corp. 1 $\frac{1}{2}$  lin., Long. al. 1 $\frac{1}{3}$  lin.

*Drosophilae* graminum Fall. similis et affinis. Frons flava, limbo laterali lato albido-pollinoso. Antennae pallide testaceae, articulis duobus primis interdum supra et articulo tertio in basi subfuscis. Facies alba; setulae mystacinae et quae in palporum apice cernuntur validissimae. Color thoracis et scutelli in immaturis testaceus, in matu- ris subbadius; in thoracis dorso vittae duae latissimae et margines laterales pollino albo teguntur, ita ut vittae tres obscuriores, aequales, et integræ apparcent. Pleurae pallide flavicantes. Abdomen pallide testaceum, segmento ultimo atro, segmento penultimo plerumque, præsertim in mare, utrinque maculâ permagnâ atrâ variegato; in speciminibus quibusdam in masculis ultima tria abdominalis segmenta fere tota atra. Pedes dilutissime flavicantes, tarsis anticis et extremo posteriorum apice subfuscis. Alae ex luteo subcinerascente, maculâ minutâ nigrâ, in venas longitudinalis tertiae sine sitâ; venae longitudinales tertia et quarta parallelae. — (Washington; Osten-Sacken.)

99. *Drosophila ampelophila* nov. sp. ♂ et ♀. Ex flavo rufescens, antennis pallidis, ab domine nigro-fasciato, segmentis ul-

*timis duobus in mare, ultimo in foeminā atris, puncto apicali atro in antico maris metalarso, alis omnino immaculatis. — Long. corp.  $\frac{1}{2}$  —  $\frac{5}{6}$  lin., Long. al.  $\frac{5}{6}$  —  $\frac{11}{12}$  lin.*

Frons flava, opaca. Antennae pallide flavae, articulo tertio nonnumquam subfuscō. Facies nasuta, flava, setulis mystacinis utrinque compluribus validiusculis, praesertim in foeminā. Thoracis dorsum ex flavo rufescens, unicolor, modice nitens. Scutellum thoraci concolor. Pleurae pallidiores. Abdomen ex flavo rufescens; segmenta singula fasciā posticā nigrā, in mediis segmentis nonnihil dilatata cinguntur; duo ultima segmenta in mare atra, in foeminā ultimum atrum sive obscure fuscum. Pedes flavescentes; metatarsus maris anticus in apice supra tuberculum minutum atrum habet. Alae breves, latiusculae, ex cinereo sublutescentes, prorsus immaculatae, venis transversis inter se non remotis. — (Cuba; Poey.)

Nota. *Drosophila ampelophila* in Europae regionibus meridianis frequentissima nec Europae mediae plane aliena etiam in meridianis Africæ partibus habitat.

100. *Drosophila punctulata* nov. sp. ♂ et ♀. Fusca, thorace cinerascente, opaco, punctis fuscis asperso, fasciā basali segmentorum abdominalium singulorum interruptā pallidā, alis subcincnereis, immaculatis. — Long. corp.  $1\frac{1}{2}$  —  $1\frac{1}{2}$  lin., Long. al.  $1\frac{1}{2}$  lin.

Frons fusca, opaca, triangulo ocellari magno vittulisque a verticis lateribus decurrentibus cinereo-pollinosis et obsoleto fusco maculatis, margine antico subalbicante. Antennarum articuli duo primi testacei, supra infuscati, articulus tertius fuscus. Facies nasuta, carinā ipsa sulcatā. Genae mediocres. Thoracis dorsum polline cinereo opacum, punctis confertis fuscis aspersum. Scutellum thoraci concolor, praeter punctas ordinarias ferentia impunctatum. Pleurae fuscae. Abdomen saturatius fuscum, subnitidum, segmentis singulis in basi fasciā interruptā pallidā variegatis, adiectā in speciminibus quibusdam linea pallidā longitudinali. Pedes dilutissime testacei, femoribus anticis, femorum posteriorum apice tibiarumque posteriorum basi saepe subfuscis. Alae ex cinereo sublutescentes, immaculatae, segmenti costalis primi apice nigro, venis transversis non longe inter se distantibus, venis longitudinalibus tertia et quartā apicem versus parallelis. — (Cuba; Poey.)