

Diptera Americae septentrionalis indigena.

Descripta

H. Loe. w.
VII. 1916 (1866)

Centuria septima.

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. <i>Tanypus scapularis.</i> | 27. <i>Echthodopa pubera.</i> |
| 2. - <i>humeralis.</i> | 28. <i>Pygostolus argentifer.</i> |
| 3. - <i>thoracicus.</i> | 29. - <i>dives.</i> |
| 4. - <i>bellus.</i> | 30. - <i>pictus.</i> |
| 5. - <i>pusillus.</i> | 31. <i>Plesiomma funesta.</i> |
| 6. - <i>hirtipennis.</i> | 32. - <i>leptogastra.</i> |
| 7. - <i>pilosellus.</i> | 33. - <i>indecora.</i> |
| 8. <i>Macrocerata formosa.</i> | 34. - <i>macra.</i> |
| 9. <i>Sciophila bimaculata.</i> | 35. - <i>unicolor.</i> |
| 10. <i>Sargus elegans.</i> | 36. <i>Diogmites platypterus.</i> |
| 11. - <i>lucens.</i> | 37. - <i>discolor.</i> |
| 12. - <i>tricolor.</i> | 38. - <i>ternatus.</i> |
| 13. - <i>pleuriticus.</i> | 39. - <i>misellus.</i> |
| 14. <i>Chrysonotus nigricornis.</i> | 40. - <i>bilineatus.</i> |
| 15. <i>Euparyphus tetraspilus.</i> | 41. - <i>angustipennis.</i> |
| 16. - <i>brevicornis.</i> | 42. - <i>hypomelas.</i> |
| 17. - <i>stigmaticalis.</i> | 43. - <i>umbrinus.</i> |
| 18. - <i>bellus.</i> | 44. <i>Microstylum galactodes.</i> |
| 19. <i>Stratiomyia maculosa.</i> | 45. <i>Scleropogon pictus.</i> |
| 20. - <i>laticeps.</i> | 46. <i>Stenopogon modestus.</i> |
| 21. - <i>picipes.</i> | 47. - <i>inquinatus.</i> |
| 22. <i>Midas rufiventris.</i> | 48. - <i>consanguineus.</i> |
| 23. - <i>luteipennis.</i> | 49. - <i>latipennis.</i> |
| 24. - <i>xanthopterus.</i> | 50. - <i>longulus.</i> |
| 25. - <i>simplex.</i> | 51. <i>Ospriocerus Aeacides.</i> |
| 26. - <i>venosus.</i> | 52. - <i>Rhadamanthus.</i> |

venis pallidis, in ipso alarum apice cinereis. — (District Columbia; Osten-Sacken.)

92. *Ephydria obscuripes*, nov. sp. ♂ et ♀. *Obscure viridis, abdomine glauco-viridi, omnino opaco, pilo laterali in tertio antennarum articulo nullo, facie albo-pollinosâ, margine oris in mare pilis rarioribus brevioribusque, in foeminâ consertioribus longioribusque vestito, pedibus totis obscuris.* — Long. corp. $2-2\frac{1}{2}$ lin., Long. al. $2\frac{1}{6}$ lin.

Obscure aeno-viridis. Frons plerumque concolor, raro chalybescens, marginibus lateralibus polline fusco vel fusco-cinereo aspersis, opacis. Antennae nigrae, pilo laterali articuli tertii nullo, setâ superne breviter pubescente. Facies albo-pollinosa, margine tamen summo, inter antennas sito fusco-pollinoso; oris margo in mare pilis rarioribus tenuioribusque, in foeminâ consertioribus validioribusque ciliatus. Pleurae ex viridi glaucescentes, polline pallido tectae, opaceae. Dorsum thoracis polline fuseo aspersum, subopacum. Seutellum aeno-viride, modice nitens. Abdomen ex glauco viride, totum opacum, colore marginis postici segmentorum singulorum plerumque magis in cinereum vergente; ultimum segmentum abdominis maris praecedenti aequale vel paulo longius; hypopygium parvum. Pedes virides, opaci, tarsis nigris. Alae obscure cinereae. — (Massachusetts; Osten-Sacken.)

93. *Drosophila multipunctata*, nov. sp. ♂. *Lutescens pectore pedibusque pallidissimis, alis hyalinis, punctis subtredicim nigris in utrâque alâ.* — Long. corp. $\frac{3}{4}$ lin., Long. al. $1\frac{1}{4}$ lin.

Lutescens, capite cum antennis concolore, abdome praeter basim subfuscum, pectore, ventre pedibusque pallidissimis. Alae hyalinae, levissime cinereo-nebulosae, nigro-punctatae; in utrâque alâ puncta marginalia qualuor, tria majora in apicibus venarum longitudinalium primæ, secundæ et tertiae, quartum minutissimum in apice venæ longitudinalis primæ, conspicuntur; vena transversa minor puncto nigro includitur, cui in venâ longitudinali tertiarâ duo minutissima praemissa, tria majora, apicali hujus venæ non computato, postposita sunt; vena transversa posterior punetis duobus subconfluentibus nigris, in utroque fine collocatis notatur; punctum denique nigrum in segmento paenultimo venæ longitudinalis quartæ, adversus apicem nigricantis, adest. — (District Columbia; Osten-Sacken.)