

# Diptera Americae septentrionalis indigena.

Descriptis

H. L o e w. (1869)

## Centuria octava.

1.	<i>Dixa clavata.</i>	27.	<i>Anthrax proboscidea.</i>
2.	<i>Longurio testaceus.</i>	28.	- <i>periusta.</i>
3.	<i>Dilophus dimidiatus.</i>	29.	- <i>flavipes.</i>
4.	<i>Nothomyia scutellata.</i>	30.	- <i>Ceyx.</i>
5.	- <i>calopus.</i>	31.	- <i>fuliginosa.</i>
6.	<i>Nemotelus carbonarius.</i>	32.	- <i>pallidus.</i>
7.	<i>Pangonia rasa.</i>	33.	- <i>diagonalis.</i>
8.	<i>Lepidoselaga recta.</i>	34.	- <i>sagata.</i>
9.	<i>Therena comata.</i>	35.	- <i>curta.</i>
10.	- <i>candidata.</i>	36.	- <i>parvicornis.</i>
11.	<i>Psilocephala longipes.</i>	37.	- <i>bigradata.</i>
12.	- <i>melampodia.</i>	38.	- <i>nigricauda.</i>
13.	- <i>mundula.</i>	39.	- <i>scrobiculata.</i>
14.	- <i>laticornis.</i>	40.	- <i>stenozona.</i>
15.	- <i>melanopropria.</i>	41.	- <i>adusta.</i>
16.	- <i>costalis.</i>	42.	- <i>molitor.</i>
17.	- <i>rufiventris.</i>	43.	- <i>mucorea.</i>
18.	<i>Exoprosopa gazophylax.</i>	44.	<i>Hemipenthes seminigra.</i>
19.	- <i>decora.</i>	45.	<i>Argyromoeba Delita.</i>
20.	- <i>trabalis.</i>	46.	- <i>stellans.</i>
21.	- <i>sordida.</i>	47.	- <i>obsoleta.</i>
22.	- <i>cubana.</i>	48.	- <i>pauper.</i>
23.	- <i>bifurca.</i>	49.	- <i>euplanes.</i>
24.	- <i>Agassizii.</i>	50.	- <i>contigua.</i>
25.	- <i>nubifera.</i>	51.	<i>Ploas limbata.</i>
26.	- <i>parva.</i>	52.	<i>Temnocera purpurascens.</i>

confertim vestito. Frons modice lata, lunulâ angustissimâ concalore. Antennae et proboscis nigrae, palpis concoloribus. Pedes et halteres toti nigri. Alae albo-hyalinae, venis ex luteo dilate subfuscis, costâ obscuriore. — (Cuba; Poey.)

96. *Leucopis simplex*, nov. sp. ♂. — *Nigricans, tota polline albo confertissime aspersa, antennis palpisque atris, pedibus nigris, basi et apice tibiarum primisque quatuor tarsorum articulis luteis.* — Long. corp.  $\frac{3}{4}$  lin., long. al.  $\frac{4}{5}$  lin.

Color corporis niger polline conferto albo aequaliter obtectus, abdomen immaculatum. Antennarum palporumque color ater. Femora nigra; tibiae fusco-nigrae, in basi latius, in apice minus late luteae; tarsi lutei, ultimo tamen singulorum articulo nigro-fusco. Halteres albidi. Alae hyalinae, venis fuscis. — (New York; Osten-Sacken.)

97. *Cacoxenus semiluteus*, nov. sp. ♂ et ♀. — *Ex luteo cinereus, antennis, apice scutelli, abdomine pedibusque saturate luteis.* — Long. corp.  $\frac{1}{2}$  lin., long. al.  $\frac{1}{2}$  lin.

Color capitidis et thoracis nigricans polline luteo opacus fit et in luteo-cinereum mutatur. Frons lata, lunulâ angustissimâ concalore; antennae saturate luteae, articulo tertio subfuscō vel in margine supero infuscato. Color lutescens scutelli adversus basim in colorem thoracis abit. Abdomen totum saturate luteum vel luteo-testaceum. Pedes cum abdomine concolores. Halteres exalbidi. Alae hyalinae, subcinerascentes, venis ex luteo testaceis. — (Cuba; Poey.)

98. *Trigonometopus vittatus*, nov. sp. ♀. — *Pallidus, fere exalbidus, antennis, maculis occipitis duabus, dorsi vittis lateribus latissimis lineisque duabus intermediis, scutello denique praeter lineam medium subfuscis.* — Long. corp.  $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$  lin., long. al.  $1\frac{1}{2}$  lin.

Color totius corporis fere exalbidus, in stramineum vergens. Antennae breves, subfuscæ, lateribus adversis pallidioribus, articulo tertio obtuso. Frons in dimidio anteriore obsolete subfuscō-bivittata, praeter setas ordinarias pilis brevibus nigris, prope marginem anticum crebriores, in reliquâ fronte valde raris instructa. Occiput utrinque maculâ magnâ ex ferrugineo subfuscâ notatum. Thoracis dorsum polline albo obsolete aspersum utrinque vittam latissimam integrum, ex ferrugineo subfuscâ et in areâ interjectâ lineas duas obsoletiores subfuscas gerit. Scutellum ex ferrugineo subfuscum, linea tamen mediâ exalbidâ. Abdomen in vivo totum