

# ACHIAS

D I P T E R O R U M G E N U S

A FABRICIO CONDITUM;

ILLUSTRATUM NOVISQUE SPECIEBUS AUCTUM

ET

CONVENTUI

P H Y S I C O R U M G E R M A N O R U M

OBLATUM

CHR. RUD. GUIL. WIEDEMANN

MED. ET CHIR. DOCTORE

REGI DANIE A CONSILIIS STATUS IN ACADEMIA KILLENSI PROFESSORIE  
PLUR. SOC. LITER. MEMBRO.

Cum tabulis lithographicis duabus

KILIAE HOLSTATORUM

TYPIS CHR. F. KRIST. MOHR.

1830.

3. *Zygothrixia dispar* mihi.

Fusca, abdomine flavo maculis atris, pedibus flavis. Longit. lin. 1½ c<sup>o</sup> ♀. Ex Brasilia. Tab. II fig. 2 a. femina, fig. 2 b. caput maris, fig. 2 c. antenna.

Caput fuscum, feminae multo latius; oris margo papillum reflexus, pallide flavus. Antennae flavidae, apicem versus seta plumata instructae. Thorax flavido brunneus. Abdomen laete flavum, macula singuli segmenti atra; harum macularum prima antice profunde emarginata lateribus rotundata; secunda et tertia late trigonae, apice extremitum directae et valde truncatae; sequentes maculae multo minores. Alac apice fuscaue; halteres et pedes dilute flavi.

Tabulae secundae, quam a Webero Bopolinensi incredibili cum diligentia pictam, ad illustrandas duas novas Achiidarum species addidi, *Diopsis brevicornis*, ab eodem artifice pictam, fig. 3. inserui, quam novam speciem nuper Thomas Say Philadelphia mihi transmisit, sub nomine *Achias brevicornis*, quae vero cum ob abdominali formam generis *Diopsis*, adnumeranda est, tum etiam in scutello et in thoracis lateribus spinas illas habet, quae omniibus ceteris speciebus generis *Diopsis* communis sunt. Descriptionem eius vide in libri mei, de dipteris extraeuropaeis vernacula lingua conscripti Volume II p. 563., ubi alteram quoque novam speciem generis *Diopsis*, ex insula Java allatum, descriptam p. 560 et iconem illustratam Tab. 10. fig. 4. invenies, quaeque ad Dalmanni Monographiam addes. Non solum linea mentis alarum singularibus, sed etiam spinarum scutelli et thoracis brevitate insignes sunt, et exemplar ex America septentrionali allatum, cuius iconem proponimus, foveolam oblongam (in tabula nostra postcheriua satis conspicuam) in basi abdominali habet.



16



16



16

2 a



2 c