

DIPTERA SCANDINAVIÆ

DISPOSITA ET DESCRIPTA:

Auctore

PH. D:RE JOHANNE WILHELMO ZETTERSTEDT

AD UNIVERSITATEM LUNDENSEM BOTANICES ET OECON. PRACTICÆ PROFESSORE EMERITO; REGG. ORDINUM DE STELLA POLARI, WASA ET DANORUM DANNEBROG EQUITE; REG. ACAD. SCIENTIARUM HOLMIÆ, SOCIET. CUVIER. PARIS., NATUR. CURIOS. LIPS., SCIENTIAR. LITTERARUMQUE ELEGANT. GOTHOBURG., PHYSIOGRAPHII. LUNDENS., CULTURÆ BOMBYCINÆ SUECANÆ HOLM., ENTOM. SCANDINAV. HAVNIÆ, ET OECON. MALMOG. SODALE; REG. SOCIETAT. OECONOM. BOTNIÆ OCCIDENTALIS, SOCIETAT. HORTULANÆ GOTHOBURGENSIS, SOC. PRO FAUNA ET FLORA FENNICA HELSING-FORSIÆ, SOC. NATURÆ SCRUTATOR. MEGLOPOL. ROSTOCKENS., SOC. ENTOMOL. GALLIÆ, NEC NON SOCIET. ENTOMOL. LONDINI BRITANNIÆ MEMBRO HONORIFICO; ATQUE SOCIET. ENTOM. STETINI, ET SOCIET. HISTOR. NATURAL. HARZIAE CORRESPONDENTE.

132.-264

TOMUS DECIMUS QVARTUS Index

seu Ultimus.

continens

Addenda, Corrigenda & Emendanda

Tomis Prioribus,

una cum Indice alphabetico novarum specierum hujus & præcedentis Tomi, atque generice omnium Tomorum.

LUNDÆ,

EX OFFICINA LUNDBERGIANA,
SUMTIBUS REGIIS.

species pulchra & insignis per tuberculum parvum nigrum nitidissimum, alas albas, abdomen glaucum &c., ab omnibus aliis mox & satis superque dignoscitur.

24. *N. obscurella* Fall. Zell. V. p. 1884. ♂♀, VIII.
3332, & XI. 4326.

25. *N. pallidula* Stenb. (sub *Psilopa*). Zell. V. p. 1886. ♀.

26. *N. nigrina* Meig. Zell. V. p. 1887. ♂♀.

27. *N. plumosa* Fall. Zell. V. p. 1888. ♂♀, & XII.
4760.

28. *N. flavoala* Meig. Zell. V. p. 1890. ♀, & XII.

4760.

Larvæ hujus speciei vivunt in soliis Tropaeoli majoris, quæ suffodiunt, in centro solii incipientes. Vide Goureaux in Annal. de la Soc. ent. de France 1851 p. 161. tab. 7. n:o 15. f. 1—7.

29. *N. fuscella* Stenb. (sub *Psilopa*). Zell. V. p. 1892. ♂♀.

30. *N. glabricula* Fall. Zell. V. p. 1893. ♂♀.

31. *N. argyrostoma* Stenb. Zell. V. p. 1894. ♂♀,
& XII. 4760.

32. *N. fusca* Stenb. Zell. V. p. 1896. ♂♀.

33. *N. Nympheæ* Stenb. Zell. V. p. 1897. ♂♀,
& XI. 4326.

34. *N. grisea* Steuh. Zell. V. p. 1898. ♂♀.

35. *N. laticeps* Stenb. Zell. V. p. 1899. ♂♀, &
XI. 4326.

36. *N. discolor* Stenb. Zell. V. p. 1900. ♂♀.

In Scania: ad Illstorps. d. 4 Jul. 1857 ♂ unicus,
Roth; ad Lund d. 14 Aug. 1859 ♂ semel.

Obs. Cum subsimilibus *N. Nympheæ* (33), ♀ *nigripede* (38)
non commiscenda.

16. *P. bipunctata* Fall. (sub *Geomyza*). Zett. VI. p. 2522. ♂♀.

(Ad Eriksberg Finlandiæ semel, Prof. *Bonsdorff*; ad Tailpalsaari, atque in Nylandia, *Mäklin*).

Obs. Inter specimina utriusque sexus, quæ sub nomine: "Mycetaulus Hoffmeisteri Loew." mihi 1856 communicavit Doctor Winnertz, & nostram *Piophilam bipunctatam*, nullam invenio differentiam.

16 Sp.

180. RHYNCHÆA Zett.

1. *Rh. Lonchaeoides* Zett. VI. p. 2524. ♀?

1 Sp.

Fam. 34. GEOMYZIDES Fall.

181. GEOMYZA Fall.

A. Thorax pallidus.

sp. 1—4.

B. Thorax cinerascens l. obscurus.

sp. 5—9.

1. *G. combinata* Linn.? Zett. VI. p. 2527. ♂♀.
VIII. 3360, & XII. 4798. ♂.

Uterque sexus sæpe etiam in fenestris mens. Julij occurrit. (In Finland. ad Eriksberg & in Alandia rar., Mus. *Bonsdorff*).

Var. b. *apicalis* Meig. (sub *Opomyza*). Zett. VI. p. 2527. ♂♀.

(♂ in Lapponia Finlandica semel, *Mäklin*).

Var. c. *venusta* Meig. Zett. VI. p. 2527. ♂♀.

Var. d. Zett. XII. p. 4798. ♀.

2. *G. angustipennis* Stæg. Zett. VI. p. 2529. ♂♀.

3. *G. consobrina* Zett. VI. p. 2529. ♂♀.

♂ & ♀ in Scania ad Lund & ad Klinta prope Ring-sjön d. 25 Jun.—2 Jul. 1855. parce, Roth.

4. *G. ungvicella* Zett. VI. p. 2530. ♂♀.

In graminosis Lundæ Scaniæ in horto meo d. 28 Jul. 1859 seminam unicam inveni. ♀ etiam in Smolandia, Prof. Boheman. (In Finlandia ad Uskela ♀, Mus. Bonsdorff).

5. *G. tripunctata* Fall. Zett. VI. p. 2531. ♂♀, & XII. 4799. ♂♀.

(In Finlandia minus freq., Prof. Bonsdorff; ♂ ad Tailpasaari, D. Mäkin).

Var. b. VI. p. 2532.

6. *G. marginella* Fall. Zett. VI. p. 2532. ♂♀, & XII. 4799. ♂♀.

7. *~~G.~~ Unipunctum* Zett. VI. p. 2533. ♂♀.

7—8. *G. griseola* Zett. XII. p. 4799. ♂.

In Scania ad Lund individua 2 mascula hujus tantum ut Ostrogothiæ incolæ hactenus cognitæ speciei d. 8 Sept. 1855 inventa a Roth. — Femina adhuc ignota.

♂. Alæ ad costam plaga longitudinali fusca. In specimine scanensi antennæ magis obscuræ (sere nigrae), quam in exemplis ostrogothicis.

8. *G. terminalis* Zett. VI. p. 2533. ♀.

(9. *G. socculata* Stenb. Zett. VI. p. 2534. ♂, & VIII. 3360).

Identica est cum *Anthophilina gracili* Tom. VII. p. 2693, unde heic abit.

9. *G. brevipennis* Zett. XI. p. 4335. ♀.

182. DIASTATA Meig.

1. *D. nebulosa* Fall. (sub *Geomysza*). Zett. VI. p.

2536. ♂♀.

In Scania: etiam ad Ringsjön d. 24 Jun. ♂, & ad Sjöbo d. 18 Aug. ♀. (In Finlandia ad Kusamo, D. *Mäkilin*, teste Prof. *Bousdorff*; marem unicum ad Tammerfors invenit D. *Lundahl*).

2. *D. unipunctata* Stenh. Zett. VI. p. 2537. ♂♀, & XI. 4336.

Locis humidis ad Illstorp Scaniæ d. 18 Jul. 1859 mares nonnullos legit D. *Roth*.

3. *D. Punctum* Meig. Zett. VI. p. 2538. ♂♀, & VIII. 3360. ♀.

4. *D. costata* Meig. Zeit. VI. p. 2539. ♂♀.

Var. b. ♂. VI. p. 2540, & VIII. 3360.

5. *D. obscurella* Fall. Zett. VI. p. 2540. ♂♀.

In speciminibus bene conservatis thoracis linea lateralis plenariaque cinereo-albida.

Var. b. ♀. XII. p. 4800.

Ambo sexus in Scania ad Illstorp d. 4-10 Jul. 1857 hujus varietatis inventus.

5 Sp.

183. DROSOPHILA Fall.

A. Nervi transversi approximati aut subapproximati. &c.

*). Thorax obscurus, &c.

sp. 1-7.

**). Thorax pallescens, &c.

t. Alar. nervi transversi infuscenti.

sp. 8.

††. Alar. nervi transversi non infuscati.

sp. 9—13.

B. Nervi transversi remoti aut subremoti, &c.

α). Thorax obscurus, &c.

sp. 14—16.

β). Thorax pallescens, &c.

sp. 17—23.

1. *Dr. variegata* Fall. Zett. VI. p. 2544. ♂♀, & XII. 4800.

In Scania: ad Herrevadskloster, nec non in succo exstillante Quercus ad Klinta d. 3—15 Jun. 4 seminas deprehendit Roth. (Ad Eriksberg Finlandiae specimen unicum, Prof. Bonsdorff).

Var. b. ♀. VI. p. 2546.

2. *Dr. annulata* Fall. (sub *Notiphila*). Zett. VI. p. 2546. ♂♀, & XII. 4800.

In Scania: ad Råby prope Lund mense Augusto 1855. ♀ parce lecta; in succo exstillante Quercus ad Stehag d. 19 Jun. 1859 semel, Roth.

3. *Dr. albo-guttata* Wahlb. Zett. VI. p. 2547. ♂♀, & XII. 4801. ♂♀.

In Scania quoque ad Herrevadskloster & ad Ringsjön d. 3—15 Jun. seminas nonnullas cepit Roth; in Ostrogothia ad Gusum mens. Jul. 1857 nova vice inventa Prof. Wahlberg.

*3—4. *Dr. albitalbris* Roth. n. sp.: nigra, nitens, capite concolore, epistomate inferne late, thoracis callis humeralibus & puncto utrinque sub radice alarum halterumque clava niveis; antennis basi rufescentibus; proboscide flava; pedibus nigricantibus, femorum basi,

tibiis anterioribus tarsisque omnibus sordide pallidis; alis immaculatis, nervis transversis approximatis. ♂. (Long. vix $\frac{3}{4}$ lin.).

Roth in litteris.

Hab. in Scania boreali-orientali rarissime: scilicet in folio Betulæ albæ ad villam Bökestad d. 21 Jun. 1858 unicum specimen masculum detexit C. D. E. Roth.

♂. Simillima *Dros. albo-guttata* (3), a qua vix nisi colore pedum obscuriore differt. — Nigra. Caput cum antennis & seta vase plumata ut in *Dr. albo-guttata* constructum & coloratum. Epistoma argenteo-niveum, superne sub antennis determinate nigrum, in specimine bene conservato viso omnino nudum absque mystacibus vel vibrissis, quas vix abscissas puto. Proboscis pallida. Palpi nigri. Genæ pallidæ. Thorax subnitidus niger, punctis 4 rotundatis niveis, quorum 2 scapularia, paullo majora, & unum utrinque sub insertione alæ. Scutellum nigrum. Abdomen ovatum nigrum, nitens. Alæ cinereo-hyalinæ. Nervi pallescenses: longitudinales 3 & 4 supra transversum ordinarium paullo remotiores, versus apicem leniter convergentes, horum 3:tius in apice alæ excurrens; transversi paullo approximati. Halteres flavi, clava nivea. Pedes obscure brunescentes seu nigro-fusci, trochanteribus, femorum basi anguste & indeterminate, genubus puncto apicali, tibiis anterioribus tarsisque omnibus sordide albidis, horum articulo ultimo obscuro; omnes & toti breviter pubescentes. Tibiæ posticæ subcurvatae.

4. *Dr. obscura* Fall. Zett. VI. p. 2549. ♂♀, & XII. 4801.

In succo arboris sauciatalæ *Quercus* ad Lindholm Scaniæ d. 5 Jul. 1857, & ad Illstorp d. 2 Jul. 1859 quatuor specimina lecta. ♂ in Hallandia & Ölandia, Holmgren. (In Finland. ad Eriksberg semel, Prof. Bongdorff).

5. *Dr. spurca* Zett. VI. p. 2550. ♂.
6. *Dr. cinerella* Fall. Zett. VI. p. 2551. ♀, & VIII. 3360.
 ♀ ad Lund Scan. d. 14 Aug. 1859 semel, D. Roth.
7. *Dr. costata* Zett. VI. p. 2552. ♂♀.
 (In Finlandia ad Åbo ♀ rarissima, Mus. *Bonsdorff*).
8. *Dr. transversa* Fall. Zett. VI. p. 2553. ♂♀.
 In Lappon. Umensi ad Kattis-afvan d. 14—16 Jun. 1856 ♀ raro, Holmgren. (Ad Eriksberg Finland. rarissime, Prof. *Bonsdorff*).
 Var. b. *laeta* ♀. VI. p. 2555.
- Var. c. ♂♀. XII. p. 4801.
9. *Dr. tristis* Fall. Zett. VI. p. 2555.
10. *Dr. fuscimana* Meig.? Zett. VI. p. 2556. ♂,
 & XI. 4336.
 Var. b. ♂. XI. p. 4336.
11. *Dr. nigriventris* Zett. VI. p. 2557. ♂♀.
12. *Dr. approximata* Zett. VI. p. 2557. ♀.
13. *Dr. congesta* Zett. VI. p. 2558.
14. *Dr. glabra* Fall. Zett. VI. p. 2559. ♂♀, & XII. 4801.
 (Ad Taipasaari Finland. parce, Mäklin).
15. *Dr. Graminum* Fall. Zett. VI. p. 2560. ♂♀,
 & XII. 4801.
 (In Finlandia vulgaris, Mus. *Bonsdorff*).
 Var. b. *sordida* VI. p. 2560. ♂♀, & XII. 4801. ♂♀.
 Var. c. *flavipennis* VI. p. 2560. ♂♀.
16. *Dr. griseola* Zett. IV. p. 2562. ♀.
 Ad Storbyn in parocc. Färila Helsingiæ d. 21 Aug. 1840 seminam unicam legit Prof. *Dahlbom*; in Lappo-

nia ad Kattis-afvan d. 14 - 16 Jun. 1855 duas feminas invenit *Holmgren*.

Obs. In speciminibus lapponicis frons tota obscure grisea, alarum nervi transversi ordinarii leniter infuscatae.

17. *Dr. funebris* Fabr. Zett. VI. p. 2563. ♂♀, & XII. 4801.

(In Finlandia non raro, Mus. *Bonsdorff*).

18. *Dr. confusa* Stæg. Zett. VI. p. 2565 ♂♀, & VIII. 3360.

19. *Dr. Histrion* Meig. Zett. VI. p. 2566.

*19—20. *Dr. maculata* Duf. n. sp.: testacea, opaca, capite pedibusque flavis, scutelli macula utrinque, metathorace abdominalisque maculis triplice serie dispositis nigris; alarum nervis longitudinalibus 3 & 4 versus apicem leniter convergentibus, transversis modice remotis, segmento nervi longit. 4:ti ultimo circiter $1\frac{1}{2}$ longiore; mas: fronte thoracisque dorso argenteo-micantibus. ♂♀. (Long. circiter $1\frac{1}{2}$ lin.).

Leon Dufour in Annal. des Sciene. Natur. Paris 1839. p. 49. 14. T. 3. f. 85. — Zett. Dipt. Scand. VI. p. 2546 in Observ. sub *Dr. variegata*.

Hab. in Scania rarissime, ♀ a Prof. *Bohemian* semel inventa, Mus. Acad. Holm.

♀. Caput flavum, puncto verticis obscuro. Antennarum artulus ultimus dilute fuscus. Thorax dorso certo situ lineis dilutissime cinereis. Pleuræ cinereo-maculatae. Scutelli latera nigra. Metathorax obscure cinereus. Abdomen flavum, maculis nigris triplici serie dispositis, quarum in segmento 1 mo 3, harum laterales majusculæ intermedia minuta punctiformis, in 2:do quoque maculae 3 magnæ, harum laterales transverse

rotundatæ, intermedia oblongo-rotundata; in 3:to maculæ totidem, omnes oblongo-rotundatæ; & in 4:to maculæ etiam 3, paullo minores. Anus acutus, flavus. Halteres pallide flavi. Pedes cum coxis toti flavi.

♂, qualis a Celeb. *Leon Dufour* e S:t. Sever Galliæ communicatus, similis feminæ, sed differt: antennis totis flavis, plenius vix fusco-maculatis, fronte scutello & in primis thoracis dorso argenteo-micantibus, nec non metathorace dilutiore, & tandem ano parvo subexerto nigro.

20. *Dr. picta* Stæg Zett. VI. p. 2567. ♀.

21. *Dr. Fenestrarum* Fall. Zett. VI. p. 2568.

♂♀, & XII. 4801.

(In Finlandia ad Sjundeå ♂ semel, *Mäklin*).

Var. b. ♂. VI. p. 2570.

Var. c. ♀. XII. p. 4802.

22. *Dr. flava* Fall. Zett. VI. p. 2570. ♂♀, & VIII. 3361.

23. *Dr. pallida* Zett. VI. p. 2571. ♂, & XII. 4802. ♂.

In prato Kungsmarken prope Lund Scaniæ d. 27 Jun. 1857 seminam unicam, & ad Illstorp d. 8 Jul. 1859 seminam etiam semel deprehendit Roth.

25 Sp.

184. ASTEIA Meig.

A. *Corpus pallidum*.

sp. 1—3.

B. *Corpus obscurum*.

sp. 4.

1. *Ast. concinna* Meig. Zett. VI. p. 2573. ♂♀, & XII. 4802.

2. *Ast. amoena* Meig. Zett. VI. p. 2574. ♂♀, & XII. 4802.

3. *Ast. elegantula* Zett. VI. p. 2575. ♂♀.

*Var. b. ♂. Similis var. a., sed abdōmen totum flavo-ferrugineum, immaculatum. An specimen juvenile? In Hallandia semel capta, teste Prof. Boheman; Mus. Acad. Holmiæ.

*4. *Ast. nigra* Zett. n. sp.: nigra, nitens, epistomale inferne argenteo-micante; antennis, halteribus & tibiarum larsorumque annulis flavis; alarum nervo auxiliari elongato. ♂. (Long. $\frac{2}{3}$ lin.).

Hab. in Scania rarissime: in succo exstillante Ulmi ad Råby prope Lund specimen unicum masculum invenit clar. Roth, qui deinde in silva Rästen d. 27 Jun. 1858 alterum deprehendit.

♂. Affinis *Ast. amoenæ* (2), sed corpore obscuro, nec ex parte flavo, nervo auxiliari elongato, nec brevi, &c. differt. Pictura pedum cum *Drosoph. annulata* (p. 6425. n:o 2) sat convenit, sed defectu nervi transversi ordinarii mox dignoscitur; per hanc notam negativam ut & alas rectas, nec deflexas, a *Stegana* quoque diversa. — Nigra, nitida, parce setulosa. Frons lata, nigro-cinerea, vix nitida, margine antice angustissime pallido. Antennæ ovatae, flavæ, articulo 2:do superne puncto brunneo, seta superne mediocriter (nec longe) & non raro plumata, nigra. Epistoma sat latum, breve, sub antennis flavum, inferne subargenteum, ibique serie vibrissarum tenuium munitum. Instrumenta cibaria in apertura oris ampla videntur retracta, fusca. Genæ breves infra oculos non descendentes. Thorax & scutellum supra leniter fusco-pollinosæ. Abdomen oblongum, nigrum, nitidum, ad latera segmentorum punctis minutis albis, quæ vix nisi certo luminis situ conspicuntur. Anus parvus, rotundatus. Alæ abdomine longiores, hyalinae, immaculatae. Nervi: longitudinalis 1:mus (seu auxiliaris) longiusculus, fere (sed non omnino usque)

(In Finland. ad Åbo & Eriksberg, Mus. *Bonsdorff*).

Var. b. ♂. VII. p. 2674.

5. *M. annulitarsis* Zelt. VII. p. 2674. ♀.

Individua utriusque sexus antennis intus sordide flavidis in florib. Gageæ luteæ d. 2 Maj. 1860 legit D. Roth.

*Var. b. ♂♀ tarsis flavidis parum annulatis, de cetero var. a. simillima.

In Scania boreali-orientali ad Trolle Ljungby d. 26 Apil.—6 Maj. 1855 ex utroque sexu a D. Gadamer capta mecum communicata.

Obs. Pro *Chlorope trilineata* Meig. hanc libenter haberem, nisi antennæ fere totæ nigrae & intus parum flavæ, atque thorax manifeste opacus, minime nitidus, in nostra specie obstant.

5 Sp.

LEIOMYZA Macq. (*).1. *L. scatophagina* Fall. (sub *Heteroneura*).
Zelt. VII. p. 2676. ♂♀.

♂ in sol. fruticum ad Snäckestad Scan. borealis d. 23 Jun. raro, Roth, (halterum clava obscura).

Obs. In Tomo 7:mo pag. 3678. lin. 9. stat: ore nudo, nec mystacino, lege: ore mystacino, nec nudo.

1 Sp.

191. GYMNOPOA Fall.1. *G. aenea* Fall. Zelt. VII. p. 2679. ♂♀.(In Finlandia ad Eriksberg semel, Prof. *Bonsdorff*).

1 Sp.

(*) rectius *Liomyia*, α λειος levis & μυτια murea.

(Ad Taipalsaari Finland. seminam unicam invenit D. Mäklin).

7. *Anth. grisea* Fall. Zett. VII. p. 2699. ♂♀.

8. *Anth. bicolor* Zett. VII. p. 2701. ♀.

* Obs. Pag. 2701. lin. ultima stat: sequenti inseritur, lege: sequenti seu *Leucopi* inseritur.

- * 9. *Anth. pallida* Zett. VII. p. 2702. ♂♀.

10. *Anth. laeta* Meig. (sub *Opomyza*). Zett. VII. p. 2703. ♀.

11. *Anth. flavella* Zett. VII. p. 2704. ♀?

11 Sp.

~~b)~~ b). AULACIGASTER Macq.

1. *A. rufitarsis* Macq. Zett. VII. p. 2707. ♂♀, VIII. 3362, & XII. 4809.

In succo exstillante Ulmi ad Råby prope Lund Scaniæ d. 21 Maj. 1858 marem unicum legit Roth.

Var. b. ♂♀. VII. p. 2708.

1 Sp.

196. LEUCOPIS Meig.

1. *L. griseola* Fall. (sub *Anthomyza*). Zett. VII. p. 2710. ♂♀, VIII. 3363. larvæ, & XII. 4810. ♀.

In Scania: marem ad Herrevadskloster d. 3—15 Jun., & seminam ad Illstorp d. 24 Jul. 1855 iterumque d. 4 Jul. 1857 collegit Roth; in Lappon. Umens. ad Gransele & Kattis-asvan d. 12—16 Jun. 1856 seminas nonnullas deprehendit Holmgren. (Ad Eriksberg Finland. semel, Prof. Bonsdorff).